

KVĚTENA

okolí

HRADCE KRÁLOVÉ.


Sepsal

Dr. Antonín Hansgirk,

professor na vyšších školách reálných v Hradci Králové.

188

S mapkou okolí Hradce Králové.



V HRADCI KRÁLOVÉ.

Nákladem knihkupectví B. E. Tolmana.

1881.

Pánu a Panu

D^{ru} Ladislavovi Čelakovskému,

ř. professoru vědy rostlinozpytné na vysokém učení Pražském,

na důkaz úcty a oddanosti

čenuje:

spisovatel.

I.

Všeobecné vylicení květeny Královéhradecké.

ÚVOD.

Květena okolí staroslavného města Hradce Králové nebyla dosud nikým podrobněji prozkoumána a popsána, ač jest v mnohém ohledu velmi zajímavou. Tomuto nedostatku odpomoci, alespoň z části, jest účelem tohoto spisku, v kterém podávám hlavní výsledky svého několikaletého pozorování, přičiňuje k nim též výzkumy několika starších botaniků, kteří přede mnou v tomto okolí botanicky činnými byli.*)

Co se týče důležitosti místních květen, jakou i tato květena jest, podotýkám toliko, že úkolem jejich jest upozorniti přátely přírody na bohatost a rozmanitost květeny určitého okolí a seznámiti je, zvláště mládež studující, jež botanice nejlépe v přírodě samé se učí, s rozšířeností jednotlivých druhů i se zvláštními poměry botanickými jejich nejbližšího okolí, upozorniti též botaniky cizí na zajímavou květenu okolí našeho a poskytnouti jim spole-

*) S připomenutím, že ačkoliv dosavadními výzkumy již značné množství druhů rostlinných v okolí Královéhradeckém objeveno bylo, počet jejich dalším bádáním ještě rozmnožen býti může. V té příčině upozorňuji zvláště na některá od Hradce Kr. vzdálenější místa, jako Neebánice, Sádovou, Hoříněves, Černilov, Týnště a Chvojno, jichž okolí dosud botanicky dosti prozkoumáno není.

hlivého průvoděho botanického, další studia botanická usnadňujícího, a konečně podati též pokud možno věrný obraz květeny určitého kraje, co nepatrný doplněk díla, o rozšíření rostlin v Čechách obšírněji jednajícího.*)

1. Hranice, velikost okresu a bohatost květeny Královéhradecké.

Hranice květeny této nejsou následkem zvláštní polohy Hradce Králové, až na malé výjimky, přirozenými. Na jihu sáhá čára pohraničná za Horu Kunětickou až ku potočí Labe u Brozan, odsud jest vedena dále kolem bývalých rybníků Bohdaneckých skrze Bohdaneč a Kratonohy až ku Nechánicům, od nich táhne se pak podél Bystřice dále na severovýchod kolem Sádové ku Hořiměvsi, končíc se na severu pod samým Josefovem. Odsud jde pak na východ kolem Libřic a Vys. Újezdu ku Týništi, kdež překračuje obvod kruhu, místy právě vytknutými vedeného, zabíhajíce podél Orlice až ku Borohrádku, od něhož se pak zase přes Holice a Sezemice zpět ku Labi vrací.

Rozšíření obzoru v této části stalo se hlavně z té příčiny, aby vznikla na této straně přirozená hranice, již Orlice činí vzhledem ku rozsáhlým lesům, od Hradce Králové přes V. a M. Běleč až ku Týništi a Borohrádku se táhnoucím.

Z udání cizích užito v květeně této, mimo udání v Prodomu květeny české Dra. L. Čelakovského uvedená, jen několika málo jiných, jimiž květena tato o několik druhů nečíslovaných (mezi něž též některé druhy pořádku pěstované zařaděny jsou) obohacena byla.

Počet druhů této květeny jest vzhledem ku prostranství, jež zaujímá, asi 12 □ myrm., dosti značným a vyrovná se skorem bohaté květeně okolí Pražského, na stejné velikém prostoru vyvinuté.

Nalézají se v okrese našem dobrých (číslovaných) druhů rostlin cévnatých 947, k nimž se druží 39 význačných

*) Prodomus Květeny české od Dra. Lad. Čelakovského.

plemen, od mnohých botaniků za dobré druhy považovaných; jimi mohli bychom počet druhů vůbec rozšířiti na 986.

S květenou širšího okolí Pražského,*) asi 23 □ myrm. zaujímajícího a chovajícího asi 1350 rostlinných druhů v širším smyslu (r. 1870 bylo jich 1314 známých), mohla by květena okolí našeho jen tehdy porovnána býti, kdyby hranice její pošinuty byly za Jaroměř, Opočno, Pardubice, Chlumec, Bydžov a Hořice, města to, jichž botanicky bohatá okolí po většině již staršími botaniky českými důkladněji prozkoumána byla.**)

2. Poloha Hradce Králové a všeobecný popis poměrů zeměpisných a útvarů rostlinných.

Hradec Králové leží na 50° 12' 38" sev. šíř. a 33° 29' 50" vých. dél. na pahorku, 231·52 m. nad hladinou mořskou povzneseném, blíže místa, kde Labe s Orlicí se stéká. Rovina, jež kolem něho daleko se prostírá, přechází na některých místech v nevysokou pahorkatinu, v průměru asi 250 m. nad hladinu mořskou povýšenou. Nejvyššími místy v našem okolí jsou Hora Kunětická 329 m. a Chlum 325·34 m. Pro snazší porovnání těchto míst s jinými uvedu zde ještě výšky některých jiných:

Nový Hradec 304·61 m.	Hoříněves 306·74 m.
Sv. Janský kopec 265 m.	Λ bod u Skalice 246·79 m.
Kratonohy 258·4 m.	Nádraží Hradecké 229·3 m.
Hrádek 286·27 m.	Vysoký Újezd 305·94 m.
Λ bod u Libčan 279·62 m.	Třebechovice 246·8 m.***)

Nejvíce kopců vyskytuje se v okrese Nechánickém, nad Třebechovicemi, kolem Chlumu a Hoříněvsi.

Mimo Kunětickou Horu z čediče složenou skládají se ostatní kopce z opuky, slínů, jílu i ze sypkých vrstev

*) Viz: Květena okolí Pražského, již sepsal Dr. L. Čelakovský.

**) V celých Čechách bylo dosud pozorováno 1883 rostlinných druhů v širším smyslu.

***) Výšky uvedených míst udány jsou podle mapy hejtmanství královéhradeckého, již sestavil Josef Horák.

přísčítých. Z rovin jest v okolí našem nejrozsáhleji vyvinuta rovina Polabská, jež po obou březích Labe od Josefova až ku Pardubicům se prostírá, nabývajíce tím větší šířky čím více tomuto městu se blíží. I podél Orlice a Bystřice táhnou se nepřilíš široké roviny, z nichž do okolí našeho zasahuje zvláště botanicky dosti zajímavá rovina, jež podél Orlice od Hradce Králové ku Třebchovicům a dále ku Týništi a Borohrádku zabíhá. Na těchto rovinách rozprostírají se, mimo rozsáhlá luka a pole, i lesy. Na lukách vyskytují se vedlé četných druhů bylin lučních též tu a tam pěkné houštiny vrb, olší, krušin, brslenů, střemchy a podobné. Mimo tyto keře rostou zde též jednotlivě nebo v menších skupinách mohutné duby, vazy, topoly a olše, jež místům těmto, fysiognomicky dosti jednotvárným, větší rozmanitosti dodávají.

Místy stávají se tato luka bažinnými ano i rašelinnými. Takováto luka chovají pak často značnější počet rostlin vzácnějších, jichž bychom na úrodných lukách marně hledali. Za příklad luk bažinných, v našem okolí dosti hojně zastoupených, uvádím jen louku blíže Zvonárny před Náhonem, luka u Roudničky a Kluku, louky ve vlhkých lesích Hradeckých a pod. Louky tyto rozeznávají se od úrodných luk hlavně tím, že na nich převládají rostliny šáchorovité, ostrice, sítiny a pod. nad jinými. Z té příčiny zovou se též lukami ostricovitými nebo kyselými.

Příkladem rašelinných luk jsou: botanicky velmi zajímavá neveliká louka za N. Hradcem (blíž olšiny) chovající mnohé vzácné rostliny jako: *Carex pulicaris*, *paradoxa*, *Buxbaumii*, *Juncus fuscoater*, *Drosera rotundifolia*, *Arnica montana*, *Cirsium rivulare* a p., a daleko se prostírající louky kolem Libišan a Březhradu, na nichž se vyskytuje mimo jiné vzácnější rostliny, jako *Carex Dauliana*, *Cyperus fuscus*, *Salix repens*, *pentandra*, *Ranunculus lingua*, *Utricularia minor* a j., též velmi vzácná ostrice nitkolistá (*Carex filiformis*) u velikém množství; zde dobývá se též rašeliny, na některých místech až na 3 m. mocně vyvinuté, ku děláni tak zvaných borek.

Louky střídají se na rovině Polabské s pěknými lesy lupenatými a jehličnatými. V lupenatých lesích a hájích

převládají nejvíce duby, habry, buky, břízy, lípy, jilmy, javory a p., pod nimiž hojný podrost různých křovin a květin se daří. Botanik, tyto lesy navštívivší, nalezne v nich vždy dosti bohatou kořist, skládající se hlavně z rostlin lesních, obecně rozšířených, a mnohých v okolí našem méně hojných květin útvaru poloh nejteplejších, na př. *Koeleria cristata*, *Festuca pinnata*, *Anthericum ramosum*, *Phyteuma spicatum*, *Campanula glomerata*, *Inula salicina*, *Adoxa moschatelina*, *Ligustrum vulgare*, *Prunella grandiflora*, *Vinea minor*, *Melittis melissophyllum*, *Melampyrum cristatum*, *Bupleurum falcatum*, *Dianthus armeria*, *Laserpitium pruthenicum*, *Geranium sanguineum*, *Rosa gallica*, *trachyphylla*, *Fragaria collina*, *Potentilla alba*, *Anthyllis vulneraria*, *Trifolium alpestre*, *medium* a m. j. Příkladem takových lesů jsou dubina blíže Březhradu, les Ouliště u Slatiny, lupenaté háje nad Blešnem a Nepasicemi, lesy u Bukoviny, Dobřenic, Stěblové, lesík na sv. Jánském kopci, bažantnice u Dolního Přímu, botanicky zajímavý háj Sendražický a lesy mezi Račicemi a Habřinou a j.

Tmavé jehličnaté lesy Polabské, výhradně borové řídčeji též smrkové, jsou, poněvadž obyčejně na půdách písčitých se rozkládají, obyčejně velmi suché a protože z pravidla jen sporý podrost chovají, botanikovi též méně vítány, nežli míchané lesy jehličnaté, v nichž lupenaté stromy hojněji jsou zastoupeny. Příkladem takových jednotvárných, písčitých, borů jsou lesíky borové kolem Březhradu, u Horní Bukoviny, Borky nad Blešnem a j. Leč i v lesích míchaných, jichž příkladem jsou rozsáhlé lesy kolem Přímu, Hrádku, Libčan a jinde rozložené, jeví flora málo rozmanitosti a s těží jen nalezne oko botanikovo mezi hojnými ostružníky, čilimníky, janovcem, babím hněvem, zlatobýlem, kručinkou, vřesem a pod. též některou vzácnější rostlinu.

Jiného rázu než právě popsané lesy jsou vlhké lesy jehličnaté, jež od Hradce Králové ku Třebechovicům a Týništi, od N. Hradce přes Bejšť, Chvojno až ku Boro-
hrádku skoro bez přetrže se táhnou. Lesy tyto chovají místy ve vlhkých houštinách velmi bujně rostoucí kapradiny (*Aspidium spinulosum*, *filix mas*, *Athyrium filix femina*,

Pteris aquilina), přesličky (*Equisetum silvaticum*), trávy a podobné rostliny, jež lesům těmto zvláštního puvabu a bujnosti dodávají. Mimo ně přechovávají však též v humosní půdě ještě četné vzácnější rostliny vlhka milovné, jichž v sušších lesích Polabských skorem zcela postrádáme, na př. *Carex canescens*, *elongata*, *Listera ovata*, *Monesis grandiflora*, *Trientalis europaea*, *Thalictrum aquilegifolium*, *Cardamine bulbifera*, *emneaphylla*, *Paris quadrifolia*, *Leucorum vernum*, *Crepis paludosa*, *Aconitum variegatum*, *Rubus saxatilis* a p. K těmto rostlinám druží se sem tam též některé zajímavé rostliny podhorské, jež sem nejspíše až z lesu na úpatí hor Orlických rozložených zabíhají, na př. *Cerastium nitidum*,*) *Calamagrostis Halleriana*, *Senecio rivularis*, *Geum rivale*, *Cirsium rivulare* a j.** Zde vyskytují se též hojně dvě pro květenu severovýchodních Čech zvláště význačné rostliny, totiž svízel osinatý (*Galium aristatum*) a černýš úzkolistý (*Melampyrum stenophyllum*), rostliny, jež dosud pouze v severovýchodním koutě Čech na několika místech pozorovány byly. Podrost v těchto lesích tvoří hlavně lísky, vrby, svídy, brsleny, bezy, jeřáby a olše; tyto poslední rostou nejvíce na slatinných půdách, tvoříce místy pěkné olšiny, na nichž si libují některé vzácnější slatinné rostliny, na př. ostrice nedošachor (*Carex pseudocyperus*), všivec bahenní (*Pedicularis palustris*), ďablík bahenní (*Calla palustris*), vachta třílistá (*Menyanthes trifoliata*). I na pravých rašeliniskách, v těchto vlhkých lesích dosti hojných, vyskytují se místy některé vzácné rašelinné rostliny, jako: violka bahenní (*Viola palustris*) a rosnatka okrouhlolistá (*Drosera rotundifolia*). I vlhká a bažinná luka jsou v těchto lesích dosti hojná.

*) Rostlina tato, v Čechách dosud jen z hor Krkonošských a z Kladského Sněžníka známá, sestupuje zde do roviny asi tak hluboko jako v Slezsku u Vratislavi.

**) Mezi botanicky nejzajímavější partie v těchto lesích, pokud mi známy jsou, patří: Černá stráň, lesy Hradecké, za Náhonem ku Bělči se táhnoucí, a les za N. Hradcem, po obou stranách silnice k Bejčeti se prostírající.

Pravým opakem těchto míst jsou suché písčiny lesů borových, jednotvárnými lišejníky, hlavně lišejníkem sobím (*Cladonia rangiferina*) a podobnými, některými mechy, jako dvouhrotecm chvostnatým (*Dicranum scoparium*), rokytem cypřišovým (*Hypnum cupressiforme*) a pod. porostlé a nížádné rozmanitosti floristické nejevící.

Mimo pole, lesy a louky zaujímají v okolí našem důležitě místo též vody. Z řek protéká okolím našim Labe, Orlice a Bystřice. Na březích a ve vodách jejich i na březích a ve vodě četných potoků, náhonů, rybníků a tůní rostou mnohé zvláštní rostliny vodní a přírodní. I u četných pramenů a jezírek, ve vlhkých lesích Královéhradeckých hojně vznikajících, vyskytují se místy některé vzácnější rostliny.*) Z rybníků, jichž před časem v okolí Hradeckém mnoho udržováno bylo, zachovaly se podnes již nemnohé; většinou byly zrušeny a nejvíce v pole a luka přeměněny. Na těchto prozrazuje pak tvrdošijný rákos a husté sítí, sem tam hojněji se vyskytující, bývalé dno nyní již vysušených rybníků. Příkladem takových rybníků jsou veliké rybníky kolem Bohdanče druhdy rozložené (Semtínský rybník, Jezero, Rozkoň, Oplatil, Velká Čeperka), dále rybníky u Roudničky, Březhradu, Náhonu, N. Hradece, Černilova, Borku, Bohumilic a j. Některé rybníky bývají ob čas vypouštěny a nechávají se rákosím zarůstí, jež vyrostlé se seče a prodává. Na březích takovýchto rybníků, jakož i na pokraji a na pudě některých bývalých rybníků zachovaly se dosud ještě některé zajímavější rostliny přírodní, jichž však vždy víc a více ubývá; jsou to zvláště některé vzácnější, u bývalých rybníků Bohdanečských se vyskytující, rostliny, jako *Juncus capitatus*, *Cyperus fuscus*, *Gnaphalium luteoalbum*, *Centunculus minimus*, *Radiola linoides*, *Roripa austriaca*, *Potentilla norvegica*, *Lindernia pyxidaria* a pod. Některé vzácnější druhy přírodní chovají též rybníky

*) Některé z těchto pramenů jsou sádky nebo železité; z nich sráží se v lesích těchto místy železná ruda bahenní (limonit), jež nejhojněji v kusech neobyčejně velikých dobývána byla na tak zvané Škvárovec, kdež dosud ještě sem tam v hroudách 5—25 kg. těžkých se vyskytuje.

na pokraji lesů ležící, zvláště rybník u Nové Vsi a Žďáru blíže Týniště (*Hydrocotyle vulgaris*, *Potentilla norvegica*), rybník za Bělčem (*Aspidium thelypteris*, *Cicuta virosa*) a j. Nejbohatším a nejzajímavějším nalezištěm rostlin vodních a přírodních jsou však tak zvaná jezera či tůně a tiché zátoky podél Labe, zvláště ale podél Orlice od Hradce Králové až ku Borohrádku sem tam roztroušené. Tůně tyto, jichž u samého Hradce snad nejvíce se nalézají, vznikají následkem přirozených (jarních) nebo umělých (podzimních a letních) povodní Labe a Orlice, břehy své zaplavujících. *) Ze zajímavějších rostlin, na těchto místech se vyskytujících, uvádím za příklad: *Lemna polyrrhiza*, *trislea*, *Potamogeton acutifolius*, *obtusifolius*, *lucens*, *rufescens*, *perfoliatus*, *Phalaris arundinacea*, *Leersia oryzoides*, *Scirpus radicans*, *maritimus*, *Hydrocharis morsus ranae*, *Salix sericans*, **) *Rumex aquaticus*, *hydrolapathum*, *Scutellaria hastifolia*, *Ceratophyllum demersum*, *Roripa amphibia*, *terrestris*, *Sium latifolium*, *Carex Buckii* a pod.

3. Zeměznalecké a geologické poměry okolí.

Povaha půdy účinkuje s poměry klimatickými nejvíce na rozšíření jednotlivých druhů rostlinných. Tak na př. jest známo, že rostou na půdách vápnitých jiné rostliny, nežli na půdách písčitých a křemitých, a na těchto že se daří opět mnohé rostliny, jimž půda hlinitá nesvědčí. Známe-li tedy útvar půdy a rostliny, jež v té neb v oné půdě si libují, můžeme mnohdy již napřed s jakousi pravděpodobností souditi, co na tom nebo na onom místě, jehož útvar půdní známe, očekávati můžeme. Z té příčiny povšimneme si v této květeně též zeměznaleckých a geo-

*) Umělé povodně vznikají tím, že voda těchto řek uměle zaražena, zpět se ženouc, luka kolem Hradce Králové zaplavuje.

**) Rostlinu tuto, pro Čechy dosud pochybnou, našel jsem na březích Orlice mezi Hradcem Králové a Třebechovicemi velmi rozšířenou, i domnívám se, že toto stanovisko její není jediným v Čechách. nébrž že záhy i jinde ještě, zvláště podél Orlice, objevena bude.

logických poměrů okolí našeho, třeba bychom jim vzhledem ku místu a názvu spisku tohoto té pozornosti věnovati nemohli, již zasluhují.

V okolí Hradce Králové jsou nejvíce rozšířeny hlinité, písčité, jílovité a slínovité půdy. Nejvíce převládají hlinité a písčité půdy, pak jílovité. První mají obyčejně barvu rudohnědou a zovou se červenicí, nebo černohnědou a slovou černavou. Červenice i černava jsou půdy velmi úrodné, daříť se na nich všeliké druhy obilné i rozmanité zeleniny. Úrodností svou nejvíce proslul tak zv. zlatý prut, jenž od Smiřic a ku Stčezarum a odsud dále na jih se táhne. I žlutohnědé hlíny cihlářské vyskytují se v našem okolí na několika místech hojněji a užívá se jich hlavně ku děláni cihel.*)

Tyto vrstvy hlinité střídají se často s vrstvami písku a oblázků a jsou vesměs usazeninami staršími či diluvialními; místy přecházejí však tyto náplavy diluvialní v mladší usazeniny z doby alluvialní, nejvíce z šedohnědých hlin a ornice se skládající.

Jílovité a slínovité půdy (tak zv. slínoviny) vyskytují se nejvíce na místech, na nichž jsou rozšířeny slíny a slínité opuky útvaru křídového. Slíny vystupují v okolí našem jen na některých kopcích na den, po většině jsou však kryty mocnými vrstvami náplavů. Na takových místech prozrazují se pak slíny tyto, vesměs do pásma březenského a teplického patřící, nejlépe v zářezích silnic a dráhy železné.**)

Mimo ně nalézají se v okolí našem na některých místech též tvrdší opuky pásma bělohorského, jichž se v celém okolí co dobrého kamene stavebního užívá.

*) V těchto cihlářských hlinách nalézají se v našem okolí sem tam též kosti mamutů, parohy jelenů, zuby předpotopních koní, nororožců a pod.

**) Těchto slínů užívá se též co dobrého mrviva na pole, když se byly účinkem vody a vzduchu v šedé mastné jíly přeměnily; obsahují něco kysličníku draselnatého a kyseliny fosforečné, látek to, rostlinám ku zdaru nevyhnutelně potřebných a půdě stálým pěstováním rostlin ubývajících. Mimo to urychlují tyto slíny v zemi též zetlívání látek ústrojných a činí půdu teplejší a méně kyselou.

Vyjma opuku a slíny, vystupuje v okolí našem ještě čedičová hornina na povrch zemský na Hoře Kunětické a v couku jižněji od ní u Brozan vynikajícím (odkudž se pak Labem až ku Černé za bory, na druhém břehu jeho ležící, táhne). Této tvrdé horniny užívá se v okolí našem co dobrého kamene šterkového, stavebního a dlažebního. V ohledu botanickém není Hora Kunětická mnoho zajímavá, nechováť skoro žádných zvláštních druhů rostlinných, jichž bychom i jinde nenalezli (výjimkou jest pokud vím jen *Artemisia scoparia*, *Geranium columbinum*, *Saxifraga decipiens*), za to jest ale geologicky v celém okolí nejzajímavějším místem. *)

4. Klimatické poměry okolí vzhledem ku květeně.

Rozšíření rostlin v okrese našem nezávisí však jenom na útvaru půdy a vyvýšení krajiny, něbrž také u veliké míře od střední teploty a středního množství dešťů, během jednotlivých měsíců a časů ročních pozorovaných.

Dle 26letých pozorování, v Hradei Králové konaných, obnáší střední teplota a množství srážek:

	Teplota	Srážky
v lednu . . .	— 3·27°	20·04'''
v únoru . . .	— 0·81°	13·82'''
v březnu . . .	+ 1·35°	17·39'''

*) Sopečný původ a stáří její dokazují nejlépe balvany opukové na svazích tohoto osamělého kopce čedičového ležící; jsouť místy zcela vypáleny, ano i z části roztaveny. V té době, v které se severní část Čech, za doby křídové mořem zatopená, nad hladinu mořskou opět byla povznesla, stala se krajina naše jevištěm sopečné činnosti, jež i velikou část severních Čech zachvátila; žhavá hmota čedičová, na povrch zemský prorazivší a Horu Kunětickou vytvořivší, vynesla na hřbetě svém balvany opukové, trosky to vrstev útvaru křídového, dříve v okolí našem mnohem mocnější než nyní vyvinutého. Tímto výbuchem sopečným a účinkem vod byly tyto vrstvy znenáhla zrušeny a odplaveny; na místě jejich usazovaly se pak z vod, jež širokým korytem Labským a Orlickým do moře se valily, mocné náplavy nyní v okolí našem nejvíce zastoupené.

	Teplota	Srážky
v dubnu . . .	+ 6·44°	23·23'''
v květnu . . .	+ 10·71°	28·11'''
v červnu . . .	+ 14·02°	37·61'''
v červenci . .	+ 14·84°	32·31'''
v srpnu . . .	+ 14·74°	36·85'''
v září . . .	+ 11·28°	22·52'''
v říjnu . . .	+ 6·95°	17·54'''
v listopadu . .	+ 2·19°	21·98'''
v prosinci . .	— 1·10°	20·33'''
<hr/>		
V zimě . . .	— 1·73°	54·19'''
na jaře . . .	+ 6·17°	68·73'''
v létě . . .	+ 14·53°*)	106·77'''
v podzimu . .	+ 6·81°	62·04'''
<hr/>		
Ročně . . .	+ 6·445°	291·73''' = 24·31''**)

Střední teplotě roční přibližuje se nejvíce teplota středního měsíce jarního a podzimního, dubna a října. Teplota 6 měsíců jest větší teploty střední, teplota druhých 6 měsíců jest menší. Zřídka kdy klesá teplota až na -16° a přesahuje $+25^{\circ}$. Nejnížší teplota během 26 let pozorovaná byla $-24\cdot6$ (22. ledna 1850), nejvyšší $+29\cdot6^{\circ}$ (18. července 1841). Nejvíce srážek bylo pozorováno v měsících červnu, červenci a srpnu, nejméně v únoru a březnu.

Poněvadž na vývoj a ráz květeny účinkuje u veliké míře též klima čili podnebí, z té příčiny lze snadno pochopiti, proč květena Královéhradecká od květen některých jiných měst českých, jichž podnebí jest buď mírnější nebo drsnější nežli naše, se dosti značně liší.

*) Zajímavým dokladem poměrů klimatických jest réva vinná, ku zdaru svému průměrné teploty letní $+16^{\circ}$ vyžadující; poněvadž v okolí našem teplota letních měsíců (června, července a srpna) obyčejně pod tímto stupněm zůstává, nedozrávají zde častěji hrozny révy vinné, leč v polohách velmi příznivých, t. j. na místech výslunných a před větry chráněných.

**) Viz: Klimatologie von Böhmen od Karla Kreila.

Mírnější klima nežli Hradec Králové mají na př.

Střední teplota roční. Počet zimních dnů.

Litoměřice . . .	7·67 ⁰	58
Praha	7·60 ⁰	64
Ml. Boleslav . .	7·15 ⁰	64
Žatec	7·01 ⁰	74
Plzeň	6·78 ⁰	81
Krumlov . . .	6·77 ⁰	78
Podmoklí . . .	6·75 ⁰	78
Hradec Králové	6·45 ⁰	89

Drsnější podnebí mají na př.:

Střední teplota roční. Počet zimních dnů.

Tábor	6·44 ⁰	96
Strakonice . .	6·31 ⁰	94
Lauschkroun .	6·30 ⁰	94
Cheb	5·98 ⁰	93
Rychnov . . .	5·73 ⁰	100
Trutnov . . .	5·65 ⁰	111.

Vlhkostí svou předčí Hradec Králové mnohá města, s ním skoro stejně vysoko nebo nemnoho výše nebo níže ležící; obnášíť množství srážek ročních

v Hradci Králové . .	291·73'''
v Podmoklích	283·19'''
v Strakonících	274·11'''
v Žatci	268·80'''
v Budějovicích	259·66'''
v Litoměřicích	229·20'''
v Plzni	219·35'''
v Čáslavi	216·17'''
v Praze	186·43'''

Jest tedy podnebí Hradce Králové u porovnání s podnebí Prahy, jejíž průměrná teplota roční 7·60⁰ a množství srážek 186·43''' = 15·54''' činí, vlhčí a poněkud chladnější. Vlhčí podnebí našeho okolí jest příčinou toho, že v něm nalézáme mnohem více rostlin vlhka milovných nežli v suchém okolí pražském, jež, ze všech v Čechách poměrně nejteplejší,

chová za to opět více rostlin topa milovných nežli okolí naše.

Větší vlhkost okolí našeho závisí hlavně od zeměpisné polohy, větrů panujících a od rozsáhlosti lesů. Lesy, v okolí Pražském pořádku rozšířené, zabírají kolem Hradce Králové veliké prostranství, zvláště na východě. Z větrů převládají v okolí našem nejvíce dešťonosné větry jiho- a severozápadní, nejméně však suché větry jižní, jak z následující tabulky vysvítá:

	Větrů severních	východních	jižních	západních
V zimě . .	25·5	22·9	14·8	36·8 ⁰ / ₀
v jaře . .	28·2	22·3	13·5	36·0 ⁰ / ₀
v létě . .	24·3	17·3	13·9	44·5 ⁰ / ₀
v podzimu	26·2	20·9	15·6	37·3 ⁰ / ₀
Ročně . .	26·1	20·8	14·5	38·6 ⁰ / ₀

Východní a severní větry, k nám přímo s hor Krkonošských a Orlických vanoucí, činí podnebí naše, zvláště v zimě, poněkud drsnějším. Drsnost tu zjemňují však z části rozsáhlé lesy, před Hradcem daleko na východ se táhnoucí, i bylo by vykácení jich zajisté příčinou neblahé změny v podnebí celého okolí.

5. Různé útvary rostlin, v okolí zastoupené.

Závislost jednotlivých rostlin od účinků půdy, světla, tepla a vláhy roční není stejná. Některé rostliny daří se jenom na jistých půdách a v určité poloze, jiné rostou zase všude a na různých stanoviskách. Tyto rostliny nazýváme všudybytnými a rozeznáváme je od rostlin, na určitá místa více méně poutaných.

Dle různého rozšíření můžeme v okolí našem rozeznati mimo rostliny všudybytné ještě rostliny rozšířené jen na nejteplejších půdách, zvláště na půdách vápnitých a na suchých nívách Polabských, a rostliny poloh chladnějších, rostoucí hlavně ve vlhkých lesích, v bařinách i na mokřích lukách. Všechny rostliny okolí našeho lze dle toho roz-

vrhnouti ve tři větší skupiny či útvary rostlinné: A. útvar rostlin všudybytných, B. útvar rostlin poloh nejteplejších, C. útvar rostlin poloh chladnějších.

A. Útvar rostlin všudybytných.

Rostliny tohoto útvaru jsou, co se množství druhů a rozšíření týče, v okolí našem nejlépe zastoupeny. Za to však nevyrovňají se ani pěkným tvarem ani pestrobarevností svou rostlinám druhých útvarů. Tyto rostliny všudybytné či obecné nepokrývají povrch zemský všude stejně hustě, něbrž jsou též, ač méně než rostliny z ostatních útvarů, vázány na určitá stanoviště. Dle těchto různých stanovišek můžeme rostliny všudybytné rozvrci v následující skupení: a) rostliny luční a pastvinné, b) rostliny lesní a chlumní, c) rostliny bahenní, vodní a přívodní, d) rostliny polní a zahradní, e) rostliny rumné.

a) Rostliny luční a pastvinné.

Rostliny tohoto skupení vyskytují se nejvíce na lukách, trávnicích, pastvinách, trávnatých kopcích a stráních, u cest, mezi i u příkopů. *) Patří sem zejména následující: *Equisetum arvense*, *Agrostis stolonifera*, *canina*, *Alopecurus pratensis*, *Phleum pratense*, *Anthoxanthum odoratum*, *Avena pubescens*, *Deschampsia caespitosa*, *Trisetum pratense*, *Cynosurus cristatus*, *Dactylis glomerata*, *Poa pratensis*, *trivialis*, *Briza media*, *Festuca ovina*, *rubra*, *elatior*, *Bromus commutatus*, *mollis*, *tectorum*, *sterilis*, *inermis*, *Triticum repens*, *Lolium perenne*, *Luzula campestris*, *Gagea pratensis*, *Ornithogalum tenuifolium*, *Orchis morio*, *Euphorbia esula*, *cyparissias*, *Rumex acetosa*, *acetosella*, *Campanula patula*, *rotundifolia*, *Crepis biennis*, *Hieracium pilosella*, *auricula*, *umbellatum*, *Taraxacum officinale*, *Hypochoeris radicata*, *Leontodon*

*) Poněvadž v popisné části této květeny stanoviště jednotlivých druhů rostlinných zevrubně jsou udána, nejsou více roztrženy rostliny tohoto a následujících skupení na menší společnosti podle různých stanovišek.

hastilis, autumnalis, Tragopogon pratensis, Bellis perennis, Inula britannica, Chrysanthemum leucanthemum, Achillea millefolium, Artemisia vulgaris, campestris, Gnaphalium arenarium (porůznu), Tussilago farfara, Centaurea jacea, Cirsium canum, oleraceum, acaule, Scabiosa communis, Valerianella olitoria, Galium mollugo, verum, boreale, Erythraea ramosissima (porůznu), Myosotis stricta, Echium vulgare, Anchusa officinalis, Symphytum officinale, Convolvulus arvensis, Veronica serpyllifolia, hederacefolia, Alectorolophus parviflorus, grandiflorus, Euphrasia officinalis, Mentha arvensis, Thymus serpyllum, Salvia pratensis, Glechoma hederacea, Prunella vulgaris, Ajuga reptans, Plantago lanceolata, media, major, Lysimachia nummularia, Armeria vulgaris, Thalictrum minus (porůznu), angustifolium, Ranunculus acris, auricomus, repens, bulbosus, sardous (porůznu), Caltha palustris, Capsella bursa pastoris, Sthenophragma thalianum, Draba verna, Alyssum calycinum, Cardamine pratensis, Barbarea vulgaris, Holosteum umbellatum, Spergularia rubra, Arenaria serpyllifolia, Cerastium semidecandrum, triviale, arvense, Stellaria graminea, Gypsophila muralis, Saponaria officinalis, Kohlruschia prolifera, Silene inflata, Melandryum pratense, Lychnis flos cuculi, Hypericum perforatum, Erodium cicutarium, Geranium pratense, Linum catharticum, Polygala vulgaris, Carum carvi, Pimpinella saxifraga, Pastinaca sativa, Heracleum sphondylium, Daucus carota, Cerefolium silvestre, Saxifraga granulata, Sedum acre, boloniense, Agrimonia eupatoria, Sanguisorba officinalis, Alchemilla vulgaris, Potentilla reptans, verna, argentea, Spiraea filipendula, Medicago lupulina, falcata, Melilotus officinalis, albus, Trifolium precumbens, agrarium, hybridum, fragiferum (porůznu), repens, montanum, arvense, pratense, Lotus corniculatus, Vicia sepium, cracca.

b) Rostliny lesní a chlumní.

Tyto rostliny rostou nejvíce v kypré, humosní půdě lesní, méně v písčité, vřesovité a rašelinné půdě v lesích, v lesních houštinách, křovištích, mytínách, na paloučcích,

u příkopů a potoků lesních, na keřnatých stráních a pod. Mezi ně patří: *Pteris aquilina*, *Athyrium filix femina*, *Aspidium spinulosum*, *filix mas*, *Cystopteris fragilis*, *Calamagrostis epigeios*, *Anthoxanthum odoratum*, *Holcus mollis* (porůznu), *Ianatus*, *Deschampsia flexuosa*, *Danthonia decumbens*, *Melica nutans*, *Poa nemoralis*, *Festuca heterophylla* (porůznu), *Triticum caninum*, *Nardus stricta*, *Carex muricata*, *digitata*, *praecox*, *brizoides* a) *genuina*, b) *intermedia*, *pallescens*, *Luzula alba*, *Lilium martagon* (porůznu), *Gagea lutea*, *Smilacina bifolia*, *Convallaria majalis*, *Polygonatum officinale*, *multiflorum*, *Orchis maculata*, *Mercurialis perennis*, *Alnus glutinosa*, *incana* (spořeji), *Betula alba*, *Corylus avellana*, *Carpinus betulus*, *Fagus silvatica*, *Quercus pedunculata*, *sessiliflora* (porůznu), *Salix capraea*, *aurita*, *Populus tremula*, *nigra*, *Rumex sanguineus* (porůznu), *Sceleranthus perennis*, *Polygonum dumetorum*, *Ulmus campestris*, *Asarum europaeum*, *Jasione montana*, *Campanula persicifolia*, *rapunculoides*, *trachelium*, *Lapsana communis*, *Hieracium pilosella*, *auricula*, *pratense* a) *genuinum*, *murorum*, *silvaticum*, *laevigatum*, *boreale*, *Lactuca muralis*, *Erigeron acris*, *canadensis*, *Solidago virga aurea*, *Chrysanthemum corymbosum*, *Gnaphalium dioicum*, *silvaticum*, *Senecio viscosus*, *silvestris*, *Tussilago farfara*, *Eupatorium cannabinum* (porůznu), *Serratula tinctoria* (porůznu), *Cirsium palustre*, *arvense*, *acaule*, *Carlina vulgaris*, *acaulis* (spořeji), *Asterocephalus columbaria*, *Asperula odorata*, *Galium silvaticum*, *silvestre*, *aparine*, *cruciata*, *Sambucus nigra*, *racemosa*, *Viburnum opulus*, *Vinca minor*, *Erythraea centaurium*, *Pulmonaria officinalis*, *Verbascum phlomoides*, *thapsus*, *lychnitis*, *Veronica officinalis*, *Euphrasia officinalis* b) *nemorosa*, *Pedicularis silvatica*, *Melampyrum nemorosum*, *pratense*, *Thymus serpyllum*, *Calamintha clinopodium*, *Galeopsis tetrahit*, *Betonica officinalis*, *Stachys silvatica*, *Lamium maculatum*, *galeobdolon* (porůznu), *Prunella vulgaris*, *Ajuga reptans*, *genevensis*, *Primula officinalis*, *elatior*, *Calluna vulgaris*, *Vaccinium myrtillus*, *Vitis idaea*, *Ranunculus acris*, *secundiflorus*, *Pirola minor*, *Anemone nemorosa*, *ranunculoides*, *Hepatica triloba*, *Ranunculus ficaria*, *lanuginosus*, *Aquilegia*

vulgaris (porůznu), *Corydalis cava*, *digitata*, *Alliaria officinalis*, *Cardamine amara*, *Viola odorata*, *hirta*, *silvestris*, *canina*, *Möhringia trinervia*, *Stellaria nemorosa*, *holostea*, *Dianthus armeria*, *deltoides*, *Viscaria vulgaris*, *Silene nutans*, *Tilia platyphylla*, *ulmifolia*, *Hypericum montanum*, *hirsutum*, *Oxalis acetosella*, *Impatiens noli tangere*, *Geranium Robertianum*, *Acer campestre*, *pseudoplatanus*, *Evonymus vulgaris*, *Frangula alnus*, *Epilobium angustifolium*, *montanum*, *Circaea lutetiana*, *Sanicula europaea*, *Astrantia major*, *Aegopodium podagraria*, *Pimpinella magna*, *Selinum carvifolia*, *Torilis anthriscus*, *Chaerophyllum bulbosum*, *temulum*, *Hedera helix* (porůznu), *Cornus sanguinea*, *Ribes grossularia* (porůznu), *Chrysosplenium alternifolium*, *Sedum telephium*, *Mespilus oxyacantha*, *Pirus aucuparia*, *Rosa canina*, *Geum urbanum*, *Potentilla tormentilla*, *procumbens* (porůznu), *opaca*, *Fragaria vesca*, *elatior*, *Rubus idaeus*, *caesius*, *Sarothamnus vulgaris*, *Cytisus nigricans*, *Genista germanica*, *tinctoria*, *Trifolium aureum*, *montanum*, *ochroleucum* (porůznu), *medium*, *Astragalus glycyphyllos*, *Vicia silvatica*, *hirsuta*.

c) Rostliny bahenní, vodní a přívodní.

Rostliny tyto jsou hlavně rozšířeny na bažinných a rašelinných lukách, u řek, rybníků, tůní, potoků, v příkopech vodních i jinde na vlhkých místech a ve vodách tekoucích i stojatých. Jsou to zvláště: *Equisetum limosum*, *palustre*, *Lemna trisulca*, *minor*, *Potamogeton pusillus*, *obtusifolius* (porůznu), *crispus*, *lucens*, *rufescens*, *natans*, *Acorus calamus*, *Sparganium ramosum*, *simplex*, *Typha latifolia*, *angustifolia*, *Alopecurus geniculatus*, *fulvus*, *Phalaris arundinacea*, *Phragmites communis*, *Poa nemoralis* c) *fertilis*, *Glyceria fluitans*, *aquatica*, *Carex vulpina*, *leporina*, *acuta*, *flacca*, *panicea*, *pseudocyperus* (nehojná), *flava*, *paludosa*, *hirta*, *Scirpus compressus*, *maritimus*, *silvaticus*, *lacustris*, *setaceus*, *acicularis*, *palustris*, *uniglumis* (porůznu), *Juncus conglomeratus*, *glaucus*, *lamprocarpus*, *compressus*, *bufonius*, *Triglochin palustris* (porůznu), *Alisma plantago*, *Sagittaria sagittifolia*, *Iris pseudacorus*, *Callitriche*

verna, *Salix fragilis*, alba, amygdalina, purpurea, viminalis, *Rumex maritimus*, conglomeratus, aquaticus, *Polygonum amphibium*, lapathifolium, persicaria, hydropiper, *Ceratophyllum demersum*, *Inula britannica*, *Pulicaria vulgaris*, *Chrysanthemum tanacetum*, *Achillea ptarmica*, *Bidens cernuus*, tripartitus, *Gnaphalium uliginosum*, luteoalbum (porůznu), *Galium uliginosum*, palustre, *Myosotis caespitosa* (porůznu), palustris, *Convolvulus sepium*, *Solanum dulcamara*, *Scrophularia nodosa*, alata, *Limosella aquatica*, *Lindernia pyxidaria* (pořídku), *Veronica beccabunga*, anagallis, scutellata, *Mentha silvestris*, aquatica, arvensis, *Stachys palustris*, *Scutellaria galericulata*, *Lycopus europaeus*, *Utricularia vulgaris*, minor (pořídku), *Centunculus minimus* (spoře), *Lysimachia vulgaris*, *Hottonia palustris*, *Ranunculus aquatilis*, fluitans, secleratus, flammula, repens, *Caltha palustris*, *Nuphar luteum*, *Roripa palustris*, silvestris, amphibia, austriaca (spoře), *Armoracia rusticana* (nepříliš hojně), *Sagina procumbens*, *Malachium aquaticum*, *Stellaria uliginosa*, *Saponaria officinalis*, *Hypericum tetrapterum*, *Geranium palustre*, *Peplis portula*, *Lythrum hyssopifolia* (porůznu), salicaria, *Epilobium hirsutum*, parviflorum, roseum, virgatum (pořídku), palustre, *Myriophyllum spicatum*, *Cicuta virosa* (méně hojně), *Berula angustifolia*, *Oenanthe phellandrium*, *Chaerophyllum aromaticum*, *Spiraea ulmaria*.

d) Rostliny polní a zahradní.

Sem patří všechny rostliny na polích a v zahradách pěstované a četné jiné, s nimi pospolu co plevel rostoucí. Některé z nich vyskytují se hojněji i na úhorech, polních mezích i na rumištích blíže polí a zahrad.

Z obilních druhů sejí se v našem kraji hlavně: pšenice (*Triticum vulgare*), žito (*Secale cereale*), ječmen (*Hordeum distichum*), oves (*Avena sativa*), proso (*Panicum miliaceum*); mimo ty pěstují se hojně na polích ještě cukrovka (*Beta vulgaris*), řepka (*Brassica napus*), brambory (*Solanum tuberosum*), len (*Linum usitatissimum*), zřídka kdy též kuku-

řice (*Zea mais*) a rosa (*Panicum sanguinale*). Z luštěnin se hojně hrách (*Pisum sativum*), čočka (*Lens esculenta*), vikev (*Vicia sativa*), boby (*Vicia faba*), v novější době též sem tam některé jiné cizokrajné luštěniny. Z píceňích rostlin pěstuje se hlavně: vojtěška (*Medicago sativa*), ligrus (*Onobrychis sativa*), jetel (*Trifolium pratense*, *repens*, *incarnatum*), pohanka (*Polygonum fagopyrum*) a pod. V zahradách kuchyňských a zelinářských, sem tam i na polích chovají se: hlávkové zelí, kapusta, brukev, kadeřávek, karfiol (*Brassica oleracea*), tuřín (*Brassica napus*), vodnice (*Brassica rapa*), okůrky (*Cucumis sativus*), melouny (*Cucumis melo*), tykve (*Cucurbita pepo*), křen (*Armoracia rusticana*), cikorie (*Cichorium intybus*), mrkev (*Daucus carota*), petržel (*Petroselinum sativum*), celer (*Apium graveolens*), kmín (*Carum carvi*), kopr (*Anethum graveolens*), anýz (*Pimpinella anisum*), fenykl (*Foeniculum capillaceum*), špenát (*Spinacia oleracea*), řetkev (*Raphanus sativus*), mák (*Papaver somniferum*), rajská jablčka (*Solanum lycopersicum*), fasole (*Phaseolus vulgaris*, *multiflorus*), červená řípa (*Beta vulgaris*), špargl (*Asparagus officinalis*), cibule (*Allium cepa*), česnek (*Allium sativum*), pažitka, por a p. Zřídka se sází též topinambur (*Helianthus tuberosus*), konopí (*Cannabis sativa*) a n. j.

Z ovocných stromů a keřů daří se v našem okolí hlavně: švestka (*Prunus domestica*), trnostlva (*Prunus insititia*), hruška (*Pirus communis*), jablko (*Pirus malus*), višně (*Prunus cerasus*), třešně (*Prunus avium*), meruňka (*Prunus armeniaca*), broskev (*Prunus persica*), mišpule (*Mespilus germanica*), ořech (*Juglans regia*), moruše (*Morus alba*), réva vinná (*Vitis vinifera*), maliny (*Rubus idaeus*), ryvíz (*Ribes rubrum*), srstka (*Ribes grosullaria*), líska (*Corylus avellana*) a j.

Mezi nejrozšířenější plevely patří: *Panicum glabrum*, *crus galli*, *Agrostis spica venti*, *Setaria glauca*, *viridis*, *Avena fatua*, *Bromus secalinus*, *Triticum repens*, *Lolium remotum*, *temulentum*, *Euphorbia exigua*, *peplus*, *helioscopia*, *esula*, *Rumex acetosella*, *Polygonum convolvulus*, *Scleranthus annuus*, *Amaranthus retroflexus*, *Crepis virens*, *tectorum*,

Sonchus arvensis, *Hypochoeris glabra*, *Anthemis arvensis*, *ruthenica* (sem tam), *Matricaria inodora*, *chamomilla*, *Filago germanica*, *arvensis*, *minima*, *Gnaphalium uliginosum*, *Tussilago farfara*, *Centaurea cyanus*, *Cirsium arvense*, *Valerianella olitoria*, *Morisonii*, *Myosotis intermedia*, *versicolor*, *hispida*, *Sherardia arvensis*, *Galium aparine*, *Lithospermum arvense*, *Echium vulgare*, *Lycopsis arvensis*, *Convolvulus arvensis*, *Cuscuta epithymum*, *Linaria spuria* (pořídku), *arvensis*, *Veronica arvensis*, *triphylla*, *persica*, *verna* (sem tam), *agrestis*, *polita*, *hederacfolia*, *Alectorolophus grandiflorus*, *Euphrasia odontites*, *Melampyrum arvense*, *Mentha arvensis*, *Galeopsis ladanum*, *tetrahit*, *Stachys palustris*, *Lamium amplexicaule*, *purpureum*, *Anagallis arvensis*, *Adonis aestivalis*, *Myosurus minimus*, *Itanunculus arvensis*, *Delphinium consolida*, *Papaver rhoeas*, *argemone*, *Fumaria officinalis*, *Thlaspi arvense*, *Lepidium campestre*, *Stenophragma thalianum*, *Draba verna*, *Neslia paniculata*, *Camelina microcarpa*, *foetida*, *Erysimum cheiranthoides*, *Sinapis arvensis*, *Raphanus raphanistrum*, *Viola tricolor*, *Herniaria glabra*, *Spergula pentandra*, *arvensis*, *Arenaria serpyllifolia*, *Gypsophila muralis*, *Melandryum noctiflorum*, *Agrostemma githago*, *Hypericum humifusum* (porůznu), *Aethusa cynapium*, *Alchemilla arvensis* (pořídku), *Trifolium agrarium*, *arvense*, *Vicia lathyroides*, *tetrasperma*, *Lathyrus tuberosus*.

e) Rostliny rumné.

Jsou nejvíce rozšířeny na návších, u cest, na mezích, v příkopech, u zdí, plotů, na rumištích a podobných místech. Patří sem jmenovitě: *Poa annua*, *compressa*, *Bromus sterilis*, *tectorum*, *Triticum repens*, *Lolium perenne*, *Hordeum murinum*, *Euphorbia helioscopia*, *Mercurialis annua*, *Rumex crispus*, *acetosa*, *Polygonum aviculare*, *lapathifolium*, *persicaria*, *Schizotheca hastata*, *Chenopodium bonus Henricus*, *hybridum*, *polyspermum*, *glaucum*, *rubrum*, *urbicum*, *album*, *vulvaria*, *Urtica urens*, *dioica*, *Bryonia alba* (porůznu), *Cichorium intybus*, *Sonchus laevis*, *asper*, *Lactuca saligna*.

(porůznu), scariola, *Taraxacum officinale*, *Inula britannica*, *Anthemis austriaca*, *arvensis*, *ruthenica* (porůznu), *cotula*, *Matricaria inodora*, *Artemisia absinthium*, *vulgaris*, *campestris*, *Senecio viscosus*, *Lappa bardana*, *Onopordon acanthium*, *Carduus nutans*, *acanthoides*, *Cirsium lanceolatum*, *Dipsacus silvestris*, *Solanum nigrum*, *Datura stramonium*, *Ilyoscyamus niger*, *Verbascum lychnitis*, *Verbena officinalis*, *Glechoma hederacea*, *Nepeta cataria*, *Ballota nigra*, *Lamium album*, *Leonurus cardiaca*, *Plantago major*, *Ranunculus repens*, *Lepidium ruderales*, *Capsella bursa pastoris*, *Chamaeplium officinale*, *Malva rotundifolia*, *silvestris*, *Stellaria media*, *Geranium pusillum*, *Erodium cicutarium*, *Aethusa cynapium*, *Pastinaca sativa*, *Geum urbanum*, *Potentilla anserina*.

B. Útvar rostlin poloh nejteplejších.

Rostliny tohoto útvaru jsou rozšířeny výhradně v nejteplejší části našeho okolí, nejvíce v nížině Polabské a na suchých kopcích vápnitých i na teplých úklonech, na jih se svažujících. Květena Polabská, jež svým zvláštním rázem od jiných dobře se liší, jest vyvinuta v Čechách nejlépe mezi Pardubicemi a Litoměřicemi vysílající výběžky své na všechny strany, na př. na sever až za Hradec, na východ až za Choceň. Mezi význačnější druhy květeny této, v našem okolí se vyskytující, patří: *Aspidium thelypteris*, *Potamogeton acutifolius*, *densus*, *pectinatus*, *perfoliatus*, *Carex paradoxa*, *Buekii*, *Juncus capitatus*, *Allium acutangulum* a) *pratense*, *scorodoprasum*, *Galanthus nivalis*, *Xanthium strumarium*, *Arnoseris pusilla*, *Anthemis ruthenica*, *Dipsacus laciniatus*, *Myosotis caespitosa*, *Verbascum blattaria*, *Linaria spuria*, *Gratiola officinalis*, *Marrubium vulgare*, *Chaeturus marrubiastrum*, *Scutellaria hastifolia*, *Teucrium scordium*, *Adonis flammeus*, *Ranunculus polyanthemus*, *Nymphaea candida*, *Stellaria palustris*, *Melandryum silvestre*, *Cucubalus baccifer*, *Malva pusilla*, *Scandix pecten Veneris*, *Falcaria Rivini*, *Sium latifolium*, *Seseli libanotis*. K těmto vzácnějším rostlinám Polabským druží se ještě

jiné rostliny, v Polabské nížině i jinde na teplejších polohách hojněji rozšířené, totiž: *Lemna polyrrhiza*, *Panicum sanguinale*, *Leersia oryzoides*, *Setaria verticillata*, *Aira caryophylla*, *Phleum Boehmeri*, *Koeleria cristata*, *Festuca pinnata*, *Bromus erectus*, *Hordeum murinum*, *Carex brizoides* c) *Schreberi*, *tomentosa*, *Scirpus radicans*, *Gagea minima*, *Anthericum ramosum*, *Butomus umbellatus*, *Platanthera solstitialis*, *Euphorbia platyphylla*, *Schizotheca rosca*, *Loranthus europaeus*, *Campanula glomerata*, *Pieris hieracioides*, *Chondrilla juncea*, *Inula salicina*, *Artemisia scoparia*, *Centaurea paniculata*, *scabiosa*, *Carduus nutans*, *Asteroccephalus columbaria* c) *ochroleucus*, *Asperula cynanchica*, *Adoxa moschatelina*, *Ligustrum vulgare*, *Vinea minor*, *Vincetoxicum officinale*, *Gentiana ciliata*, *amarella*, *Asperugo procumbens*, *Cynoglossum officinale*, *Echinosperrnum lappula*, *Omphalodes scorpioides*, *Myosotis sparsiflora*, *Cerinthe minor*, *Nonnea pulla*, *Datura stramonium*, *Verbascum phoeniceum*, *Linaria minor*, *Antirrhinum orontium*, *Melampyrum cristatum*, *Veronica teucrium*, *prostrata*, *spicata*, *verna*, *Origanum vulgare*, *Calamintha acinos*, *Prunella grandiflora*, *Melittis melissophyllum*, *Galeopsis ladanum*, *Stachys annua*, *Myosurus minimus*, *Nigella arvensis*, *Papaver dubium*, *Corydalis digitata*, *Teesdalia nudicaulis*, *Thlaspi perfoliatum*, *Lepidium campestre*, *ruderales*, *Alyssum incanum*, *calycinum*, *Turritis glabra*, *Arabis contracta*, *Sisymbrium sophia*, *Diplo-taxis muralis*, *Reseda lutea*, *Viola mirabilis*, *Helianthemum chamaecistus*, *Kohlrauschia prolifera*, *Dianthus armeria*, *Carthusianorum*, *superbus*, *Viscaria vulgaris*, *Silene nutans*, *Geranium columbinum*, *sanguineum*, *Malva alcea*, *Bupleurum falcatum*, *Seseli coloratum*, *Peucedanum cervaria*, *oreoselinum*, *Laserpitium pruthenicum*, *Conium maculatum*, *Cornus mas*, *Ribes grossularia*, *Saxifraga tridactylites*, *Rosa gallica*, *trachyphylla*, *rubiginosa*, *Potentilla alba*, *verna*, *canescens*, *Fragaria collina*, *Spiraea filipendula*, *Prunus chamaecerasus*, *Ononis spinosa*, *Anthyllis vulneraria*, *Trifolium incarnatum*, *alpestre*, *medium*, *Astragalus cicer*, *Coronilla varia*, *Onobrychis viciaefolia*, *Vicia lathyroides*, *dumetorum*, *cassubica*.

C. Útvar rostlin poloh chladnějších.

Rostliny tohoto útvaru obývají nejvíce v stinných a vlhkých lesích, na vlhkých a rašelinných lukách, v slatinných olšinách i na jiných, polohou chladnějších, stanovištích; sem patří zvláště: *Equisetum silvaticum*, *Polypodium vulgare*, *dryopteris*, *phlegopteris*, *Aspidium cristatum*, *thelypteris*, *Ophioglossum vulgatum*, *Lycopodium annotinum*, *clavatum*, *Calla palustris*, *Milium effusum*, *Calamagrostis lanceolata* b) *Halleriana*, *arundinacea*, *Hierochloë australis*, *Molinia varia*, *Festuca gigantea*, *Bromus asper*, *Triticum caninum*, *Carex pulicaris*, *Davalliana*, *paniculata*, *paradoxa*, *leporina*, *echinata*, *elongata*, *canescens*, *remota*, *disticha*, *umbrosa*, *pilulifera*, *flacca*, *panicea*, *silvatica*, *flava*, *vesicaria*, *ampullacea*, *riparia*, *filiformis*, *Scirpus ovatus*, *Eriophorum polystachium*, *angustifolium*, *Cyperus fuscus*, *flavescens*, *Juncus filiformis*, *fuscoater*, *Luzula verualis*, *Paris quadrifolia*, *Colchicum autumnale*, *Orchis latifolia*, *maculata*, *Epipactis latifolia*, *Neottia nidus avis*, *Listera ovata*, *Leucojum vernum*, *Euphorbia dulcis*, *Mercurialis perennis*, *Polygonum bistorta*, *Salix pentandra*, *repens*, *Daphne mezereum*, *Phyteuma spicatum*, *Campanula cervaria*, *Crepis palustris*, *succisacfolia*, *Hieracium stoloniflorum*, *Prenanthes purpurea*, *Scorzonera humilis*, *Arnica montana*, *Achillea ptarmica*, *Senecio rivularis*, *Centaurea jacea* b) *decipiens*, c) *pratensis*, *Cirsium palustre*, *rivulare*, *Succisa pratensis*, *Valeriana officinalis*, *dioica*, *Galium aristatum*, *Menyanthes trifoliata*, *Gentiana pneumonanthe*, *Atropa belladonna*, *Veronica longifolia*, *Pedicularis silvestris*, *palustris*, *Melampyrum nemorosum*, *Lathraea squamaria*, *Orobanche procer*a, *Trientalis europaea*, *Primula elatior*, *Monotropa hypopitys*, *Pirola rotundifolia*, *Monesis grandiflora*, *Chimophila umbellata*, *Thalictrum aquilegiaefolium*, *Trollius europaeus*, *Aconitum variegatum*, *Cardamine bulbifera*, *enneaphylla*, *Drosera rotundifolia*, *Parnassia palustris*, *Viola palustris*, *hirta*, *stagnina*, *Cerastium glomeratum*, *Stellaria nemorosa*, *Dianthus deltoides*, *Epilobium tetragonum*, *Hydrocotyle vulgaris*, *Astrantia major*, *Peucedanum palustre*, *Cicuta virosa*, An-

gelica silvestris, *Rosa alpina*, *Geum rivale*, *Rubus saxatilis*, *glandulosus*, *Cytisus capitatus*, *Lotus uliginosus*, *Vicia silvatica*, *Lathyrus silvestris*, *niger*.

Dodatek a vysvětlení znamení a skrácenin.

V seznamu rostlin, nyní následujícím, jsou jednotlivé druhy sestaveny dle Prodromu květeny české od Dra. Lad. Čelakovského, v kterémžto díle jest též podrobný popis a povšechné rozšíření jejich po Čechách obsaženo; k určování jejich hodí se nejlépe Analytická květena česká od téhož p. spisovatele. Stanoviska rostlin všudyhytných či obecných nejsou udána (jen výjimkou uvádí se tu a tam některé za příklad), poněvadž rostliny tyto jsou po celém okolí rozšířeny. Stanoviska rostlin vzácnějších, jen sem tam roztroušených, jsou, pokud mi známa byla, podrobně udána; ! značí, že jsem rostlinu na místě udaném sám našel; jména jiných nálezců vzácnějších rostlin jsou skrácena: (Č.) = Dr. L. Čelakovský, (K.) = Dr. Knaf sen., (O.) = M. Opic, (P.) = prof. Presl, (Čen.) = Čeněk, (R.) = Reichel, (Kr.) = Kratzmann, (Sp.) = Špořil, (T.) = prof. Tausch.

U některých druhů, čísly označených, jsou uvedena též důležitější plemena, od některých botaniků za druhy považovaná, pod písmeny a), b), c); řeckými písmeny α), β), γ) označeny jsou některé význačnější odrůdy.

p., *ampl.* a *em.* za jménem autora botanického znamenají partim, amplius a emendata definitione, to jest, že druh nebo rod, takto označený, jen z části se rovná rodu nebo druhu spisovatelem původně míněnému, nebo že pojem druhu nebo rodu poopraven byl.

þ značí keř nebo strom, ʒ rostlinu mnoholetou, ☉ dvouletou neb ozimou, ☼ jednoletou; × znamená míšence ze dvou druhů vzniklého; † rostliny na polích, v zahradách a sadech pěstované aneb zdivočilé; * značí rostliny vubec vzácné nebo v našem okolí pořádku rozšířené.

II.

Seznam všech v okolí Královéhradeckém

dosud pozorovaných samorostlých a obecně pěstovaných
rostlin cévnatých a stanovisek jejich.

I. Třída. Cévnatě tajnosrubné rostliny.

1. Řád. *Equisetaceae* DC. Přesličkovité.

1. *Equisetum arvense* L. Přeslička polní. α) erectum, přímá. Obecná na lukách, polích, v lesích na pasekách, v písčité i jílovité půdě. β) decumbens, položená; hojnější na písčitých půdách. γ) nemorosum, hajní; v lesích. — ž. bř.-dub.
2. *Equisetum silvaticum* L. P. lesní. V stinných a vlhkých lesích, ve vlhkých pasekách, podél potůčků a struh lesních velmi rozšířená. — ž. dub-čn. — Zvláště hojná v lesích Hradeckých, Novohradeckých, Týnišťských, Borohrádeckých a j.!
3. *Equisetum limosum* L. P. mokřadní. V tůních, lesních mokřadech, u rybníků, na pokrajích mělkých zátok hojná. — ž. čn-čnec. — Na př. v tůních Orlických, v mokřadech vlhkých lesů kolem Hradce Králové a j.!
4. *Equisetum palustre* L. P. bahenní. Ve vlhkých příkopech, na bahnitých lukách, na vlhkých mezích a písčínách obecná. — ž. kv-říj.

2. Řád. *Polypodiaceae* R. Br. Osladičkovité.

5. **Polypodium vulgare* L. Osladič obecný. V stinných lesích, v skulinách opukových i jiných skal. — ž. zář-říj. — V bližším okolí Hradce Králové schází, několik kusů našel jsem teprve ve Velkém lese u Borohrádku.
6. *Polypodium phegopteris* L. O. bukovinný. Ve vlhkých lesích, zvláště podél vlhkých příkopů lesních místy dosti

hojný. — 4. čn-zár. — V lesích Hradeckých mezi Svinary a Bělčem a j.!

7. **Polypodium dryopteris** L. O. doubravní. V stinných, vlhkých lesích; místy hojný. — 4. čnec-zár. — V lesích Hradeckých za Malšovicemi i jinde.!
8. ***Polypodium Robertianum** Hoffm. O. vápenní. Roste ve skulinách hradebních, zvláště hojně na hradbách, podél Orlice ku plovárně se táhnoucích, na kamenném mostě, přes ni vedoucím, i mezi zdmi severních hradeb Hradeckých. — 4. čnec-srp.
9. **Pteris aquilina** L. Hasivka orličí. V stinných lesích, na pasekách, v písčité a vřesovinné půdě velmi rozšířená. — 4. čnec-zár. — Lesy Hradecké, Novohradecké, na sv. Jánském kopci, u Libišan, Borohrádku, Týniště a j.!
10. **Asplenium ruta muraria** L. Slezinník routička zední. a) rotundifolium, okrouhlolistý. Ve skulinách hradeb, starých zdí, skal. hojná. — 4. čnec-zár. — Hradby a kamenné mosty Hradce Králové, Kunětická Hora.!
11. **Asplenium trichomanes** L. S. červený. a) vulgare, obecný. Rozšířen jako předešlý, častěji též a ním pospolu. — 4. čnec-zár. — Hradby Hradce Králové, Hora Kunětická.!
12. **Athyrium filix femina** Roth. Papratka samice. V stinných a vlhkých lesích, na lesních pasekách velmi rozšířená. — 4. čnec-zár. — Velmi hojná ve vlhkých lesích kolem Hradce Králové, Týniště, Borohrádku a j.!
13. **Aspidium spinulosum** Sw. Kaprad ostnitý. b) genuinum, pravý. Na těchže místech jako předešlý a s ním stejně rozšířený. — 4. čnec-říj.
14. ***Aspidium cristatum** Sw. K. hřebenitý. Ve vlhkých lesích, zvláště v mokřích olšinách pořádku; hojněji vyskytuje se v lese za mlýnem Malšovickým a ve vlhkých lesích mezi Svinary a Bělčem. — 4. čnec-zár.
15. **Aspidium filix mas** Sw. K. samec. V stinných a vlhkých lesích, však méně hojný, nežli útlejší papratka samičí. — 4. čnec-zár. — Na př. v lesích Hradeckých a j.!
16. ***Aspidium thelypteris** Sw. K. buhenní. Ve vlhkých olšinách, v mokřadech rašelinných porůznu. — 4. čnec-zár. — V lese za Novým Hradcem spoře, hojně na bařinách v lesích blíže Bělče a na bařině na pokraji lesa u Stěblové, v neobyčejném množství u rybníka na Náhonu za Bělčem! u Bohdanče (Mann).
17. **Cystopteris fragilis** Bernh. Puchýřník křehký. Ve vlhkých lesích, v skulinách skalních, hradebních i mostních hojný. — 4. čnec-zár. — Hradby a mosty kamenné v Hradci Králové, lesy Hradecké, Kunětická Hora a j.!

3. řád. **Ophioglosseae** R. Br. Vratíčkovité.

18. ***Ophioglossum vulgatum** L. Hadí jazyk obecný. Na mokřích lukách lesních, dosud jen v lese u Nového Hradce. (Čen.) — 4. čn-čnec.

4. Řád. *Lycopodiaceae* Rich. Plavuňovitě.

19. **Lycopodium annotinum* L. Plavuň pučivá. V stinných lesích, zvláště ve vlhkém křoví napříliš hojná. — 4. čnec-srp. — Na rašeliništích v olšíně lesní za N. Hradcem nehojná, za „Černou strání“ v lesích Hradeckých. !
20. *Lycopodium clavatum* L. P. obecná. V stinných lesích i na pokraji jejich místy dosti hojná. — 4. čnec-srp. — Hojněji na př. v lesích pod Klukem, v lesní olšíně pod N. Hradcem, v lesích za N. Hradcem a j. !
21. **Lycopodium complanatum* L. P. sploštělá. a) genuinum, pravá. V jehličnatých i lupenatých lesích na vlhké mechovitě půdě, dosud jen v lesích za N. Hradcem. (Čen.) — 4. čnec-srp.

II. Třída. Nahosemenné rostliny. *Gymnospermeae*.1. Řád. *Coniferae* Juss. Jehličnaté.

22. † *Taxus baccata* L. Tis obecný. Sází se porůznu v sadech a zahradách. — 8. bř.-dub.
23. *Juniperus communis* L. Jalovec obecný. a) montana, pahorečný. V lesích jehličnatých, nejvíce na písčitých nebo vřesovinných půdách, nepřilíš hojný. — 8. dub-kv. — V lesích kolem Hradce Králové, Týniště, Borohrádku a j. !
24. *Pinus silvestris* L. Borovice lesní. Na písčitých půdách skládá místy celé lesy. — 8. kv. — Na př. v borových lesích Polabských, Hradeckých, Týništských, Borohrádeckých a j. !
- **Pinus montana* L. B. horská. Nalézá se, dle zprávy ústně mi sdělené, v lesích Novohradeckých, nejspíše jen zavlečená se semeny jiných jehličnatých rostlin.
25. *Abies alba* Mill. Jedle. V jehličnatých lesích méně hojná, nežli následující. — 8. kv. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých a j. !
26. *Abies picea* Mill. Smrk. Skládá z veliké části rozsáhlé lesy, za Hradcem Král., N. Hradcem, kolem Týniště, Borohrádku a j. se rozkládající. ! — 8. kv.
27. *Abies larix* Lam. Modřín. V lesích kolem Hradce Kr. jednotlivě vtroušen, chová se též porůznu v parcích i u stavení vonkovských; staré, mohutné kmeny jsou však vzácné. — 8. kv. — Na př. v lesích Novohradeckých a j. !

V sadech a zahradách sázejí se z jehličnatých mimo tyto ještě pořádku chvojka (*Juniperus sabina*), jalovec virginický (*Juniperus virginiana*), zerav východní (*Thuja orientalis*) a zerav západní (*Thuja occidentalis*).

III. Třída. Jednoděložné rostliny. *Monocotyledoneae*.1. Řád. *Lemnaceae* Link. Okřehkovitě.

28. *Lemna trisulca* L. Okřehok trojhrázdý. V tůních i jinde v stojatých vodách obecný. — 4. dub-kv. — (Květe

však, tak jako následující druhy, jen zřídka kdy.) — Na př. v tůních a zátokách Orlických velmi hojný.!

29. **Lemna minor** L. O. menší. V stojatých vodách, jež někdy zcela pokrývá, ze všech nejobecnější. — 4. kv-čn.
30. ***Telmatophace polyrrhiza** Godron. O. mnohokořenný. V stojatých a zvolna plynoucích vodách méně rozšířený nežli předešlé, místy však hojný. — 4. kv-čn. — V tůních Orlických kolem Hradce Král., v Bystřici, na př. u Puchlovic a j.!

2. Řád. Najadeae A. Rich. Řečankovitě.

31. ***Potamogeton densus** L. Rdest hustolistý. Dosud nalezen jen v rybnících u Bohdanče. (T.) — 4. čnec-srp.
32. ***Potamogeton pectinatus** L. R. hřebenitý. V stojatých a mírně tekoucích vodách, dosud jen u Bohdanče. (Čel.) — 4. čnec-srp.
33. **Potamogeton pusillus** L. R. maličký. β) angustifolius, úzkolistý. V strouhách a příkopech, ve vodních kalužích i v potocích místy velmi hojný. — 4. čnec-srp. — Na př. ve vodních příkopech podél dráhy sev.-západní u Slezského předměstí a j.! γ) *tenuissimus, nejtenší. V kalužích u Libišan.!
34. ***Potamogeton obtusifolius** Mert. et Koch. R. tupolistý. V tůních a rybnících pořádku. — 4. čnec-srp. — V tůních Orlických nepříliš hojný.!
35. ***Potamogeton acutifolius** Link. R. špičatolistý. V stojatých i mírně tekoucích vodách, porůznu. — 4. čnec-srp. — V tůních Orlických u Malšovic a j. V bývalých rybnících u Bohdanče (Čen.).
36. **Potamogeton crispus** L. R. kadeřavý. V stojatých i plynoucích vodách místy velmi hojný. — 4. čnec-srp. — Na př. ve vodních příkopech podél dráhy severo-západní na několika místech, v náhonech kolem Hradce Kr., v strouhách u Březhradu i v lese za N. Hradcem. β) planifolius, plocholistý. V celém okolí dosti rozšířený na př. v strouhách vodních za Malšovicemi, u Stěblové, u Svobodných Dvorů; místy přechází též v odrůdu γ) *angustifolius, úzkolistý.
37. ***Potamogeton perfoliatus** L. R. prorostlý. Jako předešlý místy hojný. — 4. čnec-srp. — V stojatých i plynoucích vodách Orlice, ve vodních strouhách u Březhradu.!
38. ***Potamogeton lucens** L. R. světlý. V stojatých a mírně tekoucích vodách jako předešlý rozšířen. — 4. čnec-srp. — Na březích i v tůních Orlice místy velmi hojný. U Bohdanče (O.).
39. ***Potamogeton gramineus** L. R. trávovitý. Ve vodách zvolna tekoucích i v rybnících porůznu. — 4. čnec-srp. — α) graminifolius, trávolistý. β) heterophyllus, různolistý, spolu s α) u Bohdanče, v bývalém rybníku Rozkoši (O.); γ) Zizii. Zizův, u Bohdanče v bývalých rybnících (O.).
40. ***Potamogeton rufescens** Schrad. R. červenavý. Jako

předešlý, však místy hojný a nejspíš i dosti rozšířený. — ♀ čnec-srp. — V tůních Orlických kolem Malšovic, v tůních Labských blíže Správněc!

41. **Potamogeton natans** L. R. vzplývavý. a) vulgaris, obecný. V tůních a zátokách Orlice, Bystřice i jinde v stojatých neb mírně tekoucích vodách hojný; b) *fluitans, proudící, pořádku v Orlici! — ♀ čnec-srp.

3. Řád. **Aroideae** Juss. Aronovitě.

42. **Acorus calamus** L. Puškvorec. V mokřadech, strouhách vodních, na kraji rybníků a tůní obecný. — ♀ čn-čnec.
43. ***Calla palustris** L. Ďablík bahenní. V bažinatých olšinách, dosud nalezen jen u rybníka Týništského ve větším množství! — ♀ čn-čnec.

4. Řád. **Typhaceae** DC. Orobinovitě.

44. **Sparganium ramosum** Huds. Zevar větvnatý. Na pokraji tůní, příkopů vodních i u rybníků obecně rozšířený. — ♀ čnec-srp. — Na př. u rybníka Diveckého, na pokraji tůní Orlických, v lesích Hradeckých a j. !
45. **Sparganium simplex** Huds. Z. jednoduchý. a) erectum, přímý. Na těchže místech jako předešlý, někdy s ním též pospolu, však jak se zdá mnohem řidší. — ♀ čnec-srp.
46. **Typha latifolia** L. Orobinec široolistý. V tůních, ve vodních příkopech podél dráhy železné, dosti obecný. — ♀ čn-čnec. — Na př. podél dráhy sev.-západní, u nádraží Hradeckého a jinde na mnoha místech. !
47. **Typha angustifolia** L. O. úzkolistý. Jako předešlý, ač snad méně hojně rozšířený. — ♀ čn-čnec. — Na př. podél dráhy sev.-západní u Slezského předměstí a j. !

5. Řád. **Gramineae** Juss. Trávy.

48. † **Zea mais** L. Kukuřice. Pěstuje se v malém množství, na př. v některých zahradách kolem Hradce Králové! — ♂ čnec-srp.
49. **Panicum glabrum** Gaud. Rosička holá. Na písčínách, podél cest i na polích, dosti hojně rozšířená. — ♂ čnec-zář. — Na př. u N. Hradce, na písčínách za Zámčkem, na polích u Malšovic a j. !
50. **Panicum sanguinale** L. Rosička krvavá. a) vulgare, obecná. Roste divoce sem tam na písčitých polích a v zahradách! místy pěstuje se též na polích (Č.), ač nyní snad již jen pořádku. — ♂ čnec-zář.
51. † **Panicum miliaceum** L. Proso obecné. Seje se hojně na písčitých půdách a někdy též zdivočuje, na př. na polích u Malšovic a j. ! — ♂ čnec-srp.

52. **Panicum crus galii** L. P. kuří noha. Na vlhkých místech blíže vesnic, na polích, v zahradách, dosti hojně. — ☉ čnec-srp. — Na př. na polích u Mašovic, na potočí Labě, poblíže rybníků kolem Stěblové a j. !
53. **Setaria glauca** Beauv. Bér sivý. Na písčitých polích, na pustých místech dosti obecný. — ☉ čnec-srp. — Na př. na polích kolem Hradce Kr. za Březhradem, u Borohrádku a j. !
54. **Setaria viridis** Beauv. B. zelený. Na polích a na pustých místech obecný. — ☉ čnec-srp.
55. ***Setaria verticillata** Beauv. B. přestlenatý. Vyskytuje se někdy kolem Hradce Král. v zahradách nebo na polích, při setí jiných rostlin zavlečen. (Sp.) — ☉ čnec-srp.
56. ***Milium effusum** L. Pšeníčko rozkladité. V stinných a vlhkých lesích porůznu. — ž. kv-čn. — V lesích Hradeckých a Novohradeckých nehojně. !
57. ***Leersia oryzoides** Sw. Tajnička rýzovitá. Na vlhkých březích řek, rybníků a tůní místy hojná. — ž. srp-zář. — Na potočí Orlice na př. u Slezského předměstí, u tůní Orlických kolem Hradce Kr. a j.
58. **Agrostis stolonifera** L. Páineček výběžkatý. a) diffusa, rozkladitý i b) coarctata, stažený. Na lukách suchých i na vlhkých pastvinách, písčitých mezích, lesních mýtinách, suchých hájích, obecný. — ž. čn-srp.
59. **Agrostis canina** L. P. obecný. Na lukách i v lesích vlhkých dosti rozšířen. — ž. čnec-srp. — Na př. na lukách mezi Hradcem Kr. a Březhradem, u Střebše, Mašovic a j. u velikém množství. !
60. **Agrostis spica venti** L. P. chundelka. Na polích v obilí, na písčitých pastvinách místy co plevel dosti hojný. — ☉ čn-čnec. — Na př. na písčitých polích kolem Hradce Kr. a j. !
61. **Calamagrostis epigeios** Roth. Třtina křovištní. V suchších lesích, zvláště na mýtinách, též v křovi na porůžích hojně rozšířena. — ž. čn-čnec. — Na př. v lesíku na sv. Jánském kopci, v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j. !
62. ***Calamagrostis lanceolata** Čel. b) Halleriana. T. kopinatá b) horní. V stinných, vlhkých lesích místy hojná. — ž. čnec-srp. — V lesích Hradeckých a Novohradeckých, kamž nejapíše z výše položených lesů Orlických zabíhá.
63. ***Calamagrostis arundinacea** Čel. a) silvatica. T. rákosovitá a) lesní. V suchších lesích, zvláště v houští lesním, hojně rozšířená; někdy též spolu s předešlou. — ž. čn-čnec. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých, u Slatian, Borohrádku a j. !
64. **Alopecurus pratensis** L. Psárka luční. a) virens, zelená. Na lukách, travnatých mezích obecná. — ž. kv-čn.
65. **Alopecurus geniculatus** L. P. kolínkatá. Ve vlhkých příkopech, na březích tůní dosti obecná. — ž. kv-čnec. — Na př. v příkopech silničních za Slezskou brunou, u Mašovic a j. !

66. *Alopecurus fulvus* Smith. P. plavá. Na těchže místech, jako předchá. však jak se zdá méně hojná. — 4. kv-čnec. — Na př. podél močálů v lesích Hradeckých a j.!
67. *Phleum pratense* Schrober. Bojíněk luční. a) vulgare, obecný. Na lukách, travnatých mezích, na pokraji lesů, na hradbách i u cest obecně rozšířený. — 4. čn-srp.
68. **Phleum Boehmeri* Wib. B. Boehmerův. Na suchých písčitých kopech, výslunných stráních porůdku. — 4. čn-čnec. — Na Kunětické Hoře! a nejspíš i jinde.
69. *Phalaris arundinacea* L. Lesknice rákosovitá. Na pokraji rybníků, příkopů vodních, u vod i na mokřích lukách hojně rozšířená. — 4. čn-čnec. — Na př. podél tůní u Střebše, Malšovic a j., též u náhonů kolem Hradce Kr., Smiřic atd.!
70. *Anthoxanthum odoratum* L. Tomka vonná. Na úrodných lukách, lesních paloučích a pod. obecná. — 4. kv-čnec.
71. **Hierochloë australis* Röm. et Schult. Tomkovice jižní. Ve vlhkých a stinných lesích a hájích porůznu. — 4. dub-kv. — V lesích Hradeckých a Novohradeckých dosti rozšířena.!
72. *Holcus mollis* L. Medyněk měkký. Na pokraji lesů, v suchých mýtinách i na mezích místy hojný, však řidčeji rozšířený, nežli následující. — 4. čnec-srp. — V lese za N. Hradcem, na pasekách v lesích Hradeckých na př. za Svinary, v lesích za Stěblovou pod Horou Kunětickou! a j.
73. *Holcus lanatus* L. M. vlnatý. Na vlhkých lukách, mezích i v lesích, v mýtinách, obecný. — 4. čn-zář.
74. *Arrhenatherum avenaceum* Beauv. Ovsík obecný. Na lukách, pastvinách, travnatých mezích i v lesích obecně rozšířen. — 4. čn-srp.
75. †*Avena sativa* L. Oves setý. a) diffusa, rozkladitý. Seje se hojně na polích a místy též zdivočuje. — ☉ čnec-srp.
76. *Avena fatua* L. O. hluchý. a) hirsuta, srstnatý. Vyskytuje se sem tam hojněji mezi osením i na pustých místech. — ☉ čnec-srp. — Na př. na polích u Plácek. Plotišť a j., též na zarostlém poličce Labském před Střebší a j. — β) *glabrata, olysálý. Porůdku. Nalezl jsem jej jednou v několika exemplářích na polní mezi u Hradce Kr.
77. *Avena pubescens* Huds. O. pýřitý. Na lukách i na travnatých mezích, u cest dosti hojně rozšířený. — 4. kv-srp. — Na př. na lukách kolem Střebše, za N. Hradcem, kolem Správcovic a j.!
78. **Aira caryophylla* L. Ovsíček vláskovitý. V lesích, zvláště v písčité nebo vřesovinné půdě porůdku, dosud jen v lese u Vysoké,! ač nejspíš i jinde ještě se objeví. — ☉ čn-čnec.
79. *Deschampsia caespitosa* Beauv. Metlice trsnatá. Na lukách ve vlhkých hájích, dosti obecná. — 4. čn-čnec. — Na př. na lukách kolem Střebše a j.!

80. **Deschampsia flexuosa** Griseb. M. křivolaká. V suchých lesích, hájích, na výslunných vřesoviskách hojně rozšířená. — 4. čn-čnec. — Na př. v lesích kolem Hradce Kr. a j.!
81. **Trisetum pratense** Pers. Trojštět žlutavý. Na lukách, na travnicích i na pokraji lesu dosti obecný. — 4. čn-čnec. — Na př. na travnicích v parku Hradeckém, na lukách u Střebse a j.!
82. ***Corynephorus canescens** Beauv. Metlice šedivá. Na písčitých kopech, v písčitých borech místy hojný. — 4. čnec-srp. — Na písčinách za Roudnickou, na pokraji lesa u Bělče, Srchu, pod Horou Kunětickou, před Oujezdem, u Světlé blízko Týniště.!
83. **Koeleria cristata** Pers. Smělek hřebenatý. a) viridula, zelenavý. V suchých pasekách lesních, písčitých mezích nepříliš hojný. — 4. čn-čnec. — Na př. v lese u Švinar, v hájích u Sendražic a Račic a j.!
84. **Danthonia decumbens** DC. Trojzubec vystoupavý. Na vlhkých lukách i ve vlhkých lesích, zvláště na písčinách a vřesovištích dosti rozšířený. — 4. čn-čnec. — Na lukách kolem Roudnický, ve vlhkých lesích kolem Hradce Kr., na pobřeží rybníka, jež Náhon za Bělčem tvoří, u Račic, Týniště a j.!
85. **Melica nutans** L. Stvrdivka níci. V stinných lesích v kypře půdě, zvláště mezi křovím lesním hojně rozšířena. — 4. kv-čn. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých, v lesíku pod Zámečkem, u Račic, Borohrádku! a j.
86. **Phragmites communis** Trin. Rákos obecný. Na pokraji rybníku, tuní, struh i v lesích obecný. — 4. srp-zář.
87. **Cynosurus cristatus** L. Pohánka hřebenitá. Na lukách, pastvinách, u příkopu i v lesích dosti obecná. — 4. čn-čnec. — Na př. na lukách kolem Hradce Kr. a j., v lesíku na kopci sv. Jánském a j.!
88. **Dactylis glomerata** L. Srha laločnatá. Na lukách, mezích, rumišťích obecná. — 4. čn-čnec.
89. **Poa annua** L. Lipnice jará. Ve vlhkých příkopech, na mezích, u cest, zvláště ale na návších obecná. — 5. kv-listop.
90. **Poa nemoralis** L. a) umbrosa, L. hajní, a) stinná. V lesích a hájích dosti obecná, na př. v lesíku na sv. Jánském kopci a j.! c) fertilis, úrodná, na vlhkých lukách i na porůčích, na př. ve vlhkém křoví na porůčí podél Labe a j. — 4. kv-čnec.
91. **Poa pratensis** L. L. luční. Na lukách, pastvinách, mezích obecná. — 4. kv-čn.
92. **Poa compressa** L. L. smáčknutá. Na suchých neúrodných půdách, u cest i na zdech dosti rozšířená. — 4. čn-čnec. — Na př. na pilřích kamenných mostu Hradeckých, v suchých lesích u Račic, na Kunětické Hoře a j.!
93. **Poa trivialis** L. L. obecná. Na lukách i v lesích, zvláště ve vlhkém křoví u potoků obecná. — 4. čn-čnec.

94. *Briza media* L. Třeslice prostřední. Na úrodných lukách dosti obecná. — ♀ čn-čnec. — Na př. na lukách kolem Hradce Kr. a j.!
95. *Molinia varia* Schrank. Bezkoleneček peřestý. Na vlhkých lukách, zvláště v lesích na bažinných a vřesovinných půdách, dosti rozšířená. — ♀ čn-srp. — Na lukách u Roudničky, Divce, Stěblové, v lesích Hradeckých, Novohradeckých, Borohradeckých a j.!
96. *Glyceria fluitans* R. Br. Zblouhan vzplývající. Podél příkopu vodních, potoku, strah i tuní, na březích i ve vodě obecný. — ♀ čn-srp.
97. **Glyceria plicata* Fries. Z. tupokvětý. Jako předešlý, leč méně hojný. — ♀ čn-srp. — Na př. ve vodních příkopech u Střebče, Horního Přímu! a j.
98. *Glyceria aquatica* Wahl. Z. vodní. U rybníku, na kraji tuní, potoku, řek dosti obecně rozšířený. — ♀ čnec-srp. — Na př. u tuní a náhonu kolem Hradce Kr., u Třebčovic, Nechanic a j.!
99. *Festuca ovina* L. Kostřava ovčí. Na lukách, pastvinách, mezích i v lesích obecná. — ♀ kv-čn. — a) *vulgaris*, obecná, na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j. c) *durioscula*, přivrhlá, obecná na lukách kolem Hradce Kr. a j.!
100. **Festuca heterophylla* Lam. Kostřava různolistá. Vyskytuje se porůznu v světlejších lesích. — ♀ čn-čnec. — Dosud nalezena jen v lesích Novohradeckých.!
101. *Festuca rubra* L. Kostřava červená. Na sušších lukách, pastvinách, mezích, hojná. — ♀ čn-čnec. — Na př. na mezích u Střebče, podél sev.-západní dráhy a j.!
102. *Festuca elatior* L. Kostřava vysoká. b) *pratensis*, luční. Na úrodných lukách, na travnatých mezích dosti obecná. — ♀ čn-čnec. — Na př. na lukách a mezích kolem Hradce Kr. a j.!
103. *Festuca gigantea* Vill. K. obrovská. Ve vlhkých lesích nejvíce v houštinách u potůčku lesních dosti hojně rozšířená. — ♀ čnec-srp. — V lesích Hradeckých, v háji u Správců, za Libišany, u Nové Vsi blíže Týniště.!
104. **Festuca pinnata* Möench. K. prápořitá. Na výslunných kopečích, v světlých hájích porůznu. — ♀ čn-čnec. — Dosud jen v hájích nad Sendražicemi a Račicemi.!
105. *Festuca silvatica* Hudson. K. lesní. Na keřnatých kopečích, v hájích a stinných houštinách porůznu. — ♀ čnec-zář. — Na Kozince, v lesích Hradeckých blíže Černé stráně, v lese mezi Habřinou a Račicemi! a nejspíš i jinde.
106. *Bromus secalinus* L. Svecp obilní. Vyskytuje se na polích co plevel mezi obilím, sem tam i na pastvých místech dosti hojně. — ♂ čn-čnec. — Na př. na polích kolem Malšovic, N. Hradce a j.!
107. *Bromus commutatus* Schrad. S. zaměněný. Na lukách a travnatých mezích dosti obecný. — ♂ a ♂ kv-čnec. —

- Na př. na lukách kolem Střebže, pod Klukem, za rybárnou, u Slezského předměstí a j.!
108. **Bromus mollis** L. S. měkký. a) vulgaris, obecný. Na lukách, trávnicích, mezích i na rumištích obecný. — ☉ kv-čn.
109. **Bromus tectorum** L. S. střešní. Na mezích, zdech, podél cest, na hradbách a rumištích obecný. — ☉ kv-čnec.
110. **Bromus sterilis** L. S. jalový. Na podobných místech jako předešlý, ač jak se zdá méně hojný. — ☉ kv-čnec.
111. ***Bromus asper** Murray. S. drsný. Ve světlých lesích a hájích dosti porůznu. — ☿ čn-čnec. — Nalezl jsem jej u větším množství dosud jen v bývalé bažantnici Hradecké a v hájích u Sendražic a Račic, ať nejspíš i jinde v suchých lesích ještě se objeví.
112. ***Bromus erectus** Huds. S. vztyčený. Na sušších lukách, travnatých kopcích a mezích, i u cest dosti porůznu. — ☿ kv-čnec. — Na př. na sv. Jánském kopci! a j.
113. **Bromus inermis** Leysser. S. bezbrauný. Na úrodných lukách kolem Hradce Kr. místy hojný. — ☿ čn-čnec. — Na př. na lukách kolem Střebže, u Zámečku, na Polabských lukách kolem Správců a j.!
114. †**Triticum vulgare** Villars. Pšenice obecná. Seje se hojně na polích. — ☉ a ☉ čn.
115. **Triticum repens** L. Pýr plazivý. a) vulgare, obecný. Na mezích, u cest, plotů i jinde na neúrodných a pustých místech obecný. — ☿ čn-čnec.
116. **Triticum caninum** Schreb. P. psí. V stinných lesích, nejvíce ve vlhčích houštinách sem tam dosti hojně rozšířen. — ☿ čn-čnec. — V bývalé bažantnici, v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j.!
117. †**Secale cereale** L. Žlto obecné. Seje se zhusta na polích a zdívouje též někdy u cest i na mezích. — ☉ a ☉ kv-čn.
118. **Lolium perenne** L. Jílek ozimý. Na lukách, trávnicích i u cest obecný. — ☿ čn-zář.
119. ***Lolium remotum** Schrank. J. oddálený. Vyskytuje se někdy co plevel mezi luem a na blízku lněných polí, zřídka kdy u větším množství. — ☉ čn-čnec. — V okolí Hradce Kr. řídké.!
120. **Lolium temulentum** L. Matonoha. Jako předešlý nejvíce na polích mezi ovsem a žitem dosti rozšířený. — ☉ čn-srp. — Na př. na polích kolem Hradce Kr.!
121. †**Hordeum vulgare** L. Ječmen obecný. Seje se na polích a zdívouje též místy. — ☉ a ☉ čn-čnec.
122. †**Hordeum distichum** L. Ječmen dvouřadý. Seje se na polích. — ☉ čn-čnec.
123. **Hordeum murinum** L. J. myší. U cest, na zdech, rumištích kolem samého Hradce Králové i v některých blízkých oradách obecný. — ☿ čn-zář.

124. **Nardus stricta** L. Smilka tuhá. Na písčínách lesních i ve vlhké půdě vřesovinné, na lesních lukách dosti hojná. — 4. ču-čnec. — Na př. na lesních lukách za N. Hradcem, v lesích Hradeckých, kolem Oujezda, Týniště, Stéblové! a j.

6. Řád. **Cyperaceae** Juss. Šáchorovitě.

125. ***Carex Davalliana** Smith. Ostrice Davallova. Na rašelinných bažinných lukách dosti pořádku rozšířená, místy však hojná. — 4. dub-kv. — Na lukách za N. Hradcem k Roudniče v neobyčejném množství, u Stěžer, Dolního Přimů, Habřiny, Libišan i na Černé stráni v lesích Hradeckých.!
126. ***Carex pulicaris** L. O. blešutí. Na bažinných a rašelinných lukách, velmi pořádku. — 4. kv-čn. — Dosud jen na lukách za N. Hradcem k Roudniče a v blízké lesní olšině v hojnosti.!
127. ***Carex paradoxa** Willd. O. odchylná. Na bažinných lukách pořádku. — 4. kv-čn. — Dosud jen na bažinné louce za Novým Hradcem v neobyčejné hojnosti a ve křoví podél příkopu lučních u Libišan.!
128. ***Carex paniculata** L. O. latnatá, a) squarrosa, kostrbatá. Na bažinách u Bohdanče. (O.) — 4. kv-čn.
129. **Carex muricata** L. O. měkkoostenná, a) virens, zelenavá. Na lukách, v travnatém křoví i v lupenatých lesích hojně rozšířená. — 4. kv-čv. — Na př. ve křoví na lukách podél Orlice hojná, v houštinách lesních, v dubině u Březhradn, Račice, Sendražic a j.; na lukách u N. Hradce, Roudničky a j.!
130. **Carex vulpina** L. O. liščí. Na vlhkých lukách, v příkopech vodních obecná. — 4. kv-čn.
131. **Carex leporina** L. O. zaječí. Na bažinných lukách, podél mokřých příkopu v lesích i jinde velmi hojně rozšířená. — 4. kv-čn. — Na př. na lukách před i za Zámečkem, kolem N. Hradce, Slezského předměstí, v lesích Hradeckých, Novohradeckých, v lese za Roudničkou a j.!
132. ***Carex echinata** Murray. O. ježatá. Na podobných místech jako předešlá dosti hojně rozšířená. — 4. kv-čn. — Na př. na louce na úpatí sv. Jánského kopce, na lukách mezi N. Hradcem a Roudničkou v neobyčejném množství, v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j.!
133. ***Carex elongata** L. O. prodloužená. V lesních mokřadech, na bažinných lukách porůznu, místy však hojná. — 4. kv-čn. — V lesích Hradeckých, zvláště podél náhonu hojná, v lesíku na sv. Jánském kopci, v lesích Novohradeckých, u Bohdanče (O.).
134. ***Carex canescens** L. O. šedivá. Ve vlhkých lesích na mokřadech dosti hojně rozšířená. — 4. kv-čn. — V lese na sv. Jánském kopci, v Boru, v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j. hojná.!

135. ***Carex remota** L. O. oddálená. Ve vlhčích lesích nejraději u potůčku, pořádku. — 4. kv-čn. — V lese na sv. Jánském kopci, ve vlhkých lesích za Libišany. !
136. ***Carex cyperoides** L. O. šáchorovitá. Na březích rybníků a řek. — 5. čn-zář. — Na půdě býv. rybníka Čeperky u Stěblové (blíže stanice železničné) ! u bývalých rybníků Bohdanečských (Č.).
137. **Carex brizoides** L. O. třeslicovitá. a) genuina, pravá; ve vlhkých lesích Hradeckých, Novohradeckých i j. ! b) curvata, zkřivená; na lukách, sem tam i v lesích kolem Hradce Kr. a j. hojná. ! c) Schreberi, hnědá; na suchých travnatých kopcích a lukách na hradbách Hradeckých, a j. velmi hojná. ! — 4. dub-čn.
138. ***Carex disticha** Hudson. O. dvouřadá. Na bažinných lukách nejvíce u příkopu vodních porůznu. — 4. kv-čn. — Dosud jen na lukách za Libišany. !
139. **Carex acuta** L. O. obecná. Na vlhkých lukách, v mokřích lesinách, v bažinách obecná. — 4. kv-čn. — a) nutans, nízí i b) intermedia, prostřední všude rozšířená. c) angustifolia, úzkolistá více jen na lukách bažinných a rašelinných na př. na lukách za Malšovicemi, kolem Roudničky a j. !
140. ***Carex Buekii** Vimm. O. Buekova. Na podobných místech co předešlá, však jen místy rozšířená. — 4. kv. — Hojná na potočce Orlice, zvláště u mlýna blíž Slezského předměstí, za Malšovicemi a j. !
141. **Carex digitata** L. O. prstnatá. Ve vlhčích lesích, v stinných hájích dosti hojně rozšířená. — 4. dub-kv. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých, kolem Slatiny, u Vysoké a j. !
142. ***Carex montana** L. O. chlumní. V suchých výslunných hájích místy velmi hojná. — 4. db-kv. — Na pokraji lesa za Pileticemi a u Bukoviny. !
143. ***Carex pilulifera** L. O. kulkonokná. V lesích, zvláště na pasekách lesních sem tam dosti hojná. — 4. dub-kv. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých, u Svínar, Boru, Týniště a j. !
144. ***Carex umbrosa** Host. O. stinná. Ve světlých, vlhčích lesích pořádku rozšířena, místy však hojná. — 4. db-kv. — V lesích Hradeckých hojně pod Černou stráňí. !
145. **Carex praecox** Jacq. O. ranní. Na lukách, travnatých mezech i na travnatých místech v lesích hojně rozšířená. — 4. dub-kv. — Na př. na lukách kolem Hradce Králové a j.; i na pokraji lesů Hradeckých a j. !
146. ***Carex tomentosa** L. O. plávnatá. V lupenatých lesích, na keřnatých stráních i na paloučích lesních porůznu. — 4. dub-kv. — V lesíku na sv. Jánském kopci, v bažantnici u Dolního Přimu, v lese za Roudničkou, v lesích u Račic a Sendražic. !

147. **Carex ericetorum* Pollich. O. vřesovištní. V borových lesích, v písčité půdě, ve vřesovištních pořádku. — 2. dub-kv. — V lesích za N. Hradcem dosti hojně! u Chvojna (O.).
148. *Carex flacca* Schreb. O. plhá. Na bahnitých lukách i v mokřých lesích hojná. — 2. dub-kv. — Pod sv. Jánským kopcem, v lesích Hradeckých, Novohradeckých, na lukách před i za Zámečkem, za N. Hradcem, na lukách kolem Březhradu a j.!
149. *Carex panicea* L. O. prosová. Na podobných místech jako předešlá, často též s ní pospolu a ještě hojnější. — 2. kv-ěn. — Na př. na bažinných lukách před i za Zámečkem, kolem Rusku, Březhradu a j., též na paloučích v lesích Hradeckých a j.!
150. *Carex pallescens* L. O. bledá. V stinných lesích, ve vlhkých hájích hojně rozšířená. — 2. kv-ěn. — V lese na sv. Jánském kopci, Boru, v lesích Hradeckých, Novohradeckých, na louce blízce Orlice u Malšovic, u Zámečku a j.!
151. *Carex silvatica* Huds. O. lesní. Ve vlhkých lesích nepříliš hojná. — 2. kv-ěn. — V lese na sv. Jánském kopci, v lesích Hradeckých, Novohradeckých, v lese u Račic a j.!
152. **Carex pseudocyperus* L. O. nedošáchor. U příkopu vodních, v bažinné půdě, též u potoku lesních nehojná. — 2. kv-ěn. — V lesích Hradeckých, pod Černou stráň, v lesích Novohradeckých na několika místech.!
153. **Carex distans* L. O. odstálá. Na bahnitých lukách, též v mokřadech na pokraji lesů, porůznu. — 2. kv-ěn. — Na lukách za Slatinou, na pokraji lesu Novohradeckých, u Stěžer a j.!
154. *Carex flava* L. O. rusá. a) genuina, velkozobanná, na bahnitých lukách i v bažinách lesních dosti hojně rozšířená; na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j., na lukách pod Klukem, za N. Hradcem, kolem Březhradu a j. velmi hojná.!
- ci **Oederi*, rovnouzobanná, na bažinných a rašelinných lukách i v lesích na př. pod sv. Jánským kopcem, v lesích Hradeckých, na lukách před Oujezdem u Březhradu, Týniště a j. — 2. kv-ěn.
155. *Carex paludosa* Good. O. kalužní. Na bahnitých lukách v mokřadech hojná. — 2. kv-ěn. — Kolem Hradce Kr. a j.!
156. *Carex vesicaria* L. em. O. puchýřitá. Na podobných místech jako předešlá a stejně hojná. — 2. kv-ěn. — Na bažinatých lukách podél Orlice, na př. hojně kolem Malšovic, Svinárek, u Týniště a j.!
157. **Carex ampullacea* Good. O. hublinatá. V příkopech vodních, na bahnitých i rašelinných místech i v lesích nepříliš hojná. — 2. kv-ěn. — Na louce u lesa za Náhonem, v lese za N. Hradcem.!
158. **Carex riparia* Curtis. O. pobřežní. Podél řek i na lukách, v příkopech vodních pořádku. — 2. kv-ěn. — U zátok Orlice za Malšovicemi, na pokraji rybníka u bažantnice blízce Dolního

- Prímu, na lukách za N. Hradcem k Roudničce, v lese za N. Hradcem, u rybníka za Bělčem a j. ! u Bohdáně (O.).
159. **Carex filiformis* L. O. nitkolistá. Na rašelinných lukách, nejvíce v příkopech odvodňovacích, dosud jen na lukách za Březhradem v hojnosti. ! — 4. kv-čn.
160. *Carex hirta* L. O. srstnatá. Na mokřích písčinách, lukách u cest a příkopů obecná. — 4. kv-čn. — Na př. na březích Labe u Hradce Králové a j. !
161. **Scirpus compressus* Pers. Skřípina smáčeknutá. Na mokřích bažinných lukách i jinde na bahnitých pudách, porůznu. — 4. čn-čnec. — Luka kolem Hradce Králové, u Stěžer, Týniště ! u Smřic (Č.).
162. **Scirpus maritimus* L. S. mořská. Podél náhonu, rybníků i v příkopech vodních, nepříliš hojná. — 4. čnec-srp. — Podél struh vodních u Svobodných Dvůrů, Březhradu a j. !
163. *Scirpus silvaticus* L. S. lesní. V mokřích příkopech na lukách, v močálech lesních i u vod hojně rozšířená. — 4. čn-čnec. — Na lukách kolem Hradce Král., v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j. !
164. **Scirpus radicans* Schkuhr. S. kořenující. Podél tuní, na porůcích řek, méně hojná předešlá. — 4. čnec-srp. — Na březích Orlice u Hradce Kr. !
165. *Scirpus lacustris* L. S. jezerní. V tuních, příkopech vodních i jinde ve vodách, zvláště bahnitých, obecná. — 4. čn-čnec. — Na př. v tuních Orlických a j. !
166. *Scirpus setaceus* L. S. nitkovitá. Podél řek a rybníků, na zaplavených místech, nepříliš hojně rozšířená. — 4. čn-srp. — Na př. na dně bývalého rybníka Čeperky blízce Stěblové ! a nejspíš i j.
167. *Scirpus acicularis* L. S. jehlovitá. Na podobných místech, jako předešlá, však mnohem hojnější. — 4. čnec-srp. — Na př. u rybníku v lese Hradeckém za mlýnem Malšovickém a j. v hojnosti. ! 5) *Huitans, plynoucí, v rybnících a potocích u Hradce Králové (Čen.).
168. *Scirpus palustris* Link. S. bahenní. V příkopech vodních, v mokřadech, na bažinných lukách, obecná. — 4. čn-srp. — Na př. u vodních příkopů kolem Hradce Král., na lukách u Roudničky ! a j.
169. **Scirpus uniglumis* Link. S. jednoplevá. Jako předešlá, však spíše jen rozšířená. — 4. čn-srp. — Na lukách před Malšovickými spolu se sítinou nitkolistou, místy velké tmavozelené fláky tvořící, na louce u Dolního Přímu, na lukách kolem Roudničky a j. !
170. **Scirpus ovatus* Roth. S. vejčitá. Na březích řek a rybníků porůdku. — 5) čn-srp. — U Hradce Kr. (R.), u bývalých rybníků Bohdanečských (Č.).
171. *Eriophorum polystachyum* Roth. Suchopýr mnohoklasý.

Na bažinných lukách dosti obecný. — 4. dub-kv. — Na př. na lukách před i za Zámečkem, u Slatiny, v lesích Novohradeckých, u Stěžer, Libišan a j. !

172. *Eriophorum angustifolium* Roth. S. úzkolistý. Na podobných místech co předešlý a stejně hojný. — 4. db-kv. — Na př. na lukách u Stěžer, na bažinách v lesích Hradeckých a j. !

173. **Cyperus fuscus* L. Šáchor hnědý. Ve vodních strouhách na pokraji bažin, rybníků i řek porůznu. — ☉ čnec-zár. — Dosud jen na pokraji bažin na lukách u Libišan a na půdě býv. rybníka Čeperky u Stěblové. !

174. **Cyperus flavescens* L. Šáchor žlutavý. U řek a rybníků na mokřích půdách, sporý. — ☉ čnec-zár. — U Hradce Kr. (R.), u bývalých rybníků Bohdanečských (Č.).

7. Řád. Juncaceae Bartl. Sítinovitě.

175. *Juncus communis* E. Meyer. Sítina obecná. V příkopech vodních, na bahnitých lukách a mokřadech obecná; b) effusus, rozprostřená, méně hojná, na př. u jezírka v lese blíže Slatiny a j. ! — 4. čnec-srp.

176. *Juncus glaucus* Ehr. S. sivá. Na těchže místech jako předešlá, ale řídká. — 4. čnec-srp. — Na př. v příkopech vodních pod Zámečkem, u Plotišť. Přímu a j. !

177. **Juncus filiformis* L. S. nitkovitá. Na bahnitých lukách místy velmi hojná; dosud jen na louce za Slezským předměstím, na lukách, podél Orlice před i za Malšovicemi ležících, a na louce pod Klukem k N. Hradci. ! — 4. čn-čnec.

178. *Juncus lamprocarpus* Ehr. S. leskloplodá. Na mokřích lukách, v příkopech bahnitých obecná. — 4. čnec-srp. — Na př. na lukách kolem Hradce Kr. !

179. **Juncus fuscoater* Schreb. S. tmavohnědá. Na podobných místech, jako předešlá, ale mnohem vzácnější. — 4. čnec-srp. — Na vlhkých lukách mezi N. Hradcem a Roudnickou, u Libišan a Borohrádku, ! u Chvojna (O.).

180. **Juncus capitatus* Weig. S. strboukatá. U rybníku i v příkopech vodních, řídká. — ☉ čn-srp. — Na půdě bývalého rybníku Veliká Čeperka, blíže stanice železničné u Stěblové. !

181. *Juncus compressus* Jueq. S. smáčkutá. Na vlhkých lukách, v močálech, u vlhkých příkopů a mezi dosti obecná. — 4. čn-srp. — Na př. na lukách u N. Hradce, u příkopu a mezi v Pláckách a j. !

182. *Juncus bufonius* L. S. žabí. Na vlhkých rolích, ve vlhkých příkopech silničných, na pastvinách obecná. — 4. čn-srp. — Na př. hojná na polích u Malšovic. Střebše a j. !

183. *Luzula vernalis* DC. Bika jarní. Ve vlhkých lesích a hájích hojně rozšířená. — 4. dub. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých, pod Zámečkem, u Slatiny a j. !

184. *Luzula albida* DC. Bika bělavá. V suchých lesích a hájích jako předsělá rozšířená. — ž. čn-čnec. — V lesích u Chlumu, Sendražic, Račic, Borohrádku a j. !
185. *Luzula campestris* DC. Bika ladní. a) longistyla, dlouhočnělečná, na lukách, v světlých hájích, na trávnatých stráních obecná, b) multiflora, mnohokvětá, i c) pulchella, droboučná, v pasekách borových lesů Hradeckých i na vřesovištích místy hojná. ! — ž. bř-kv.

8. Řád. *Liliaceae* DC. Lilijovité.

186. **Lilium martagon* L. Lilije zlatohlavá. Ve světlých lesích a hájích dosti pořádku rozšířená. — ž. čn-čnec. — Na „Černé stráni“, v lese u Slatiny, v hájích u Račic. !
187. *Gagea lutea* Schult. Křivatec žlutý. Na vlhkých lukách lesních, ve vlhčích houštinách zvláště u potoku, hojná. — ž. bř-dub. — Na př. v lesích Hradeckých a Novohradeckých, v divokém sadě u Správcie a jinde. !
188. *Gagea pratensis* Schult. K. luční. Na lukách, trávnících a mezích obecný. — ž. kv-dub. — Na př. na lukách kolem Hradce Kr. a j. !
189. **Gagea minima* Schult. K. nejmenší. Na pokraji světlých hájů, v světlém křoví porůznu. — ž. dub-kv. — U Malšovic. !
190. *Ornithogalum tenuifolium* Guss. Snědek tenkolistý. Na lukách, trávnatých mezích i v polích, místy hojně rozšířen. — ž. dub-kv. — Na př. velmi hojný na lukách u Malšovic a j. !
191. **Allium acutangulum* Schrad. a) pratense, Černek ostrohranný a) luční. Na lukách jílovitých u Hradce Králové pořádku (Č.). — ž. čn-srp.
192. *†Allium schoenoprasum* L. Pažitka. Pěstuje se v kuchyňských zahradách. — ž. čn-čnec.
193. *†Allium ascalonicum* L. Ošlejš. Sází se jako předsělá sem tam v zahradách. — ž. čnec-srp.
194. *†Allium fistulosum* L. Ošlejš zimní. Pěstuje se někdy v kuchyňských zahradách. — ž. čn-čnec.
195. *†Allium cepa* L. Cibule obecná. Sází se hojně v kuchyňských a zelenářských zahradách. — ž. čn-čnec.
196. *Allium oleraceum* L. Černek domácí. Na keřnatých stráních, na trávnatých mezích, v křoví, sem tam rozšířený. — ž. čn-srp. — Kolem Hradce Král., u Račic a j. !
197. **Allium scorodoprasum* L. Ořešec. Na sušších lukách porůznu, místy však hojný. — ž. čn-čnec. — Na lukách podél Orlice blíž Slezského předměstí hojný, též na několika místech v divokém sadě (Dotřelové háji) u Správcie, na lukách mezi Hradcem Kr. a Březhradem, na malé louce blíž mlýna za Bělčem a j. !
198. *†Allium sativum* L. Č. obecný. Pěstuje se hojně v kuchyňských a zelenářských zahradách. — ž. čnec-srp.

199. † *Allium porrum* L. Por zahradní. Pěstuje se jako předešlý. — 4. čn-čnec.
200. * *Anthericum ramosum* L. Bělozářka větvitá. Na výslunných keřnatých stráních, v suchých hájích pořádku rozšířená. — 4. čn-čnec. — Dosud jen v háji nad Račicemi.!
201. *Asparagus officinalis* L. Chřest obecný. Pěstuje se v zahradách a roste sem tam též divoce na lukách v jednotlivých exemplárech; na př. na louce blíže Plácek a j. — 4. čn-čnec.
202. *Smilacina bifolia* Desf. Pstroček dvoulistý. V lesích, zvláště ve vlhkých a stinných lesích, velmi hojný. — 4. kv-čn. — Na př. na sv. Janském kopci, v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j.!
203. *Convallaria majalis* L. Konvalinka vonná. Ve světlých, vlhkých lesích a hájích v kypřé pudě hojně rozšířená. — 4. kv-čn. — Na př. v lesích Hradeckých a j.!
204. *Polygonatum officinale* All. Kokořík obecný. V lupeňatých lesích a hájích, na keřnatých stráních dosti rozšířená. — 4. kv-čn. — Na př. v lesích Hradeckých, u Týniště a j.!
205. *Polygonatum multiflorum* All. K. mnohokvětý. Na těchže místech, jako předešlý, však řidčeji. — 4. kv-čn. — Na př. v lesích Hradeckých na Černé stráni, v bažantnici u Doln. Přímu a j.!
206. *Paris quadrifolia* L. Vraní oko. Ve vlhkých a stinných lesích a hájích porůznu. — 4. kv-čn. — V lesíku pod Zámečkem, v lesích Hradeckých na Černé stráni, v lesích Novohradeckých, v bažantnici u Dolního Přímu a j.!

9. Řád. *Colchicaceae* DC, Océunovitě.

207. *Colchicum autumnale* L. Océun jesenní. Na vlhkých lukách i na lesních paloucích hojně rozšířen. — 4. čnec-srp. — Na př. na lukách kolem Hradce Kr. a j.!

10. Řád. *Juncagineae* Rich. Bařičkovitě.

208. * *Triglochin palustris* L. Bařička obecná. Na bahnitých lukách, u příkopů vodních, porůznu. — 4. čn-čnec. — Na bařinných lukách za N. Hradcem, u Slatiny, Divece, Stěžer, Libišan, Oujezda! u Bohdanče (Č.).

11. Řád. *Butomaceae* Lindl. Šmelovitě.

209. *Butomus umbellatus* L. Šmel okoličnatý. Na pokrajích rybníků, tůní, vodních příkopů, dosti hojný. — 4. čn-srp. — Na př. u tůní Orlických blíže Střebše, u vodních příkopů blíž Farářství a j.!

12. Řád. *Alismaceae* R. Brown. Žabníkovitě.

210. *Alisma plantago* L. Žabník jitrocelový. Na podobných místech jako šmel, obecný. — 4. čnec-srp. — Na př. u tůní Orlických a j.!

211. *Sagittaria sagittaeifolia* L. Šípátka vodní. V tůních i jinde v stojatých vodách, dosti hojná. — 4. čn-srp. — Na př. v tůních Orlických, u rybníka Diveckého a j.!

13. Řád. **Hydrocharideae** De Cand. Voďankovitě.

212. *Hydrocharis morsus ranae* L. Voďanka žabí. V tůních, tichých zátokách říčních, ve vodních příkopech, sem tam i v lesích obecná. — 4. čnec-srp. — Na př. hojná ve vodních stroubách kolem Hradce Kr., v tůních a zátokách Orlických a j.!

14. Řád. **Orchideae** Juss. Vstavačovitě.

213. **Orchis ustulata* L. Vstavač osmáhlý. Na vlhčích lukách, trávnatých mezích, lesních paloucích porůznu. — 4. kv-čn. — Na lukách u Hradce Kr. (Č.).
214. *Orchis morio* L. V. obecný. Na lukách, lesních paloucích sem tam hojný. — 4. kv-čn. — Na př. na lukách u Střehse, Malšovic, Svinar a j.!
215. **Orchis maculata* L. V. plamatý. Na podobných místech jako předešlý, řídkěji. — 4. čn. — Na př. na bažinných lukách v lesích za N. Hradcem! na lukách u Opatovic (Č.) a j.
216. *Orchis latifolia* L. V. široolistý. Na vlhkých lukách, lesních bažinných luzích dosti hojně rozšířený. — 4. kv-čn. — Na př. na luzích pod sv. Jánským kopcem, před i za Zámečkem, v lesích Hradeckých, Novohradeckých, na vlhkých lukách u Svinar a j.!
217. *Platanthera solstitialis* Bönningh. Vemenník belokvětý. Ve světlých lesích a hájích, na keřnatých stráních, dosti hojný. — 4. kv-čnec. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých, Přímských, u Boru, kolem Račic, Třebechovic, Stěblové a j.!
218. **Cephalanthera pallens* Rich. Okrotice bělavá. V světlých hájích, na keřnatých úbočích, spoje. — 4. kv-čn. — V háji u Račic! podle udání, mně sděleného, byl též nalezen v lesíku pod Zámečkem (kdež jsem ho však dosud marně hledal).
219. *Epipactis latifolia* All. Krušník široolistý. Ve vlhkých a stinných lesích i hájích porůznu. — 4. čn-čnec. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých, u Týniště a j.!
220. **Neottia nidus avis* Rich. Hnízdák. V stinných lesích a hájích pořádku. — 4. čn-čnec. — V lesích Hradeckých, pod Černou stráň, v lese za Novým Hradcem a j.!
221. **Listera ovata* R. Br. Bradáček vejčitý. Ve vlhkých lesích, na mokřích lukách lesních v kypřé půdě místy hojný. — 4. čn-čnec. — V lesích Hradeckých a Novohradeckých.!

15. Řád. **Irideae** Juss. Korytecovitě.

222. *Iris pseudacorus* L. Korytec vodní. U rybníku, tůní, na mokřích lukách, u příkopů vodních, hojně rozšířen. —

ž. čn-čnec. — Na př. na vlhkých lukách podél Labe a Orlice, zvláště kolem Střebse, Malšovic a j.!

† *Iris germanica* L. K. německý a některé jiné druhy kosatec chovají se na mnohých místech v zahradách spolu s některými druhy mečíku (*Gladiolus*).

16. Řád. *Amaryllideae* R. Brown. Amarylkovité.

223. *Leucojum vernum* L. Bledule jarní. Ve vlhkých lesích, nejvíce podél potůčků, místy velmi hojný. — ž. bř-dub. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých a j.!

224. **Galanthus nivalis* L. Podanězník bílý. Na vlhkých lukách i v hájích dosud jen na louce u Malšovic, na jediném místě v značném množství. — ž. ún-bř.

† *Narcissus poeticus* L. Narcis bílý a *N. pseudonarcissus* L. Narcis kadeřavý, pěstují se zhusta v zahradách; první též někdy blíže těchto zdivočuje.

IV. Třída. Dvouděložné. *Dicotyledoneae*.

A. Bezkorunné. *Apetalae*.

1. Řád. *Callitrichineae* Link. Hvězdošovitě.

225. *Callitriche verna* L. p. Žahí vlas jarní. V příkopech vodních, potocích i jinde v stojatých a tekutých vodách obecný. — ž. a ☉ kv-zár. — Na př. u Náhonu, v lesích Hradeckých a j.!

2. Řád. *Euphorbiaceae* R. Br. Pryšcovité.

226. † *Euphorbia lathyris* L. Pryšec křížmolistý. Nalézá se na mnohých místech v zahradách, odkudž též zdivočuje, tak na př. jednou na Slezském předměstí u silnice. — ☹ čn-srp.

227. **Euphorbia exigua* L. Pryšec drobný. Na rolích, zvláště na úhorech, místy hojný. — ☉ čn-zár. — Pole u Blešna (společ), Brezhradu, Sendražic, Račic, Smiřic, Dobřenic.!

228. *Euphorbia peplus* L. P. okrouhlý. Na polích, v zahradách i na návsích dosti obecný. — ☉ čnec-zár.

229. *Euphorbia helioscopia* L. P. kolovratec. Na podobných místech, jako předešlý. — ☉ kv-zár.

230. **Euphorbia platyphylla* L. P. plocholistý. Na polích, vlhkých trávnících, návsích pořádku. — ☉ čnec-srp. — Na Chlumu (Č.), ve vsi Habřině.!

231. *Euphorbia dulcis* L. P. sladký. Ve vlhkých a stinných lesích a hájích místy hojný. — ž. dub-kv. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých, v bažantnici u Dolního Přímu i j.!

232. *Euphorbia esula* L. P. obecný. Na mezích polních, u cest, na trávnících, dosti rozšířený, ač ne příliš hojný. — ž. kv-srp. — Na př. na sv. Janském kopci, u Malšové Lhoty a j.!

233. *Euphorbia cyparissias* L. P. chvojka. Na podobných místech co předešlý, obecný. — ž. dub-čnce.
234. *Mercurialis perennis* L. Bažanka lesní. V srnných a vlhkých lesích v kypré půdě, zvláště blíže potůčků, místy hojná. — ž. db-kv. — Lesy Hradecké, Novohradecké a j.!
235. *Mercurialis annua* L. B. polní. U cest, na rumištích, polích, v zahradách, obecná. — (o) čn-zář.
236. † *Buxus sempervirens* L. Zimostráz. Chová se hojně v zahradách. — ž. bř-dub.

3. Řád. *Betulaceae* Rich. Břízovité.

237. *Alnus glutinosa* Gartner. Olše lepkavá. V mokřadech lesních, na bahutých lukách, podél poroků a rybníků obecná. — p. ún-bř.
238. * *Alnus incana* DC. O. šedá. Ve vlhkých lesích Hradeckých a Novohradeckých místy hojná, ač prý ne puvodní, nébrž sázená, u rybníka blíž Dolního Přímů. — p. ún-bř.
239. *Betula alba* L. Bříza obecná. V sušších lesích dosti hojně rozšířená; b) pubescens, pyřitá, nejvíce na rašelinných půdách a lesních bařinách, pořídka. — p. db-kv.

4. Řád. *Carpineae* Döll. Habrovité.

240. *Corylus avellana* L. Líska obecná. V sušších lesích a hájích i na keřnatých stráních, hojně rozšířená. — p. ún-bř. — Lesy Hradecké, dubina u Březhradu, u Slatiny a j.!
- † *Corylus tubulosa* Willd. L. trubkovitá. Chová se pořídka v zahradách. — p. bř.
241. *Carpinus betulus* L. Habr obecný. V lupenatých lesích spolu s duby a pod. dosti hojný. — p. dub-kv. — Na př. v lesíku pod Zámečkem a j.!

5. Řád. *Cupuliferae* Rich. p. Čiškonošné.

242. *Fagus silvatica* L. Buk obecný. V lesích a hájích, jako předešlý dosti hojně rozšířen. — p. kv. — Na př. v lesíku pod Zámečkem a j.; v lesích Novohradeckých vyskytují se sem tam staré mohutné kmeny.!
243. *Quercus sessiliflora* Smith *am.* Dub zimní. Vyskytuje se v lupenatých lesích porůznu, řidčeji nežli následující. — p. kv.
244. *Quercus pedunculata* Ehr. Dub letní. V lesích, zvláště v dubinách Polabských velmi hojný. — p. kv.

6. Řád. *Salicineae* Rich. Vrbovité.

245. * *Salix pentandra* L. Vrba pětimužná. Na rašelinných lukách, u potoků, v mokřích olšinách, u rybníků, roztroušená. — p. kv. — U Libišan, u rybníka Žďárského blíž Týniště.!
246. *Salix fragilis* L. Vrba křehká. a) discolor, různobarvá, i β) concolor, stejnobarvá. Podél řek, potoků, rybníků, na

- pokrají luk velmi hojná, též u cest sázená. — p dub-kv. — Na př. podél Labe a Orlice kolem Hradce Kr. a j.!
247. *Salix alba* L. V. bílá. Na podobných místech jako předešlá, obecná. — p dub-kv.
248. **Salix viridis* Fries. (*S. fragilis-alba*). V. zelená. Spolu s rodnými druhy dosti rozšířená. — p db-kv. — Na př. podél Labe u Hradce Kr.!
249. *Salix amygdalina* L. *amp.* V. mandlová. a) discolor, různobarevná, i β) concolor, stejnobarevná. U řek, potoků, náhonů, jako obě předešlé hojná. — p dub-čnec. — Na př. na potočích Labe a Orlice a j.!
250. *Salix purpurea* L. V. nachová. Na podobných místech jako předešlá, i na vlhkých lukách u příkopů vodních dosti obecná. — p bí-kv. — Na př. podél Labe a Orlice dosti hojná.!
251. *Salix viminalis* L. Vrba košařská. Na těchto místech jako předešlé, často s nimi též pospolu. — p bř-kv. — Na př. hojně podél Labe a Orlice a j.!
252. **Salix rubra* Hud. *ampl.* (*S. viminalis* × *purpurea*.) V. červená. b) genuina, obecná. Na potočích Labe i Orlice mezi vrbovím spolu s rodiči svými dosti hojná. — p db. — Na př. podél Labe u Hradce Kr., podél Orlice blíže Malšové Lhoty a j.!
253. **Salix cinerea* L. V. popelavá. Na mokřích a bařinných lukách, u rybníků, potoků, též na pokrajích lesů porůznu. — p bí-kv. — Na př. tu a tam jednotlivě podél dráhy severozápadní k Pardubicům.!
254. *Salix caprea* L. Jíva. V lesích a hájích, zvláště u potůčků lesních, též na potočích a u náhonů, dosti obecná. — p bř-dub. — Na př. v lesích Hradeckých, na potočích Orlice a j.!
255. **Salix sericans* Tausch. (*S. caprea* × *viminalis*). V. hedbávitá. Na březích Orlice mezi Hradcem Kr. a Třebechovicemi spolu s předešlými sem tam hojně rozšířená. — p bř-kv. — Velmi hojná kolem Malšovic a Malšové Lhoty.!
256. *Salix aurita* L. V. ušatá. V lesích, na vlhkých lukách i na mokřadech a bařinách dosti obecná. — p dub-kv. — Na př. v lesích Hradeckých a Novohradeckých a j.!
257. **Salix repens* L. V. plazivá. Na bařinných i rašelinných lukách roztroušená. — p dub-kv. — a) genuina, obecná. Na bažinné louce u Roudničky a za Březhradem! b) rosmarinifolia, rosmarinolistá. Za N. Hradcem.!
258. *Populus alba* L. Topol bílý. Na potočích, v sadech a stromořadích porůznu. — p bř-dub. — Na př. na Kozince v Hradci Kr., v lesích Hradeckých blíž Bělče a j.!
259. *Populus tremula* L. Osyka. V lesích a hájích dosti hojně rozšířená i v stromořadích sem tam sázená. — p bř-dub. — Na př. v stromořadích kolem Hradce Kr. a j.!

260. **Populus nigra** L. Topol černý. Na potočích řek na př. u Labe roztroušený, místy i u silnic sázený; b) pyramidulalis, vlásky, v stromořadích dosti hojně sázený. — b dub.

7. Řád. Juglandaceae DC. Orešákovité.

261. † **Juglans regia** L. Orešák královský. Chová se v zahradách, tu a tam též v stromořadích. — b kv.

8. Řád. Polygonaceae Juss. Rdeňovité.

262. * **Rumex maritimus** L. Šťovík pobřežní. a) aureus, zlatý. Na březích rybníků, u vlhkých příkopů i na vlhkých návších dosti pořádku rozšířen. — ☉ i ☹ čnec-srp. — Na potočích Labe, v lese za Malšovicemi, v Smiřicích, blíže Němčic, na vlhkém rumišti v Týništi. !
263. **Rumex conglomeratus** Murr. Š. klubkatý. U příkopů silničních, podél struh lesních, na potočích, u cest i ve vsích obecný. b čnec-srp. — Na př. u cest pod hradbami Hradeckými a j. !
264. * **Rumex sanguineus** L. Š. krvavý. Ve vlhkém houští, v lesích a hájích nepříliš hojný. — b čnec-srp. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých, v Dotelově háji u Správců a j. !
265. **Rumex obtusifolius** L. Š. tupolistý. V příkopech, na vlhkých návších, u potoku, v našem okolí, jak se zdá, nepříliš hojný. — b čnec-srp.
266. **Rumex crispus** L. Š. kadeřavý. Podél mezí, příkopů lučních, na návších i jinde na vlhkých místech, obecný. — b čnec-srp.
267. * **Rumex hydrolapathum** Hudson. Š. koňský. U rybníků, tůní, podél řek, hojně rozšířený. — b čnec-srp. — Tůně Orlické, břehy Labské ! rybník Rozkoš u Bohdanče (O.), Bystřice u Kratonoh ! a j.
268. * **Rumex aquaticus** L. Š. vodní. V tůních, podél řek, u rybníků a potoků, jako předešlý rozšířený. — b čnec-srp. — Na př. v tůních na lukách kolem Střebže ! a j.
269. † **Rumex scutatus** L. Š. štítnatý. Sem tam v zahradách sázený, zdivočuje též někdy, na př. až do r. 1881 na zdech zahrady fortifikační v Hradci Kr. ! — b kv-čnec.
270. **Rumex acetosa** L. Š. obecný. Na lukách, vlhkých travnatých mezích i v lesích dosti obecný. — b kv-čn.
271. **Rumex acetosella** L. Š. menší. Na úhorech, lesních písčinách a pasekách i jinde obecný. — b kv-čnec.
272. **Polygonum bistorta** L. Hadí kořen. Na vlhkých lukách hojně rozšířený. — b čn-čnec. — Na př. na lukách kolem Hradce Kr. a j. !
273. **Polygonum amphibium** L. Rdeňo obojživelné. V tůních, na březích rybníků a řek, v stojatých vodách hojný. — b čn-

srp. — Na př. v močálech kolem Střebče, podél dráhy severo-západní a j. !

274. *Polygonum lapathifolium* L. Blešník. a) *genuinum*, pravý. Na vlhkých polích, u příkopů vodních, na návších a rumítkách obecný; b) *nodosum*, napučený, nejvíce na březích řek a rybníků obecný. — ☉ čn-zár.
275. *Polygonum persicaria* L. Červivec; a) *densiflorum*, hustokvětý. Na vlhkých návších, v příkopech i jinde na pustých místech hojný, však méně obecný nežli předešlý; c) **minus*, menší. Sem tam na lukách, u rybníků i v lesích velmi hojný, na př. v lesích Novohradeckých, u Týniště, Borohrádku a j. ! — ☉ čnec-zár.
276. *Polygonum hydropiper* L. Peprník. Na březích řek a rybníků, zvláště ve vlhkých příkopech a strouhách obecný. — ☿ čnec-zár. — Na př. u příkopů lučních před Slezským předměstím a j. !
277. *Polygonum aviculare* L. Truskavec. Na mezích, návších, pastvinách, u cest obecný. — ☉ čn-lstp.
278. *Polygonum convolvulus* L. Rdesno opletka. Na polích, u cest v křovinách obecný. — ☉ čnec-říj.
279. *Polygonum dumetorum* L. R. plotní. V lesním křoví i v hečtinách na porůcích sem tam dosti hojný. — ☉ čnec-zár. — Na př. v lesích Hradeckých a j. !
280. † *Polygonum fagopyrum* L. Pohanka. Bývá seta sem tam na písčitých i vápnitých půdách. — ☉ čnec-srp.

9. Řád. *Scleranthae* Link. Chmerekovitě.

281. *Scleranthus annuus* L. Chmerek roční. a) *fastigiatus*, vrcholičnatý. Na rolich, zvláště na úhorech i u cest obecný. — ☉ a ☉ kv-říj. — β) *polycarpus*, mnohoplodý; na písčitých kopcích a pasekách dosti obecný. — Na př. nad Stěblovou ! a j.
282. *Scleranthus perennis* L. Ch. ozimý. Na písčitých kopcích, mezích polních i v lesích rozšířený. — ☿ kv-zár. — Na př. na sv. Jánském kopci, na kopci za Roudničkou a nad Stěblovou blíže Srehu ! a nejspíš i jinde.
283. * *Scleranthus intermedius* Kit. (*S. annuus* × *perennis*). Ch. prostřední. Na těžších místech jako předešlé druhy a s nimi pospolu, leč pořádku. — ☉ i ☿ kv-zár. — Na kopci nad Stěblovou blíže Srehu !

10. Řád. *Chenopodiaceae* Vent. Lebedovitě.

284. *Schizotheca patula* Čelak. Lebeda rozkladitá. Na mezích, u cest i jinde na pustých místech, obecná. — ☉ čn-zár.
285. * *Schizotheca rosea* Čelak. L. růžičkovitá. — Na návších často u velikém množství, dosud toliko u Obědovic, Kratoneh ! a Brožan (Č.). — ☉ čnec-srp.

286. † *Spinacia oleracea* L. Spinát zelní. Pěstuje se hojně v zahradách kuchyňských. — ☉ a ☉ kv-zář.
287. † *Beta vulgaris* L. Čvikla. Chová se hojně na polích, některé odrůdy i v zahradách a někdy též zdivočuje. — ☉ i ☉ čnec-zář.
288. *Chenopodium bonus Henricus* L. Všedobr. Na návších, u cest a silnic, u zdí a na rumíštích obecný. — ♀ kv-srp.
289. *Chenopodium hybridum* L. Merlík zvrhlý. Na rumíštích, u cest i jinde na pustých místech, porůznu. — ☉ čnec-srp. — Na poříčí Orlice, v parku Hradeckém, před Plácký, v Předměřicích a j.!
290. *Chenopodium polyspermum* L. M. mnohoosemenný. Na podobných místech jako předešlý, též jen tu a tam roztroušen. — ☉ čnec-zář. — U Slezského předměstí, u Malšovic, za plovárnou Hradeckou! a j.
291. *Chenopodium glaucum* L. M. sivý. Ve vlhkých příkopech silničních, u cest i na vlhčích rumíštích obecný. — ☉ čnec-srp. — Na př. u velíkém množství před cukrovarem v Předměřicích a j.!
292. *Chenopodium rubrum* L. M. červený. Na těchže místech jako předešlý, ale spíšeji. — ☉ srp-zář. — U Pražského předměstí, v Pláckách, ve Smitčicích a j.!
293. * *Chenopodium urbicum* L. M. městský. Na návších, na rumíštích, u cest, zdí pořádku rozšířen, místy však dosti hojný. — ☉ čnec-zář. — Kratonohy! Smitčice (Č.).
294. *Chenopodium album* L. *ampl.* M. bílý. Na návších, pastvinách, v příkopech, na rumných místech, u zdí a jinde na pustých místech, ze všech nejobecnější. — ☉ čnec-zář.
295. *Chenopodium vulvaria* L. M. smradlavý. Na podobných místech jako předešlý, ale jen porůznu rozšířený. — ☉ čnec-zář. — Malšovice, Předměřice, Lochenice, Kratonohy, Ohédovice.!
296. † *Kochia scoparia* Schrad. Bytel metlovitý. Zdivočuje někdy na rumných místech; u Hradce Král. byl pozorován čenkem. — ☉ srp-zář.
297. * *Albersia blitum* Kunth. Hrbozel blít. Ve vsích i v městech, u domu i u příkopu silničných roztroušen. — ☉ čnec-zář. — Týniště.!
298. *Amaranthus retroflexus* L. Laskavec srstnatý. Na polích, u cest, zdí i jinde na pustých místech obecný. — ☉ čnec-zář.

11. Řád. *Ceratophylleae* Gray. Růžkatcovité.

299. * *Ceratophyllum demersum* L. Růžkatec ostnatý. V tůních, rybnících, vodních příkopech, zvláště v Orlici hojný. — ♀ čnec-zář.

12. Řád. **Urticaceae** Endl. Kopřivovité.

300. **Urtica urens** L. Kopřiva menší. Na návších, u zdí, na rumístích i jinde na méně vzdělávané půdě obecná. — ☉ čnec-zář.
 301. **Urtica dioica** L. K. větší. Na podobných místech jako předešlá obecně rozšířena, též u potoků a v lesích hojná. — ☿ čnec-zář.

13. Řád. **Cannabineae** Endl. Konopovitě.

302. **Humulus lupulus** L. Chmel obecný. Na potočích řek, ve vlhkém křoví u potoků, na lukách, v lesích i v plotech sem tam dosti obecný. — ☿ čnec-srp. — Na př. hojný v křovinách podél Orlice a Labe, ve vlhkém houští v lesích Novohradeckých a j. !
 303. † **Cannabis sativa** L. Konopě setá. Seje se na polích i v zahradách pořádku, sem tam též mezi zelím, jež pak pry méně housenkami trpí. — ☉ čnec-srp.

14. Řád. **Moraceae** Endl. Morušovitě.

304. † **Morus alba** L. Moruše bílá. V sadech pro bouree sázených, i v zahradách v okolí Hradce Kr. dosti rozšířená. — ☿ kv.
 † **Morus nigra** L. Moruše černá. Pořádku jen s moruší bílou se vyskytující. — ☿ kv.

15. Řád. **Ulmaceae** Mirbel. Jilmovitě.

305. * **Ulmus effusa** Willd. Vaz. Na vlhkých lukách Polabských, na hrázcích rybníků u vsí i ve vlhkých lesích hojně rozšířený. — ☿ br-dub. — Na př. na březích podél Labe a Orlice i j. !
 306. **Ulmus campestris** Smith. Jilm polní. V lupenatých lesích, hájích, na keřnatých stráních dosti hojný, též v sadech sázený. — ☿ br-dub. — ☿ suberosa, korkovitý, porůznu a jednotlivě, na př. v lesíku pod Zámečkem a j. !

16. Řád. **Eleagneae** R. Br. Hlošínovitě.

307. † **Eleagnus angustifolia** L. *ampl.* Česká oliva. Sází se dosti hojně v zahradách i v sadech. — ☿ kv-čn.

17. Řád. **Thymeleaceae** Juss. Lýkovecovitě.

308. * **Daphne mezereum** L. Lýkovec obecný. Ve vlhkých lesích v kypré půdě, zvláště u potoku dosti hojně rozšířený. — ☿ br-dub. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých, v bažantnici u Dolního Přimu, u Račic a j. !

18. Řád. **Santalaceae** R. Br. Santalovité.

309. ***Thesium linophyllum** L. Lněnka obecná; a) intermedium, prostřední. Na keřnatých stráních, na trávnících a vřesovištích lesních, pořádku. — ž. kv-čnec. — V lese u Račic na jednom místě v hojnosti. !

19. Řád. **Loranthaceae** Don. Ochmetovitě.

310. ***Loranthus europaeus** L. Jméli dubové. Vyskytuje se na dubech sem tam a jednotlivě, na př. u Chvojna (Čen.). — p kv-čn.
311. **Viscum album** L. Jméli obecné. Žije nejvíce na borovicích, jedlích, smrcích, zřídka též na jiných stromech. Na př. v lesích Hradeckých za Malšovicemi „u dvou šranků“, v lesích Novohradeckých, u Svinárek a j. ! — p bí-dub.

20. Řád. **Aristolochieae** Juss. Podražcovité.

312. **Asarum europaeum** L. Kopytník obecný. Ve vlhkých a stinných lesích a hájích v humosní půdě, dosti rozšířen. — ž. dub-kv. — Na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých, na sv. Jánském kopečku, v bažantnici u Dolního Přímu, u Šendražic a j. !

B. *Srostloplůtečné*. Sympetaleae.21. Řád. **Cucurbitaceae** Juss. Tykovité.

313. **Bryonia alba** L. Posed bílý. Na blízku obydlí lidských, nejvíce v plotech zde onde rozšířen. — ž. čn-zář. — Na př. u rybárny Hradecké a j. !
314. †**Cucumis sativus** L. Okurka. Pěstuje se hojně na polích i v zahradách, místy též zdivočuje. — ☉ kv-srp.
315. †**Cucumis melo** L. Meloun. Chová se sem tam v zahradách. — ☉ čnec-zář.
316. †**Cucurbita pepo** L. Tykev obecná. Pěstuje se v zahradách. — ☉ čnec-zář.

22. Řád. **Campanulaceae** Juss. Zvonkovité.

317. **Jasione montana** L. Pavinec obecný. Na písčitých pahorcích a mezích, na pokraji lesů, na suchých trávnících dosti obecný. — ☉ čn-srp. — Na př. hojný na písčínách kolem N. Hradce, Bělce, Svinar. Račic a j. !
318. ***Phyteuma spicatum** L. Řepka klasná. V stinných lesích v kypřé půdě humosní, porůznu. — ž. kv-čn. — V lesíku na sv. Jánském kopci, na Podhůře, v lesích před Bělcem, u Račic a j. !
319. ***Campanula cervicaria** L. Zvonek hadinecovitý. V světlých lesích a hájích i na lesních lukách, velmi pořádku. — ž. čn-srp. — V lesích u Hradce Kr. (R.).

320. **Campanula glomerata* L. Z. klubkatý. Na travnatých stránkách, v světlých lesích, na keřnatých kopcích, nejvíce na vápnité půdě. — 4. čnec-zář. — Na sv. Jánském kopci, v háji nad Pileticemi a nad Blošnem, na Chlumu, u Sendražic a Račic, ! u Holic (Čen.).
321. *Campanula persicaefolia* L. Z. broskvolistý. V lupenatých lesích a hájích, na travnatých kopcích, dosti hojná. — 4. čn-srp. — Na př. v lesíku na sv. Jánském kopci (spoře), v lese u Slatiny, kolem Sendražic, Račic a j. !
322. *Campanula patula* L. Z. rozkladitý. Na lukách, trávnicích i na pokraji lesů kolem Hradce Kr. a j. obecný. — ☉ kv-srp.
323. *Campanula rotundifolia* L. Z. okrouhlolistý. Na podobných místech, jako předešlý, i na zdech obecný. — ☉ kv-srp. — Na př. na lukách a hradbách Hradeckých. !
324. *Campanula rapunculoides* L. Z. řepkovitý. Na pokraji lesu, v pasekách, v lesním houští, v křovištích i na mezích hojně rozšířený. — 4. čnec-zář. — Na př. v lesích Hradeckých a j. !
325. *Campanula trachelium* L. Z. kopřivolistý. Na podobných místech jako předešlý a stejně hojný. — 4. čnec-srp. — Na př. u Svobodných Dvůrů a j. !

23. Řád. *Ambrosiaceae* Link. Řepňovité.

326. **Xanthium strumarium* L. Řepeň obecná. Na březích rybníků a řek i na návších a u cest. — ☉ čnec-zář. — U bývalého rybníka Rozkoše a u Holohlav blíže Smiřic (Č.).

24. Řád. *Compositae* Vaillant. Spoluložné.

1. Podřád. *Cichoriaceae* Juss. Čekankovité.

327. *Lapsana communis* L. Kapustka obecná. V lesích a hájích, zvláště v pasekách, též na zdech a mezích hojná. — ☉ čnec-srp. — Lesy Hradecké, Novohradecké a j. !
328. **Arnoseris pusilla* Gärtner. Písečnatka nízká. Na písčitých polích, úhorech a mezích místy dosti hojná. — ☉ čn-zář. — Hojněji na písčitých polích kolem Bělé, ! u Holic (Čen.).
329. *Cichorium intybus* L. Čekanka obecná. Na mezích, u cest i na návších obecná; u Hradce Král. též na polích setá pro koření, na cikorii potřebovaný. — 4. čnec-srp.
330. *Crepis virens* Vill. Škarda zelená. Na polích, úhorech, pastvinách i u cest dosti obecná, však kolem Hradce Kr. méně hojná nežli následující. — ☉ čnec-zář.
331. *Crepis tectorum* L. Š. střešní. Na těchž místech co předešlá, též na zdech obecná. — ☉ čn-zář. — Na př. na mezích podél dráhy sev.-západní, na polích u Pražského předměstí, Střebské a j. !
332. *Crepis biennis* L. Š. ozimá. Na lukách, u příkopů i na mezích obecná. — ☉ kv-čnec.

333. **Crepis succisaefolia* Tausch. Š. čertkusolistá. Na vlhkých a bařinných lukách i v lesích porůznu. — ž. čnec-srp. — V lesíku mezi Roudničkou a Labem, na lukách za Březhradem s následující pospolu. !
334. *Crepis paludosa* Mönch. Š. bahenní. V bařinných lesích, nejvíce na lukách a mokřadech lesních, místy velmi hojná. — ž. čn-čnec. — Lesy Hradecké, Novohradecké, u Týniště, Boro-hrádku a j. !
335. *Hieracium pilosella* L. Jestřábník chlupáček. a) vul-gare, obecný. Na mezích, travnatých úbočích, v lesních pasekách obecný. — ž. kv-rěj.
336. *Hieracium auricula* L. Myší ouško. Na lukách, lesních mezích a pasekách obecné. — ž. kv-čnec.
337. **Hieracium stoloniflorum* W. et Kit. Jestřábník šlahoun o-květý. Na lesních lukách, paloucích i na mezích jejich po-řídku rozšířen, leč místy hojný. — ž. kv-čn. — Dosud jediné na louce pod Zámečkem u Roudničky a za Březhradem v hoj-nosti, jednotlivě též v lesíku na sv. Jánském kopci, na hradbách Hradeckých a j. !
338. *Hieracium praealtum* Koch. J. vysoký. Na lukách, mezích, v světlých lesích dosti hojný. — ž. kv-zář. — Na př. na lukách před N. Hradcem a kolem Roudničky, na mezích u Štěbáře, na sv. Jánském kopci, v lesích Hradeckých a j. !
339. *Hieracium murorum* L. J. zední. V lesích, na lesních strá-ních, v pasekách, na keřnatých kopcích hojně rozšířen. — ž. kv-zář. — Na př. v lesíku na sv. Jánském kopci, v lesích Hradeckých, Novohradeckých, Přímských a j. !
340. *Hieracium silvaticum* Lamk. J. lesní. V sušších lesích a hájích, v pasekách, jako předešlý hojně rozšířen. — ž. čn-čnec. — Na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j. !
341. *Hieracium laevigatum* Willd. J. hladký. a) tridentatum, trojzubý. Na podobných místech jako předešlé, ale předcházo-jících méně hojný. — ž. čnec-srp. — Lesy Hradecké. !
342. *Hieracium umbellatum* L. J. okoličnatý. Na lukách, v křovinách podél řek, v lesích, zvláště na pasekách hojný. — ž. čnec-zář. — Na př. na lukách kolem Orlice, za Zámečkem, u Březhradu a j. !
343. *Hieracium boreale* Fries. J. severní. V lesích a hájích, zvláště v houštinách dosti obecný. — ž. srp-rěj. — V lesích Hradeckých, Libčanských, na sv. Jánském kopci a j. !
344. *Sonchus arvensis* L. Mléč polní. Na polích, polních mezích, v příkopech, podél cest i v lesích místy dosti hojný. — ž. čnec-zář. — Na př. hojněji na mezích u Svobodných Dvoru, na polích pod Kunětickou Horou a j. !
345. *Sonchus laevis* All. M. hladký. V příkopech silničných, v zahradách, na rumištích, u plotu obecný. — (•) čn-zář.

346. *Sonchus asper* All. M. drsný. Na těchže místech jako předešlý, ale méně hojný. — ☉ čn-rj.
347. **Prenanthes purpurea* L. Věsenka nachová. Ve vlhčích lesích a hájích porůznu. — ♀ čnec-srp. — Dosud jen v lese mezi Račicemi a Habřinou. !
348. *Lactuca muralis* Gärtner. Locika zední. V stinných lesích a hájích, nejvíce v houštinách dosti obecná. — ♀ čnec-srp. — Na př. v lesích Hradeckých a j. !
349. **Lactuca saligna* L. L. vrcholistá. U cest, na mezích, na hrázích podél dráhy, na suchých kopcích, pořádku. — ☉ čnec-srp. — Na Kunětické Hoře, na hradbách Hradeckých (spoře). !
350. **Lactuca scariola* L. L. planá. U cest, na mezích, rumišťích, kamenitých stráních nepřiliš hojná a mnohdy jen jednotlivě. — ☉ čnec-srp. — Na př. u nádraží Hradeckého, na Hoře Kunětické ! a j.
351. †*Lactuca sativa* L. L. zahradní. Pěstuje se hojně v zelenišťích co salát hlávkový. — ☉ a ☉ čnec-srp.
352. **Chondrilla juncea* L. Radyk prutnatý. Na suchých stráních, hrázích, zdech i na mezích pořádku. — ♀ čnec-srp. — Na kraji písčitého boru nad Stéblovou blíže Srehu, ! v Bohdanči (Č.).
353. *Taraxacum officinale* Web. Pampeliška. Na lukách, pastvinách, u cest a mezi velmi obecná. — ♀ dub-zář.
354. **Hypochoeris glabra* L. Prasetsník lysý. Na polích, mezích, hrázích, místy dosti hojný. — ☉ čnec-srp. — U Nov. Hradce, Svinar, Svinárek, za Březhradem, u Stéblové. ! u Bohdanče (Č.).
355. *Hypochoeris radicata* L. P. kořenatý. V příkopech, na mezích, lukách, u cest, v pasekách dosti obecný. — ♀ čnec-srp. — Na př. na lučních mezích před i za Zámečkem a j. !
356. *Leontodon hastilis* Koch. Pampeliška kopinatá. a) glabratý, lysý. Na vlhčích lukách, pastvinách, mezích, u příkopů obecná. b) hispidus, srstnatá. Jako předešlá, leč hojněji v sušších polích. — ♀ čn-zář.
357. *Leontodon autumnalis* L. P. podzimní. Na podobných místech co předešlá a stejně obecná. — ♀ čnec-rj.
358. **Picris hieracioides* L. Hořčík jestřábníkový. Na keřnatých kopech, travnatých návrších dosti porůznu. Ve světlém háji nad Slatinou, ! na hradbách Hradeckých, kdež pozorován byl Drem. Čelakovským, nebyl nověji více nalezen. — ☉ a ♀ čnec-srp.
359. *Tragopogon pratensis* Döll. Kozí brada luční. a) genuinus, pravý. Na lukách, travnatých kopech, mezích hojně rozšířená. — ☉ kv-čnec. — Na sušších lukách kolem Hradce Kr. a j. ! b) *orientalis, východní. Na Kunětické Hoře (spoře) ! a nejspíš i jinde.

360. **Scorzonera humilis* L. Hadí mord nízký. Na vlhkých lukách i na lesních paloučích porůznu, místy však dosti hojný. — 4 kv-čn. — Na lukách u Roudničky a za N. Hradcem.!

II. Podřád. *Corymbiferae* Juss. Chocholičnaté.

361. †*Aster chinensis* L. Hvězdník čínský a některé jiné druhy hvězdníků pěstují se často v zahradách a zdivočují též někdy, na př. na sv. Jánském kopci pod Zámečkem a u náhonu na Hrázce.!
362. *Erigeron acris* L. Turán obecný. Na suchých trávnících, pasekách, mezích všeobecně rozšířený, však zřídka jen u větším množství. — ☉ i 4 čn-zář. — Na př. na mezích a v lesích kolem Hradce Kr.!
363. *Erigeron canadensis* L. Turán kanadský. Na polích, mezích, házích, pasekách, u cest, na porůcích, zdech, všude obecný. — ☉ srp-říj.
364. *Bellis perennis* L. Sedmikráska. Na lukách, trávnících, travnatých mezích a pasekách obecná. — 4 bř-pros.
365. *Solidago virga aurea* L. Zlatobýl obecný. V sušších lesích, na pasekách i na lesnatých stráních dosti hojně rozšířený. — 4 čnec-zář. — Háje nad Pileticemi, Nepasicemi, lesy na Chlumu u Roudničky a j.!
366. **Inula salicina* L. Oman vrcholistý. V lupenatých lesích a hájích, na keřnatých návrších pořádku. — 4 čnec-srp. — Ve světlých lesích nad Pileticemi, v menším množství též na louce u Malšovic, na níž též podanéžník roste.!
367. *Inula britannica* L. O. luční. Na vlhkých lukách, u příkopů, potoků, rybníků, na pokraji tůní obecný. — 4 čnec-srp. — Na př. u Střebse, Plácek a j.!
368. †*Inula helenium* L. O. pravý. Ve vlhkých lesních roklích, poblíže selských zahrádek místy úplně zdivočilý a v hojnějším počtu, tak v lese nad Habřinou blíže osamělé lesní chaty „u Pospíšilu“. — 4 čnec-zář.
369. *Pulicaria vulgaris* Gärt. Blešník obecný. Na vlhkých návrších, pastvinách, návších; na písčitém pobřeží potoků dosti hojně rozšířená. — ☉ čnec-zář. — U Malšovic, Slatiny, Plácek, Opatovic a j.!
370. †*Helianthus annuus* L. Slunečnice obecná. Sází se často v zahradách veškovských a někdy též zdivočuje, tak na př. jednou na břehu Labe v několika exemplárech a j. — ☉ čnec-říj.
371. †*Helianthus tuberosus* L. Topinambur. Chová se sem tam v zahradách selských pro jedlé hlízy své. — 4 říj-listop. — Na př. v Střebši.!
372. *Bidens cernuus* L. Dvojjzubec nízí. Na březích potoků, rybníků, tůní, řek, u příkopů vodních dosti obecně rozšířený a místy velmi hojný. — ☉ srp-říj. — Na př. podél Orlice a j.!

373. *Bidens tripartita* L. D. trojdielný. Na podobných místech jako předešlý, často s ním pospolu a stejně hojný, ne-li hojnější. — ☉ čnec-zář.
374. **Anthemis austriaca* Jacq. Rmen rakouský. U cest, moží i na polích dosud jen v nejbližším okolí Hradce Kr. pozorován, místy však velmi hojný, zvláště před Pražským předměstím u velikém množství. ! — ☉ kv-čnec.
375. **Anthemis ruthenica* M. Bieb. R. ruský. Na podobných místech co předešlý, však výhradně na písčitých půdách. Na písčitých polích kolem Bělče plevel obecný; méně hojně pozorován též na písčitých polích mezi N. Hradcem a Zámečkem, u Lhoty Malšové a u Stěblové. ! — ☉ kv-srp.
376. *Anthemis arvensis* L. R. rolní. U cest, na polích, mezích, rumíštích, u příkopů silničných obecný. — ☉ i ☉ čn-říj.
377. *Anthemis cotula* L. R. smradlavý. Na podobných místech co předešlý dosti obecný. — ☉ čn-říj.
378. *Matricaria inodora* L. Heřmáněk nevonný. Na polích, u cest, příkopů, na návších, pustých místech obecný. — ☉ i ☉ čn-říj.
379. *Matricaria chamomilla* L. H. pravý. Na těchže místech co předešlý, však místy méně hojný. — ☉ kv-srp.
380. *Chrysanthemum leucanthemum* L. Kopretina bílá. V světlých hájích, na suchých lukách, travnatých pasekách a návších velmi rozšířená. — 4. čn-zář. — Na př. na lukách kolem Hradce Kr. a j. !
381. †*Chrysanthemum parthenium* Pers. Řimbaba. Chová se často v zahradách a zdivočuje též někdy, na př. v Předměstích (1880), v Nové Vsi u Týniště (1879). ! a j. — 4. čn-čnec.
382. **Chrysanthemum corymbosum* L. Kopretina chocholičnatá. V sušších lesích a hájích, na keřnatých stráních dosti rozšířena, ač ne příliš hojně. — 4. čn-čnec. — Na př. v lese za Slatinou, v háji nad Blešnem, u Račie, Habřiny a j. !
383. *Chrysanthemum tanacetum* Karsch. Vrátič. Na porůcích, vlhkých lukách, v houštínách, na mezích vlhkých i u cest dosti hojný. — 4. čn-čnec. — Na př. hojněji na lukách podél Orlice mezi Hradcem a Třebechovicemi, za plovárnou Hradeckou a j. !
384. *Achillea ptarmica* L. Bertrám. Podél řek, příkopů, nejvíce ve vlhkých houštínách na lukách, místy hojný. — 4. čnec-zář. — Na př. na lukách, podél Orlice od Hradce k Třebechovicím se táhnoucích, i jinde hojný. !
385. *Achillea millefolium* L. Řebříček obecný. a) genuina, pravý. Na lukách, u cest, mezí, na pokračí lesů i jinde obecný. — 4. čnec-říj.
386. *Artemisia absinthium* L. Polyněk pravý. U cest, mezí, na návších, rumíštích dosti zhusta. — 4. čnec-zář. — Ve vsích kolem Hradce Kr., na Kunětické Hoře a j. !

387. *Artemisia vulgaris* L. Černobýl. Na mezích, u cest, plotů i na návsích obecný. — 4. srp-říj. — Na př. v Střebši a j. !
388. *Artemisia campestris* L. Pelyněk ladní. Na podobných místech jako předešlý a stejně obecný. — 4. srp-říj. — Na př. na mezích na sv. Jánském kopci, na Kunětické Hoře, podél dráhy sev.-západní a j. !
389. **Artemisia scoparia* W. Kit. P. metlatý. Na výslunných kopcích, zderh a skalách pořídku. — ☉ i ☉ srp-zář. — Dosud jen na Kunětické Hoře a sice jen na jižní straně v hojnosti. !
390. †*Artemisia abrotanum* L. brotán, boží dřevce, i *Artemisia dracunculus*, kozalec, pěstují se často v zahradách.
391. **Filago germanica* L. Bělolist německý. Na polích, suchých kopcích, porůžích porůznu, místy však hojný. — ☉ čnc-zář. — Na př. na Podhuře (Čen.), u Dobřenic ! a nespíš i jinde.
392. *Filago arvensis* L. B. polní. Na polích, mezích, pastvinách, písčitých návrších, i v pasekách dosti obecný. — ☉ čnc-zář. — Na př. na polích kolem Hradce Kr. a j. !
393. *Filago minima* Fries. B. nejmenší. Na podobných místech jako předešlý, s ním též často pospolu. — ☉ čnc-zář. — Na př. sem tam na polích kolem Hradce Kr., u Libčan, Puchlovic, Borohrádku a j. !
394. *Gnaphalium dioicum* L. Protěž dvoudomá. V sušších lesích, nejvíce na mýtinách a vřesovištích hojně rozšířena. — 4. kv-čn. — Na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých, Přímských a j. !
395. *Gnaphalium silvaticum* L. P. lesní, a) erectum, obecná. Na podobných místech jako předešlá, stejně hojná i v sušších i ve vlhkých a stinných lesích; na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j. ! — 4. čnc-zář.
396. *Gnaphalium uliginosum* L. P. bažinná. Na vlhkých polích, mezích, na pokraji rybníku, řek i příkopu vlhkých dosti obecná. — ☉ čnc-říj. — Na př. kolem Hradce Kr., Stěblové a j. !
397. **Gnaphalium luteoalbum* L. P. žlutobílá. Na podobných místech co předešlá, ale velmi roztroušena. — ☉ čnc-zář. — Na půdě bývalých rybníků kolem Stěblové velmi rozšířená, jednou též na kraji lesa u Malšovic poskrovnu, ! u rybníků Bohdanečských a u Borohrádku (Č.).
398. **Gnaphalium arenarium* L. P. písčinná. Na písčitých návrších, mezích i u cest porůznu rozšířena, místy však dosti hojná. — 4. čnc-srp. — Na písčitých mezích u Malšové Lhoty, na kopci za Roudnickou, u Stěblové, ! u Bohdaneč (Č.), u Světlé blíže Týniště. !
399. **Arnica montana* L. Prha chlumní. Na lesních lukách, pasekách v kypřé půdě, dosud jen na louce za N. Hradcem (spoře) ! a u Holic (Čen.). — 4. čn-čnc.

400. *Senecio vulgaris* L. Starček obecný. Na polích, mezích, u příkopů silničných, v zahradách i na rumístích obecný. — ☉ bř-rj.
401. *Senecio viscosus* L. S. lepkavý. Na písčitých pasekách, porůcích, návrších i u cest, dosti obecný. — ☉ čn-rj. — Na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j.!
402. *Senecio silvaticus* L. S. lesní. V lesích, na pasekách i jinde obecný, často spolu s předešlým. — ☉ čnec-srp. — V lesích Hradeckých, Borohradeckých a j.!
403. *Senecio Jacobaea* L. Přímětník. Na pokrajích luk, na travnatých mezích, návrších i v lesích dosti obecný. — ☉ i ž. čnec-zář. — Na př. u Farářství, v lesích Hradeckých a j.!
404. **Senecio barbareaefolius* Krock. S. barborkolistý. Na vlhkých lukách, mezích i jinde, jako předešlý, leč jen místy rozšířený. — ☉ čnec-srp. — Na lukách u Hradce Kr. ! u Smiří, Brožan (Č.).
405. **Senecio nemorensis* L. *ampl.* S. hajní. V lese blízce Bělče u náhonu, na březích Labe na několika místech u Hradce Kr. v houštích, nejspíše jen z lesů výše položených splaven. ! — ž. čnec-srp.
406. **Senecio rivularis* DC. *ampl.* S. potoční. Na bažinných lukách lesních, nejvíce u potoků, dosud jen v lese Novohradeckém u Kříže a ve Stupech, zde u velikém množství. ! — ž. kv-čnec.
407. **Tussilago petasites* L. *ampl.* Devětail obecný. Na vlhkých lukách lesních u potoku místy hojný. — ž. bř-dub. — Dle zprávy mně sdělené u Vel. Bělče.
408. *Tussilago farfara* L. Podběl. Na polích, mezích, v příkopech, lesních pasekách obecný. — ž. bř-dub.
409. **Eupatorium cannabinum* L. Konopáč. Ve vlhkých a stinných lesích, nejvíce podél potoků lesních i na mýtinách nepřilís hojný. — ž. čnec-zář. — V lesích Hradeckých a Novohradeckých. ! a j.
410. †*Calendula officinalis* L. Měsíček. Chová se často v zahradách, na blízku nichž někdy též zdivočuje, na př. na Hrázce u náhonu (1878). ! a j.

III. Podřád. Cynarsae Less. Bodlákovité.

411. *Serratula tinctoria* L. Srpek barvířský. Na vlhkých lukách, ve světlých lesích a hájích dosti hojně rozšířen. — ž. čnec-zář. — Na lukách podél Orlice od Hradce k Třebetovicům a j., v lese u Slatiny, Blesna, Borku a j.!
412. *Lappa bardana* Moench. Lopuch obecný. U cest, silnic, na mezích, na porůcích, v křoví, na návrších a rumístích obecný; a) *tomentosa*, pavučinatý, nejhojnější; c) **major*, větší, a e) *minor*, menší, porůznu, na př. u Svobodných Dvůrů. ! — ☉ čnec-srp.

413. *Centaurea jacea* L. Chřpa luční. a) vulgaris, obecná. Na lukách, pastvinách, vlhkých mezích obecná; b) *decipiens, klamná. a c) *pratensis, pérovitá, dosud toliko na lukách mezi Týništěm a Borohrádkem. ! — ☿ čn-rěj.
414. *Centaurea paniculata* Jacq. Ch. latnatá. Na suchých kopech, u cest, na mezích porůznu. — ☹ čnec-zář. — Na mezích u Farářství, kolem Račic, Srchu, blíže Stěblové, na Hoře Kunětické. ! u Bohdanče (Č.).
415. *Centaurea scabiosa* L. Čekánek. Na podobných místech jako předešlá, též v polích co plevel. — ☿ čn-zář. — Na př. na Podhůře a nad Blešnem, na mezích silničných mezi Předměřicemi a Sendražicemi, na Chlumu, kolem Račic a j. !
416. *Centaurea cyanus* L. Chřpa polní. Na polích, mezích, někdy též na rumištích obecná. — ☹ čn-zář.
417. *Onopordon acanthium* L. Trubil. U cest, na rumištích i jiných pustých místech obecný. — ☹ čnec-zář.
418. *Carduus nutans* L. Bodlák nízí. Na podobných místech co předešlý, obecný. — ☹ čnec-zář.
419. *Carduus acanthoides* L. B. obecný. U cest, na mezích, rumištích, u zdí, plotů obecný. — ☹ čnec-zář.
420. *Cirsium lanceolatum* Scop. Pcháč kopinatý. Jako předešlý, ač místy méně obecný. — ☹ čn-zář.
421. *Cirsium palustre* Scop. P. bahenní. Ve vlhkých lesích, nejvíce podél vlhkých příkopů, na bažinných lukách, v mokřadech v našem okolí dosti hojně rozšířený. — ☹ čnec-zář. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých, u Týniště, Borohrádku a j. v hojnosti; na bažinných lukách před Zámečkem, za Novým Hradcem a j. !
422. *Cirsium canum* All. P. šedý. Na sušších lukách i v lesích dosti rozšířený a místy hojný. — ☿ čnec-srp. — Na př. na lukách podél Labe a Orlice, u Březhradu, Roudničky a j. !
423. **Cirsium rivulare* Link. P. potoční. Na vlhkých lukách, podél příkopů vodních v lesích porůznu, místy však hojný. — ☿ čn-zář. — Na bažinné louce za N. Hradcem, ve vlhkých lesích Hradeckých, na lukách u Týniště. !
424. *Cirsium acaule* All. P. nízký. Na lukách, pastvinách, na travnatých návrších a mezích na pokrajích lesů, dosti hojně rozšířený. — ☿ čnec-zář. — Na sv. Jánském kopci, v hájích nad Pileticemi, Slatinou, Habřinou, Račicemi, na Podhůře i na lukách u Březhradu (zde nehojně), na Kunětické Hoře a j. !
425. *Cirsium oleraceum* Scop. P. zelený. Na vlhkých lukách, nejvíce podél potoků, i v lesích hojně rozšířen. — ☿ čnec-zář. — Na lukách podél Orlice, u Roudničky, Týniště, v lesích za N. Hradcem a j. !
426. *Cirsium arvense* Scop. Oset. Na polích, mezích, pasekách, rumištích obecný. — ☿ čnec-srp.

427. **Cirsium tataricum* Wilm. et Grab. (*C. canum* \times *oleraceum*). P. tatarský. Spolu s rodiči na lukách u Roudničky, u náhonu ve Svobodných Dvorech. ! — ž. čec-zář.
428. **Cirsium praemorsum* Michl. (*C. oleraceum* \times *rivulare*). P. ukousnutý. Spolu s rodiči na lukách u Týniště. ! — ž. srp-zář.
429. *Carlina vulgaris* L. Pupava obecná. Na lesních pasekách a suchých stráních, na pokrajích lesů dosti obecná. — ☹ čec-zář. — Na př. v lesích za Zámčkem, na Kunětické Hoře a j. !
430. **Carlina grandiflora* Neil. P. bílá. a) acaulis, bezlodyžná. Na suchých kopech, lesních mezích dosti roztroušená. — ž. čec-zář. — Na trávnatém kopci nad Blošnem a Sendražicemi, v suchých hájích kolem Slatiny a Račic, na Kunětické Hoře. !

25. Řád. Dipsaceae DC. Štětkovité.

431. *Dipsacus silvestris* Huds. Štětka obecná. Na porůvčích, u potoků, příkopů, podél cest, na návších, rumišťích dosti obecná. — ☹ čec-zář. — Na př. podél náhonu ve Svob. Dvorech, v Pláckách a j. !
432. **Dipsacus laciniatus* L. Š. laločnatá. Na podobných místech jako předešlá, ale pořádku. — ☹ čec-zář. — Na pokrajích vodní strouhy blíže Němčic, ! na hrázi bývalého rybníka Oplatila (Č.).
433. *Scabiosa communis* Čelak. Chrástavec obecný. a) arvensis, polní. Na lukách, mezích, paloucích obecný. b) *silvatica, lesní. Sem tam v lesích, na př. u Bohdanče (Mann). — ž. čec-zář.
434. *Succisa pratensis* Mönch. Čertkus luční. Na rašelinných lukách i na lesních paloucích bažinných, hojně rozšířený. — ž. čec-zář. — Na př. na lukách kolem Roudničky, u Dívce, před Borkem a j. !
435. *Asterocephalus columbaria* Wallr. *ampl.* Hlaváč obecný. a) *genuinus*, modrý. V suchých lesích, hájích, na lukách a travnatých stráních dosti hojný; c) *ochroleucus*, žlutavý. Na suchých kopech, mezích, na pokrajích lesů roztroušený, na př. u bývalé bažantnice, pod Chlumem, na Kunětické Hoře, na travnatých mezích u Předměřic, Lochenic, Sendražic, Smiřic, Račic a j. ! — ☹ čec-srp.

26. Řád. Valerianeae DC. Kozlíkovité.

436. **Valeriana officinalis* L. Kozlík lékařský. a) *vulgaris*, obecný. V stinných lesích, ve vlhkém houští na lukách, ve vlhkých příkopech lesních dosti hojně rozšířený. — ž. kv-srp. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých, u Náhonu, na lukách u Týniště a j. !
437. *Valeriana dioica* L. K. dvoudomý. Ve vlhkých lesích, na bažinných lukách, zvláště u potoků lesních velmi hojný. —

4 kv-čn. — Na př. na louce pod sv. Jánským kopcem, v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j.!

438. *Valerianella olitoria* Pollich. Kozlíček jarní. Na polích, mezích, u cest, ve vlhkém houští obecný. — ☉ kv-zář. — ☉ dub-kv.

439. *Valerianella Morisonii* DC. K. zubatý. Na podobných místech co předešlý a stejně hojný. — ☉ čn-srp. — Na př. na polích kolem Hradce Kr. a j.!

27. Řád. *Stellatae* L. Mařinovitě.

440. *Sherardia arvensis* L. Brněka rolní. Na polích, zvláště na úhorech, mezích, písčítých návrších hojně rozšířený. — ☉ kv-zář. — Na př. na polích pod Zámečkem, u Březhradu, Smřic, Týniště a j.!

441. *Asperula odorata* L. Mařinka vonná. V stinných lesích a hájích v kypré půdě humosní hojná. — 4 kv-čn. — Lesy Hradecké, Novohradecké a j.!

442. **Asperula cynanchica* L. M. psí. Na suchých mezích, písčítých kopcích, u cest ne příliš hojně rozšířená. — 4 čn-srp. — Na př. na mezích za rybárnou Hradeckou! a nejspíš i jinde v jižní části našeho okresu.

443. *Galium silvaticum* L. Svízel lesní. Ve světlých lesích a hájích, na pokraji lesů v houštinách hojně rozšířený. — 4 čnec-srp. — Na př. v lese u Slatiny, na sv. Jánském kopci, v lesích Novohradeckých, u Račie a j.!

444. **Galium aristatum* L. S. osinatý. Na těžších místech co předešlý, někdy s ním též pospolu, ale pořádku. — 4 čnec-srp. — Les za N. Hradcem! smrkový les u Borohradku (Č.).

445. *Galium mollugo* L. Povázka. Na lukách, mezích, na pokraji lesů a hájů, zvláště v houštinách obecný. — 4 kv-zář. — Na př. hojný na suchých lukách kolem Hradce Kr. a j.!

446. *Galium verum* L. Svízel syřišťový. Na podobných místech jako předešlý, a stejně rozšířený; b) **Wirtgeni*, *Wirtgenův*. Na vlhkých a rašelinných lukách porůznu, na př. na bažinných lukách kolem Roudnický, Libišan a j. — 4 čn-zář.

447. *Galium silvestre* Pollich. S. chlumní. a) *hirtum*, chlupatý i β) *glabrum*, lysý. V lupenatých lesích a hájích, na keřnatých stráních, místy hojný. — 4 čn-srp. — Na př. v lese na sv. Jánském kopci, v lesích Hradeckých a Novohradeckých, u Račie, Stěblové, na Kunětické Hoře a j.!

448. *Galium uliginosum* L. S. mokřadní. Ve vlhkých příkopech lučních i v lesích, podél tůní a mokřadů dosti obecný. — 4 čn-zář. — Na př. v lesích za Malšovicemi, u Dobfenie a j.!

449. *Galium palustre* L. S. bahenní. Jako předešlý a stejně s ním rozšířený. — 4 čn-srp. — Na př. ve vodních příkopech kolem Hradce Kr., v lese za Malšovicemi a j.!

450. *Galium aparine* Wimm. S. obecný. α) *verum*, pravý. Ve světlých lesích a hájích, na polích, mezích i na porůtích,

hojně rozšířený. — ☉ čn-zář. — Na př. v houštinách na potočce Labe u Hradce Kr. a j.; v lesích kolem Hradce Kr., Stěblavě a j.!

451. *Galium cruciata* Scop. S. křížatý. Ve světlých lesích, nejvíce v houštinách, též ve vlhkém křoví u potoků rozšířený a místy hojný. — ž. db-srp. — U náhonu blízko Malšovic, v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j.!
452. *Galium boreale* L. *ampl.* S. roverní. Na lukách, lesních paloučích, na pokraji lesu dosti obecně rozšířen. — ž. čn-srp. — Na lukách kolem Hradce Kr. a j.!

28. Řád. Caprifoliaceae Juss. Zimolézovitě.

453. * *Lonicera xylosteum* L. Zimoléz obecný. V lupenatých lesích a hájích co podrost, sem tam rozšířen. — ž. kv-čn.
454. † *Lonicera caprifolium* L. Kozi list, růže jeriánská, a *Lonicera tatarica* L. Zimoléz tatarský, pěstují se zhusta v zahradách; první na besídkách a zdech, jež popíná, druhý nejvíce v plotech.
- † *Symphoricarpos racemosa* Michx. Pamelník hroznatý. Keř tento, ze sev. Ameriky porházející, sází se hojněji v sadech, sem tam i v plotech, kdež někdy též zpola zdívočuje.
455. * *Adoxa moschatellina* L. Pižmovka obecná. Ve světlých lesích a hájích, nejvíce pod křovím v kypřé humosní půdě porůzná, místy však velmi hojný. — ž. dub-kv. — V lese pod Záměčkem, v divokém sadě u Správců, v dubině u Brezhradu a j.!
456. *Sambucus nigra* L. Bez černý. Ve vlhkém křoví u potoků, v lesích, v plotech, zvláště ve vesnicích dosti obecný, i v sadech a zahradách sázený. — ž. dub-kv. — Silnější kmeny na př. na Kozince v Hradci Kr. a j.!
457. * *Sambucus racemosa* L. B. červený. Ve vlhkých lesích, na pasekách i u potoků lesních, dosti hojný. — ž. dub-kv. — Lesy Hradecké, Novohradecké a j.!
458. *Viburnum opulus* L. Kalina obecná. V lupenatých lesích a hájích, na potočce ve vlhkém křoví dosti rozšířena, i v sadech zhusta sázená. — ž. kv-čn. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých, na březích Labe, v bývalé bažantnici Hradecké a j.!

29. Řád. Oleaceae Lind. Olivovitě.

459. *Ligustrum vulgare* L. Ptačí zob obecný. V lupenatých lesích a hájích, i v houštinách hojný, též v plotech a libosadech zhusta sázený. — ž. čn-čnec. — Na př. v lesích Dobřeničských, v parku Hradeckém, v plotech podél dráhy a j.!
460. † *Syringa vulgaris* L. Šeřík obecný. Sází se hojně v sadech a zahradách a zdívočuje též někdy. — ž. kv-čn.
461. † *Syringa persica* L. Š. perský a *Syringa chinensis* Willd. Š. čínský pěstují se též, ač řídkěji, v libosadech a zahradách.

462. *Fraxinus excelsior* L. Jasan obecný. Ve světlých lesích porůznu; u cest, silnic, v stěmňadích i ve vesnicích dosti hojně sázený. — p dub-kv.

30. Řád. *Apocynaeae* R. Br. Brěálovitě.

463. * *Vinca minor* L. Brěál menší. Ve světlých lesích a hájích místy velmi hojný, i v zahradách zhusta sázený. — p dub-kv. — V lese u Slatiny u velikém množství i v lesích u Boru, Přímu.!

31. Řád. *Asclepiadeae* R. Br. Tolitovitě.

464. * *Vincetoxicum officinale* Mönch. Tolita lékařská. Na pokrajích sušších lesů, na keřnatých výslunných úklonech, jak se zdá, velmi porůznu. — ž. čn-srp.

32. Řád. *Gentianeae* Juss. Hořcovitě.

465. * *Menyanthes trifoliata* L. Vachta třílistá. V slatinných olšinách a bařinách místy dosti hojná, dosud jen u rybníka Týnišského! a u Bohdánce (O.). — ž. kv-čn.
466. * *Gentiana pneumonanthe* L. Hořepník. Ve vlhkých lesích na travnatých úklonech, na vlhkých lukách dosti roztroušený. — ž. čnec-zář. — Na „Černé stráni“ v lesích Hradeckých! u Chvojna (O.).
467. * *Gentiana ciliata* L. Hořec brvitý. Na keřnatých neb lesnatých návrších v pudě vápnité porůdku rozšířený. — ž. srp-říj. — Na sv. Jánském kopci spolu s následujícími.!
468. * *Gentiana amarella* L. H. obecný. a) genuína, pravý. Na bařinných lukách dosti porůdku. — ☉ srp-říj. — Na sv. Jánském kopci i na vlhkých lukách kolem Roudničky! a nejspíš i jinde.
469. *Erythraea centaurium* Pers. Zeměžluč obecná. V lesích, na pasekách, paloucích, vřesovištích dosti rozšířena, ač zřídka kdy hojně. — ☉ a ☉ čnec-zář. — V lesíku na a pod sv. Jánským kopcem, v hájích kolem Slatiny, Blešna, Lihčana a j.!
470. * *Erythraea ramosissima* Pers. Z. nízká. Na lukách, mezích, vlhkých pastvinách u příkopů a rybníků roztroušená. — ☉ i ☉ čnec-zář. — Na př. u Slatiny, Březhradu, nad Libčany, u rybníka Novoveského blíže Týniště.!

33. Řád. *Borragineae* Juss. Brutnákovitě.

471. * *Asperugo procumbens* L. Ostrolist položený. U cest, plotů, na rumišťích i jinde na pustých místech, velmi porůdku. — ☉ kv-čn. — U Hradce Kr.!

472. **Cynoglossum officinale* L. Užanka lékařská. Namezích, u cest, na výslunných úklonech porůznu. — ☉ ěn-ě nec. — U Hradce Kr. a Smřic.!
473. **Echinosperrnum lappula* Lehm. Strošek obecný. Na suchých kopečích, hrázích i u cest místy hojněji. — ☉ i ☉ ěn-srp. — Na Hoře Kunětické! u Bohdanče (Pospíchal).
474. **Omphalodes scorpioides* Schrank. Pupkovec pomněnkovitý. V travnatém houští v kypré půdě. Velmi hojný v divokém sadě u Správců spolu s dynnivkou dutou. — ☉ db-kv.
475. **Myosotis sparsiflora* Mik. Pomněnka řídkokvětá. Ve světlých lesích a hájích, v houští lesním místy dosti hojně rozšířená. — ☉ kv-ě n. — V dubině u Brezhradu.!
476. **Myosotis caespitosa* Schultz. P. trsnatá. Podél příkopů vodních, rybníků, tůní nepřilíš zhusta. — 4 kv-zář. — U močálů podél dráhy sev.-západní, u příkopů vodních za Malšovicemi, u Farářství a j.!
477. *Myosotis palustris* Roth. P. bahenní. Na podobných místech co předešlá, někdy s ní též pospolu, leč mnohem hojněji, i v lesích hojně rozšířená; sem tam roste i u náhonů a příkopů vodních ve vsích, na př. v Pláče; ! β) parviflora, drobnokvětá, pořídka. — 4 kv-zář.
478. *Myosotis silvatica* Hoff. P. lesní. V lesích a hájích v kypré půdě dosti hojně rozšířená. — 4 i ☉ kv-ě n.
479. *Myosotis intermedia* Link. P. prostřední. Na polích, úhorech i v lesních pasekách nezdídka. — ☉ i ☉ ěn-zář. — Na př. na polích kolem Střebše.!
480. **Myosotis hispida* Schlecht. P. srstnatá. Na suchých lesních stránkách, v mýtinách a křovištích pořídka. — ☉ kv-ě n. — V lesích Hradeckých u náhonu blíže Bělče dosti spore.!
481. **Myosotis versicolor* Sm. P. měňavá. Na podobných místech jako předešlá, místy u velikém množství. — ☉ kv-srp. — Na př. na polích kolem Střebše, u Týniště a j.!
482. *Myosotis stricta* Link. P. tuhá. Na mezích, úhorech, u cest, na pokraji lesů velmi hojná. — ☉ db-kv. — Pole kolem Hradce Králové, zvláště u Malšovic a j.!
483. *Lithospermum arvense* L. Kamejka rolní. Na polích, mezích i na hrázích obecná. — ☉ db-ě n.
484. *Echium vulgare* L. Hadinec obecný. U cest, na mezích, úhorech, zdech a rumištích obecný. — ☉ ěn-zář.
485. *Cerinthc minor* L. Voskovka meší. Na mezích, u cest, na suchých trávnících i v světlém houští, porůznu. — 4 i ☉ kv-srp. — U silnic kolem Hradce Kr., pod Zámečkem, na Chlumu, u Rusku, před Líbčany, u Dolního Přímů, Račic, na Kunětické Hoře a j.!
486. *Pulmonaria officinalis* L. Plicník obecný. V stinných lesích a hájích, zvláště podél potoku, hojně rozšířený. —

- Na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých, na Zámečku, v dubině Hradecké a j. ! — 4. dub-kv.
487. **Nonnea pulla* DC. *Pipla* osmáhlá. Na suchých mezích, u cest, na výslunných návrších, roztroušená. — 4. kv-srp. — Na Chlumu (Č.).
488. *Anchusa officinalis* L. Pilát lékařský. Na lukách snáhších, travnatých návrších i na travnatých mezích hojná. — 4. i ☉ kv-zár. — Na př. na hradbách Hradeckých; β) **albiflora*. bělokvětý, v několika exemplárech v parku Hradeckém na břehu Orlice. !
489. *Lycopsis arvensis* L. Prlina rolní. Na písčitých polích, úbořech, kopečích a polních mezích dosti rozšířená, ač nikde příliš hojná. — ☉ a ☉ kv-zár. — Na polích kolem Střebše, u N. Hradce. Věkoše, Svinar, Bělče, Němčic u Světlé blíž Těmštic ! u Bohdanče (Č.) a j.
490. *Symphytum officinale* L. Kostival lékařský. Na lukách, podél příkopu vodních hojný. — 4. kv-zár. — Na př. na lukách kolem Hradce Kr. ! β) **albiflorum*. bělokvětý, na lukách podél Orlice místy dosti hojný, na př. na lukách před a za Zámčkem, kolem Březhradu a j. !

34. Řád. *Convolvulaceae* Vent. Svlačcovité.

491. *Convolvulus arvensis* L. Svlačec rolní. Na polích, travnatých mezích, kopečích, u cest obecný. — 4. čn-říj.
492. *Convolvulus sepium* L. S. větší. Na poliích i u potoků, ve vlhkém houští, hojně rozšířený. — 4. čnec-zár. — Na př. na březích Labe a Orlice u Hradce Kr. !

35. Řád. *Cuscutaeae* Link. Kokoticovité.

493. **Cuscuta epithymum* Mur. Kokotice menší. V jetelístích, na suchých lukách lesních i jinde hubě kružinku, mateřídoušku a p. — ☉ čnec-srp. — U Hradce Kr. !

36. Řád. *Solaneae* Juss. Lilkovité.

494. *Solanum nigrum* L. Lilek obecný. Na návrších, u cest, na rumištích i jinde na pustých místech obecný. — ☉ čn-říj.
495. *Solanum dulcamara* L. Potměchuť. Ve vlhkých lesích i na lukách v křoví podél potoků, u rybníků a řek hojně rozšířená. — 4. čn-srp. — Na sloupcech kamenného mostu přes Labe, v lesích Novohradeckých, u náhonu v Pláckách, Opatovicích a j. !
496. †*Solanum tuberosum* L. Brambor. Sází se hojně na polích a zdivočuje též někdy. — 4. čnec-srp.
497. †*Solanum lycopersicum* L. Rajske jablko. Pěstuje se v zahradách. — ☉ čnec-říj.

498. † *Lycium barbarum* L. Kustovnice. Sází se zhusta do plotů a místy též zdivočuje. — ♀ čn-srp. — Na př. v Pouchově, na Pražském předměstí, v Hradci samém i j.; zdivočilá na př. v Předměřicích. !
499. * *Atropa belladonna* L. Rulík jedovatý. Ve vlhkých lesích zvláště v pasekách pořádku. — ♀ čn-srp. — V lesích u Hradce Kr. (R.).
500. *Datura stramonium* L. Durman obecný. U cest, na mezích, rumištích i jinde na pustých místech roztroušený. — ☉ čnec-zář. — Na př. před Pražským předměstím, u Plotiště, N. Hradce, Pláček a j. !

37. Řád. *Scrofulariaceae* R. Br. Krtičníkovité.

501. *Verbascum phlomoides* L. *ampl.* Divizna velkokvětá. U cest, na rumištích, travnatých návrších, suchých stráních lesních dosti hojně rozšířená. — ☉ čnec-zář. — V lese u Svinar, Habřiny, Borohrádku a j. !
502. *Verbascum thapsus* L. p. D. malokvětá. Na podobných místech jako předešlá i stejně hojná. — ☉ čnec-zář.
503. *Verbascum lychnitis* L. D. knotovkovitá. U cest, na suchých travnatých úklonech, mezích, rumištích, jako předešlé rozšířená. — ☉ čn-srp. — Na př. na mezích kolem Hradce Kr., na Kunětické Hoře a j. !
504. * *Verbascum blattaria* L. D. červíková. Podél náhonů, na poliích, u potoků roztroušená. — ☉ čn-srp. — U náhonu v Pláčkách a ve Svobodných Dvorech ! u Bohdanče (O.).
505. * *Verbascum phoeniceum* L. D. brunnátná. Na travnatých kopečích, mezích i na pokraji lesu sporá. — ☉ kv-srp. — U Hradce Kr. (K.).
506. *Scrophularia nodosa* L. Krtičník hliznatý. Ve vlhkém křoví, u potoků, řek, příkopů vodních, v světlých hájích a lesích hojně rozšířený. — ♀ čn-srp. — Na př. pod Zámečkem, v lesích Novohradeckých, u Libčan, Borku a j. !
507. * *Scrophularia alata* Gilib. K. křídlatý, a Ehrharti, Ehrhartův. Podél náhonů, potoků, řek nejvíce v křovištích, roztroušený. — ♀ čn-srp. — U náhonu ve Svob. Dvorech, v Pláčkách, Plotištích, Předměřicích a j. !
508. * *Limosella aquatica* L. Blatěnka obecná. Na březích řek, rybníků i tuní nepříliš hojná. — ☉ i ☉ čnec-zář. — U Hradce Kr. (Č.).
509. * *Lindernia pyxidaria* All. Puštička rozložená. Na vlhkých březích tuní a rybníků, dosud jen v několika exemplarech u tuní mezi Slezským předměstím a Orlicí. ! — ☉ čnec-srp.
510. * *Gratiola officinalis* L. Konítrud lékařský. Na vlhkých lukách, podél příkopů vodních, velmi pořádku. — ♀ čn-srp. — U Hradce Králové (Kr.).

511. **Linaria spuria* Mill. Zvěšínec huňatý. Na rolích v jílovité a vápnité půdě porůznu, však místy u velikém množství. — ☉ čnc-zár. — Na polích nad Slatinou r. 1880.!
512. **Linaria minor* Desf. Lnice menší. Na polích, porůžích i u cest porůznu. — ☉ čn-zár. — Na pobřeží Labe u Plácek.!
513. *Linaria vulgaris* Mill. Květel. Na polích, polních mezích, úhorech, u příkopů silnic obecný. — ☿ čn-zár.
514. **Antirrhinum orontium* L. Hledík menší. Na podobných místech co předešlý, pořádku. — ☉ čnc-srp. — Na břehu Labe u Hradce Kr., nejspíše jen splaven.!
515. †*Antirrhinum majus* L. H. větší. Sází se hojně v zahradách a zdívkuje též někdy. — ☉ i ☿ čn-srp.
516. **Digitalis ambigua* Mur. Náprstník hlinožlutý. V sušších lesích a hájích, nejvíce na pasekách a keřnatých, výslunných stráních, místy dosti hojný. — ☿ čn-srp. — V lese u Svínar, Chlumu, Habřiny a j.!
517. *Veronica beccabunga* L. Rozrazil potoční. V příkopech vodních, potocích, na lukách i v lesích a u silnic, obecný. — ☿ kv-srp.
518. *Veronica anagallis* L. R. vodní. Na těchže místech co předešlý rozšířený, ale jak se zdá méně hojný. — ☿ kv-zár.
519. *Veronica scutellata* L. R. štítkatý. Na pokrajích rybníků, tůň, vlhkých příkopů i v lesích, nezářka. — ☿ čn-zár. — V tůňkách lesních za Malšovicemi. N. Hradcem a j.; ve vodních příkopech u Slezského předměstí a j.; u rybníka Onjezdského! a j.
520. *Veronica officinalis* L. R. lékařský. V sušších lesích, zvláště na pasekách, sem tam i na lukách, hojně rozšířený. — ☿ čn-srp. — Na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j., na lukách za N. Hradcem a j.!
521. *Veronica chamaedrys* L. Rozekvítek. Na lukách, trávnicích, mezích i v světlých hájích obecný. — ☿ db-čn.
522. **Veronica teucrium* Willd. Rozrazil ožankolistý. a) latifolia, široolistý. Na suchých lukách, výslunných kopcích, travnatých návrších, pořádku. — ☿ čn-čnc. — Na lukách blízce Svínárek a Správců nepříliš hojný; v lese u Račic, na Knětické Hoře.!
523. *Veronica prostrata* L. R. rozprostřený. Na suchých lukách, travnatých návrších a mezích místy velmi hojný. — ☿ kv-čn. — Na lukách u Malšovic, na mezích u Slezského předměstí a j.; na Knětické Hoře! u Bohdanče (Č.).
524. **Veronica longifolia* L. *ampl.* R. dlouholistý. Ve vlhkém křoví u řek a potoků, nepříliš rozšířený, ač sem tam dosti hojný. — ☿ čnc-srp. — V houštinách podél Labe a Orlice u Hradce Kr., též na lukách i u některých tůň Orlických.!

525. **Veronica spicata* L. R. klasnatý. Na pokraji suchých lesů, travnatých stráních porůdku. — 4. čn-srp. — V boru před Březhradem. !
526. *Veronica serpyllifolia* L. R. douškolistý. Na vlhkých mezích, pastvinách, u příkopu i na porůčích dosti obecný. — 4. db-zář. — Na př. na lukách a úhorech kolem Hradce Kr., Rusku a j. !
527. *Veronica arvensis* L. R. rolní. Na polích, úhorech, polních mezích obecný. — ☉ dub-zář. — Na př. na polích u Slatiny, Střebše a j. !
528. *Veronica verna* L. R. jarní. Na pokraji lesů, travnatých úhořích, místy velmi hojný. — ☉ dub-zář. — Na př. na hradbách Hradeckých, na polích kolem Střebše, N. Hradce, Svinar, Bělče, u bývalé bažantnice a j. !
529. *Veronica triphylla* L. R. trojdílný. Na polích, mezích, úhorech obecný. — ☉ bř-kv.
530. *Veronica persica* Poir. R. perský. Na podobných místech jako předešlý a stejně rozšířený. — ☉ dub-rěj. — Na př. na polích kolem Hradce Kr. a j. !
531. **Veronica agrestis* Fries. R. polní. Na písčitých polích, mezích, úhorech, sem tam i v zahradách, místy u velikém množství rozšířený. — ☉ dub-zář. — Na polích kolem Střebše a Nov. Hradce. !
532. *Veronica polita* Fries. R. lesklý. Jako předešlý, ale obecně rozšířený. — ☉ bř-rěj.
533. *Veronica hederaefolia* L. R. hřečfanolistý. Na suchých lukách, travnatých mezích, návrších i v zahradách obecný. — ☉ bř-kv.

38. Řád. *Rhinanthaceae* M. em. Kokrhelovitě.

534. **Pedicularis palustris* L. Všivec bahenní. Na lesních bažinách, u příkopů mokřích i na bažinných lukách roztroušený, ať místy hojný. — ☉ čn-čnec. — Velmi hojný na bažinné olšině za N. Hradcem i jinde, v lesích Novohradeckých, na lukách za N. Hradcem k Roudníčce, u Březhradu a j. !
535. *Pedicularis silvatica* L. V. lesní. Na vlhkých lukách lesních, hojněji než předešlý rozšířen. — ☉ i 4. kv-čn. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých, na louce u Svinar, Stěžer a j. !
536. *Alectorolophus parviflorus* Wallr. Kokrhel malokvětý. Na lukách, travnatých návrších dosti obecný. — ☉ kv-čn. — Na lukách kolem Hradce Kr. a j. !
537. *Alectorolophus grandiflorus* Wallr. K. velkokvětý. a) major, větší. Na vlhkých lukách a polích dosti obecně rozšířen. — ☉ čn-čnec. — Na př. na polích kolem Střebše, N. Hradce a j. ! b) hirsutus, huňatý. Jako předešlý, ale méně rozšířen. Na př. na polích u Březhradu, Račie a j. !

538. *Euphrasia odontites* L. Zdravínok. Na vlhkých lukách, polích, mezích hojně rozšířený. — ☉ čn-zář. — Velmi hojný na lukách a polích kolem Hradce Kr., zvláště kolem Střebše, N. Hradce a j.!
539. *Euphrasia officinalis* L. Ambrožka. a) *pratensis*, luční. Na lukách, pastvinách, travnatých mezích obecná; b) *nemorosa*, lesní. V suchých hájích a lesích takéž velmi rozšířená. — ☉ čnec-zář.
540. **Melampyrum cristatum* L. Černýš hřebenatý. V světlých hájích, na keřnatých stráních nejvíce na vápnité půdě. — ☉ čn-srp. — V lupenatém lese nad Piloticemi.!
541. *Melampyrum arvense* L. Č. rolní. Na polích, mezích porůznu, ač místy dosti hojný. — ☉ čn-zář. — Na př. na polích u Střebše, Račic a j.!
542. *Melampyrum nemorosum* L. Č. hajní. a) *genuinum*, pravý. V světlých lesích a hájích, nejvíce v lesním houští místy hojný, tak v lesíku na sv. Jánském kopci, u Roudničky, Slatině, Blešna, Nepasie, Račic, Habřiny, Stěhlové, Borohrádku a j. b) **stenophyllum*, úzkolistý. Vyskytuje se místo předešlého v lesích Hradeckých, Novohradeckých, u Týniště a Borohrádku. — ☉ čnec-zář.
543. *Melampyrum pratense* L. Č. luční. Jako předešlý, s ním obvykle pospolu, obecně rozšířený. — ☉ čn-srp. — Na př. v lesíku na sv. Jánském kopci, v lesích Hradeckých, Novohradeckých, kolem Račic a j.!
544. **Lathraea squamaria* L. Podbílek šupinatý. V stinných a vlhkých lesích v kypré půdě humosní na kořenech stromu pořídku. — 4. bř.-kv. — V lesích Hradeckých na Škvárovce.!

39. Řád. *Orobanchaeae* Juss. Zárázovité.

545. **Orobanche procera* Koch. Záráza pcháčová. V stinných lesích na pcháčích (*Cirsium palustre*, *arvense*, *oleraceum* a j.), velmi pořídku. — ☉ čn-čnec. — V lesích Hradeckých na pasece Obicka zvané na *Cirsium palustre* r. 1878 ve dvou exemplárech.!

40. Řád. *Verbenaceae* Juss. Sporyškovité.

546. *Verbena officinalis* L. Sporyš lékařský. Na návsích, nejvíce podél vlhkých příkopů, u cest, místy dosti obecný. — 4. čn-zář. — Na př. v Pláckách, Plotišti, Slatině, ve Věstarcích, Holohlavech a j.!

41. Řád. *Labiatae* Juss. Pyskaté.

547. *Mentha silvestris* L. Máta lesní. Podél vlhkých příkopů, náhonů, řek roztroušená, ale místy hojná. — 4. čnec-zář. — Na cestě k Bohdaneckým dvorům, u Plotišť, Lučenic, v Pláckách, u Světlé blíže Týniště a j.!

548. *Mentha aquatica* L. *ampl.* M. vodní. Podél vodních příkopů, potoků, na bažinných místech, na lukách i v lesích hojně rozšířená; c) *verticillata*, přeslenitá, nejhojněji; a) *capitata*, hlavatá, řídkěji; na př. v lese za Malšovicemi! b) *subspicata*, klasnatá, jednotlivě mezi a), na př. u Bohdanče (Č.). — 2. čec-zář.
549. *Mentha arvensis* L. M. rolní. Na podobných místech jako předoslá, i na vlhkých polích obecná. — 2. čec-zář. — Na př. u příkopu podél dráhy sev.-západní a j.!
550. † *Mentha piperita* L. M. pepřná. *Mentha hortensis* Tach., M. zahradní a některé jiné druhy máť pěstují se hojně v zahradách a někdy snad i zdivočují.
551. *Lycopus europaeus* L. Karbinec obecný. U potoků, příkopů, tůní i na březích řek obecný. — 2. čec-srp. — Na př. u náhonu v Pláckách, v lese Novohradeckém a j.!
552. * *Origanum vulgare* L. Dohromysl obecná. Ve výslunných a světlých lesích a hájích, na keřnatých stráních i na suchých lesních mezích dosti porůznu. — 2. čec-srp. — Dosud jen v lesích i na mezích kolem Sendražic a Račic a na Kunětické Hoře.!
553. † *Origanum majorana* L. Marjánka. Pěstuje se zhusta v kuchyňských zahradách.
554. *Thymus serpyllum* L. Mateří douška. a) *chamaedrys*, obecná. Na travnatých mezích, kopečích, na lukách všude rozšířená. — 2. kv-zář.
555. † *Thymus vulgaris* L. tymián, *Satureja hortensis* L. saturej a některé jiné pyskokvěté sázejí se hojněji v zahradách.
556. *Calamintha acinos* Clair. Pamětník. Na suchých kopečích, mezích, úhorech, výslunných úklonech, porůznu. — 2. čn-zář. — Na př. na úhorech mezi N. Hradcem a Zámečkem, u Svinar. Bělče, na Kunětické Hoře a j.!
557. *Calamintha clinopodium* Spenner. Klinopád. Ve světlých lesích a hájích nejvíce v houštinách místy hojný. — 2. čec-zář. — Na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých, na Kunětické Hoře, u Týniště a j.!
558. * *Salvia verticillata* L. Salvěj přeslenatá. Na suchých mezích, výslunných kopečích, pořádku rozšířena. — 2. čn-zář. — Na travnaté stráni v Předměstích proti hostinci u Zadrobílků, na travnatých mezích podél dráhy železné u Smřic! a nejspíš i jinde ještě.
559. *Salvia pratensis* L. Š. luční. Na lukách, travnatých mezích, návrších dosti obecná. — 2. kv-srp. — Na př. na lukách kolem Hradce Kr. a j.!
560. *Glechoma hederacea* L. Popenec obecný. Na mezích, lukách, u cest, plotů i v zahradách obecný. — 2. db-čn.
561. *Nepeta cataria* L. Šanta kočičí. Ve vsích, u příbytků lidských, na rumištech dosti rozšířená, ač ne hojně. — 2. čn-zář.

— Na př. u Hradce Kr., na Kunětické Hoře, v Brozanech, u Týniště!

562. * *Melittis melissophyllum* L. Medovník. V lupenatých lesích zřídka, místy ale hojný. — 4 kv-čn. — V lese u Slatiny, mezi Račicemi a Babřinou, v háji u Sendražic!
563. *Galeopsis ladanum* L. Konopice rolní. a) latifolia, širolistá. Na polích, výslunných stráních, hojná. — ☉ čnec-zář. — Na polích u Hradce Kr.!
564. *Galeopsis tetrahit* L. K. srstnatá. a) genuina, polní. Na polích i v lesních pasekách obecná; b) pubescens, pýřitá, pořídka na př. u rybníku Bohulaneckých. (Č.). — ☉ čnec-zář.
565. *Betonica officinalis* L. Bukvice lékařská. V lesích, hájích, na sušších lukách, hojně rozšířená. — 4 čn-srp. — Na př. na lukách před Střebsí, v lesích Hradeckých a j.!
566. * *Stachys germanica* L. Čistec německý. Na suchých kopcích, mezích, na výslunných stráních, pořídka. — ☉ i 4. — U Hradce Králové. (Sp.)
567. *Stachys silvatica* L. Č. lemní. Ve vlhkých lesích a hájích, nejvíce v křoví u potoku, dosti rozšířený, ale ne příliš hojný. — 4 čn-srp. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých, v dubině u Březhradu, Dolního Přímu, Stěblové, Dobřenic a j.!
568. *Stachys palustris* L. Č. bahenní. Na vlhkých polích, podél příkopu vodních i u potoků a ve vlhkém křoví dosti obecný. — 4 čnec-srp. — Na př. na polích a u náhonů kolem Hradce Kr.!
569. * *Stachys annua* L. Č. letní. Na suchých mezích, kopech, u cest roztroušený. — ☉ čnec-zář. — Na břehu Labe před Pláckv, nejspíše jen splaven.
570. * *Stachys recta* L. Č. přímý. Na suchých travnatých mezích, keřnatých stráních pořídka. — 4 čn-srp. — Na př. na mezích blíže Račic, na Kunětické Hoře.!
571. *Ballota nigra* L. ampl. Šedivka černá. Na návších, u cest a silnic, ve křoví na porážkách, v plotech, na rumištích obecná. — 4 čn-zář.
572. *Lamium amplexicaule* L. Hluchavka objímavá. Na polích, mezích, rumištích i v zahradách obecná. — ☉ bř-ríj. — Na př. na polích u Malšovic a j.!
573. *Lamium purpureum* L. H. nachová. Na podobných místech jako předešlá, obecná. — ☉ bř-list.
574. *Lamium maculatum* L. H. blamatá. Ve vlhkém křoví na mezích, u potoků, v stinných lesích dosti hojně rozšířená. — 4 bř-čnec.
575. *Lamium album* L. H. bílá. Na mezích ve vlhkém křoví, ve vřích u příkopu, zdí, plotů velmi rozšířená a obecná. — 4 db-zář.
576. *Lamium galeobdolon* Crantz. Pítluník. V lesích a hájích, nejvíce na vlhkých místech, na př. u potoku porůznu. — 4 db-

- žen. — Na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých, u Dolního Přímu, v lesíku na sv. Jánském kopci a j.!
577. *Leonurus cardiaca* L. Srdečník obecný. Na návších, u silnic, plotů i jinde na pustých místech. dosti hojně rozšířený. — ž. čnec-srp. — Na př. v Střebsi, v Pileticích a j.!
578. **Chaeturus marrubiastrum* Rehb. Kožičí chvost. Na podobných místech jako předešlý, v jižnější části místy hojný. — ☉ i ☉ čnec-srp. — Pod Kunětickou Horou u Rábu a Brožan, u býv. rybníka Oplatila (Č.).
579. **Marrubium vulgare* L. Jablečník obecný. Jako předešlý rozšířen. — ž. čnec-zář. — U Sendražic! Kunětic a Brožan (Č.).
580. *Scutellaria galericulata* L. Šišák obecný. Podél příkopů vodních, náhonu, rybníku, na pokrajích tůň lučních, ve vlhkém krovu na porůčí dosti rozšířený, ač ne všude hojně. — ž. čnec-zář. — Na př. v lesích Hradeckých, u náhonu Březhradského, u rybníků na př. za Dobřenicemi a j.!
581. **Scutellaria hastifolia* L. Š. hrálovitý. Na podobných místech co předešlý. — ž. čn-srp. — Dosud jen na jediném místě v divokém sadě (Dotčelové háji) u Správců v hojnosti s *Allium scorodoprassum*!
582. *Prunella vulgaris* Jacq. Černohlávek obecný. Na lukách, mezích, v lesích a hájích, nejvíce na pokrajích, obecně rozšířen. — ž. čn-zář. — Na př. na lukách kolem Malšovic a j.!
583. **Prunella grandiflora* Jacq. Č. velkokvětý. Na suchých travnatých kopečích, na lukách a mezích, zvláště na vápnité půdě, porůdku. — ž. čn-zář. — Dosud jen v lesích a na mezích u Sendražic a Račic.!
584. *Ajuga reptans* L. Zběhovce plazivý. Ve vlhkých lesích, na lukách a mezích dosti hojně rozšířený. — ž. kv-čn. — Na př. v lesích Hradeckých, u Týniště, Borohrádku a j.!
585. *Ajuga genevensis* L. Z. lesní. V lesích a hájích, v pasekách, na lesních lukách, na vlhkých mezích travnatých a j. hojně rozšířen. — ž. kv-zář. — Na př. na lukách kolem Hradce Kr. a j.!
586. **Teucrium scordium* L. Ožanka čpavá. Na bažinných lukách, mokřadech, podél vodních příkopů a rybníků nezdědka. — ž. čnec-zář. — Na lukách kolem Roudničky, podél sov.-západní dráhy u Slezského předměstí, pod hradbami Hradeckými, u Březhradu, Bohdanče a j.!

42. Řád. Plantagineae Juss. Jitrocelovitě.

587. *Plantago lanceolata* L. Jitrocel kopinatý. Na polích, lukách, mezích, u cest i na trávnících, obecný. — ž. db-zář.
588. *Plantago media* L. J. prostřední. Jako předešlý a stejně obecný. — ž. kv-zář.

589. *Plantago major* L. J. větší. Na podobných místech jako předešlé a rovněž obecný. — 4. čn-zár.

43. Řád. **Lentibulariaceae** Rich. Bublinatkovité.

590. *Utricularia vulgaris* L. Bublinatka obecná. V příkopech a strouhách na lukách rašelinných i v nehlubokých tůních. nepříliš hojná. — 4. čn-srp. — V příkopech podél dráhy u šlezského předměstí, u Libišan, Stéblové! u Týniště (Č.).
591. **Utricularia minor* L. B. menší. Na podobných místech co předešlá, řidčeji. — 4. čn-srp. — Na rašelinných lukách u Libišan!

44. Řád. **Primulaceae** Vent. Prvosenkovitě.

592. **Centunculus minimus* L. Drobyšek nejmenší. Na březích rybníku i na vlhkých pastvinách, velmi spíše. — ☉ čn-srp. — Na pudě býv. rybníku Vel. Čeperka blíže Stéblové!
593. *Anagallis arvensis* L. Drechnička rolní. Na polích, u cest, mezi a plotu dosti rozšířená, ač ne příliš hojně. — ☉ čn-zár. — Na př. na polích kolem N. Hradce, Svinar, Slatiny a j.!
594. **Trientalis europaea* L. Sedmikvitek obecný. Ve vlhkých lesích, na rašelinné a mechovité pudě, pořádku roztroušen. — 4. kv-čn. — V lesích Hradeckých blíž dvou šraňků a dále ku Černé stráni.!
595. *Lysimachia nummularia* L. Vrbina penízková. Na pokrajích lesu, u vlhkých příkopu a mezi dosti obecný. — 4. čn-srp.
596. *Lysimachia vulgaris* L. V. obecná. U rybníku, tůní, potoku, na potočích nejvíce mezi vrbovím dosti hojně rozšířena. — 4. čn-srp. — Na př. na březích Otlice, u jezírka v lese blíž Slatiny a j.!

Cyclamen europaeum L. Brambořík obecný. V lese Královéhradeckém dle staršího, nezaručeného udání.

597. *Primula officinalis* Scop. Prvosenka obecná, potrklič. Na suchších lukách, v lesích a hájích, zvláště na pánovicích, v křovinách, na travnatých stráních hojně rozšířena. — 4. dub-kv. — Kolem Hradce Kr. zhusta.
598. *Primula elatior* Jacq. P. bleďožlutá. Jako předešlá, ale na vlhkých místech a celkem méně hojná. — 4. db-kv. — Na př. ve vlhkých lesích Hradeckých, Novohradeckých a j.!
599. *Hottonia palustris* L. Rebratka vodní. V tůních, vodních příkopech, strouhách na lukách i v lesích místy velmi hojná. — 4. kv-zár. — Kolem Hradce Kr., Týniště, Boro-
hrádku a j.!

45. Řád. **Plumbagineae** Vent. Trávnícovité.

600. *Armeria vulgaris* Willd. Trávníčka obecná. Na suchých lukách, mezích, pastvinách, travnatých návrších roz-

troušená, místy ale hojná. — 2. kv-zář. — Na př. na lukách kolem Střebse a j.!

46. Řád. **Ericaceae** Endl. Vřesovitě.

601. **Calluna vulgaris** Salisb. Vřes obecný. V lesích, zvláště na suchých vřesovištích, též na rašelinách zhusta. — 2. čenec-rj. — Na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j.!
602. **Vaccinium myrtillus** L. Borůvka. V lesích a hájích, zvláště ve vřesovinné a rašelinné půdě, dosti obecná. — 8 kv. — Na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j.!
603. **Vaccinium vitis idaea** L. Brusnice obecná. Na podobných místech co předešlá, místy však méně hojná. — 8 kv-čec. — Lesy Hradecké, u Slatiny a j.!

47. Řád. **Hypopityaceae** Klot. Hruštičkovité.

604. **Monotropa hypopitys** L. Hnilák žlutavý. V stinných lesích, v trouchu lesním i v kypré humosní půdě řídceji. — 2. čenec-srp. — V lesích Hradeckých, na př. pod „Černou strání“, za Malšovicemi, u Borohrádku.!
605. **Ramischia secundiflora** Op. Hruštička jednostranná. V stinných lesích a hájích, ve vřesovinné půdě, hojně rozšířená. — 2. čen-čec. — Na př. v lesích Hradeckých a Novohradeckých.!
606. **Pirola minor** L. H. menší. Na podobných místech co předešlá, místy u velikém množství. — 2. čen-čec. — V lesích Hradeckých na sv. Jánském kopci a j.!
607. **Pirola rotundifolia** L. H. okrouhlolistá. Jako předešlá, a stejně hojná. — 2. čen-čec. — Na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých, Přímských a j.!
608. * **Monesis grandiflora** Salisb. Jednokvítek velekvětý. V stinných a vlhkých lesích v mechovitě i humosní půdě jednotlivě roztroušen. — 2. čen-čec. — V lesích Hradeckých dosud jen pod Černou strání u větším množství.!
609. * **Chimophila umbellata** Nutt. Zimozelen okoličnatý. V suchších lesích, nejvíce ve vřesovinné půdě, velmi spurný. — 2. čenec-srp. — V lese Novohradeckém (Čen.).

C. *Protoplatécné*. Eleutheropetalae.

48. Řád. **Ranunculaceae** Juss. Pryskyřníkovité.

610. * **Thalictrum aquilegiaefolium** L. Žluťucha orlíčkolistá. Na vlhkých lesních lukách, ve vlhkém lesním kroví porůznu. — 2. čen-čec. — Dosud jen ve vlhké olšině v lese za Novým Hradcem.!
611. * **Thalictrum minus** L. Ž. menší. Na lukách, mezích, keřnatých stráních jak se zdá velmi porůznu. — 2. čen-čec. — Na lukách kolem Hradce Kr. spore a bez květu.!

612. *Thalictrum angustifolium* Wimm. et Grab. Ž. úzkolistá. Na lukách, sem tam též u potoku a řek, hojně rozšířená. — 4. čn-čnec. — Na př. na lukách kolem Malšovic, Střebše, Roudničky, Týniště a j.!
613. *Anemone nemorosa* L. Sasanka hajní. V světlých lesích a hájích, nejvíce v houštinách na pasekách, i na lukách hojně rozšířená. — 4. db-kv. — V lese Hradeckém, Novohradeckém, na louce před Střebší, za Zámečkem, u Správců a j.!
614. *Anemone ranunculoides* L. S. pryskyřníkovitá. Jako předešlá, ale řídkěji. — 4. db-kv. — Na louce před Střebší, za Zámečkem, u Věkové, Správců, v lese Novohradeckém a j.!
615. *Hepatica triloba* Gil. Jaterník trojlaločný. V lesích a hájích v kypré půdě humosní, obecná. — 4. bí-dub. — Na př. v lesích Hradeckých, na sv. Jánském kopečku a j.!
616. *Adonis aestivalis* L. Hlaváček letní. Na polích mezi obilím porůznu. — ☉ kv-čnec. — Na polích kolem Hradce Králové.!
617. **Myosurus minimus* L. Myší ocásek nejmenší. Na polích, mezích, na pokraji lesů, u cest roztroušen, místy ale dosti hojný. — ☉ db-čn. — Na hradbách Hradeckých, na polích u Farářství, Svinar, Stěžer a j.!
618. *Ranunculus aquatilis* L. Pryskýřník vodní. Ve vodních příkopech, náhonech i jinde v stojatých a zvolna tekoucích vodách, hojně rozšířený. — 4. kv-srp. — Velmi hojný na př. u Náhonu, Střebše, Malšové Lhoty a j.!
619. *Ranunculus fluitans* Lam. P. říční. V řekách, potocích, náhonech, dosti zhruba se vyskytující. — 4. čn-srp. — V Orlici, v náhonu Opatovickém a j.!
620. *Ranunculus sceleratus* L. P. lítý. V mokřích příkopech i ve vodních strouhách, na bahnitých březích močálů nezfídka. — ☉ i ☉ čn-zář. — Na př. u Plácek, Malšovic, Slatiny a j.!
621. *Ranunculus ficaria* L. Orsej. Na vlhkých trávnících, v lesích, zvláště u potoku v kypré půdě obecný. — 4. db-kv.
622. **Ranunculus lingua* L. Pryskýřník veliký. Na pokraji tůní a rybníků, u příkopů vodních, nepříliš hojný. — 4. čn-srp. — Na rašelinných lukách před i za Březhradem! u Holic (Čen), u býv. rybníku Rozkoše (O.).
623. *Ranunculus flammula* L. Plamínek. Na bažinných a rašelinných místech, na pokraji rybníků, v příkopech vlhkých, dosti obecný. — 4. čn-zář. — Na př. na lukách kolem Roudničky a j.!
624. *Ranunculus auricomus* L. Pryskýřník zlatožlutý. a) genuinus, pravý. Na vlhkých lukách, i na puloucích lesních, hojně rozšířený. — 4. dub-kv. — Obecný na lukách kolem Hradce Kr. a j.!

625. *Ranunculus acris* L. P. prudký. Na lukách, v lesích a hájích, u příkopů obecný. — 4. kv-srp.
626. **Ranunculus lanuginosus* L. P. kosmatý. Ve vlhkých lesích a hájích, na lukách a u potoků lesních dosti hojně rozšířený. — 4. kv-čn. — Na př. v lesích Hradeckých a j.!
627. **Ranunculus polyanthemus* L. P. mnoho květý. Na lukách, v světlých hájích i na keřnatých kopečích, místy hojný. — 4. kv-čnec. — Na lukách kolem Střebše a Malšovic, v lese mezi Račicemi a Habřinou.!
628. *Ranunculus repens* L. P. plazivý. Na vlhkých lukách, mezích, v příkopech, u cest obecný. — 4. kv-čnec.
629. *Ranunculus bulbosus* L. P. bambulinatý. Na podobných místech co předešlý, dosti obecný. — 4. kv-čnec. — Na př. na lukách a mezích kolem Hradce Kr. a j.!
630. **Ranunculus sardous* Crantz. P. srstnatý. U cest, příkopů, na mezích i u bařin, spíše rozšířen. — ☹ i 4. kv-zár. — Na př. u silnice k N. Hradci, blíž Piletic r. 1880 a j.!
631. *Ranunculus arvensis* L. P. rolní. Na polích mezi obilím dosti porůznu. — ☹ kv-čnec. — Na př. na polích před a za Zámečkem i jinde kolem Hradce Kr.!
632. *Caltha palustris* L. Blatouch. Na mokřích lukách, v lesích a potoku, bařin obecný. — 4. dub-čnec.
633. **Trollius europaeus* L. Úpolín západní. Na vlhkých a bařinných lukách, lesních paloučích dosti zhusta. — 4. kv-zár. — Na lukách za N. Hradcem, u Roudničky, Březhradu, Divce, Prohluzi a j.!
634. †*Helleborus viridis* L. Čemeřice zelená. Chová se častěji v zahradách selkkých a zdivočuje z nich též někdy, na př. u Týniště! — 4. bř-dub.
635. **Nigella arvensis* L. Černucha rolní. Na polích, zvláště po žních na strništích, porůznu. — ☹ čnec-zár. — U Brožan (O.).
636. **Aquilegia vulgaris* L. Orlíček obecný. V stinných lesích, na keřnatých stráních lesních ne příliš hojný. — 4. kv-čn. — V lesích Hradeckých zvláště na „Černé stráni“, v lesích Novohradeckých a j.!
637. *Delphinium consolida* L. Stračka polní. Na polích, úhorech i na mezích polních, dosti obecný. — ☹ čn-srp. — Na př. na polích kolem Hradce Kr.!
638. **Aconitum variegatum* L. Oměj modrý. Ve vlhkých lesích a potoků i na keřnatých stráních porůznu, místy však dosti hojný. — 4. čnec-srp. — V lesích Hradeckých a Novohradeckých.!

49. Řád. *Berberideae* Vent. Dřišťálovité.

639. †*Berberis vulgaris* L. Dřišťál obecný. Sází se dosti hojně v zahradách a plotech a někdy též zpola zdivočuje. — 4. kv.

50. Řád. **Nymphaeaceae** Salisb. Leknínovitě.

640. ***Nymphaea candida** J. Sv. Presl. Leknín bělostný. V rybnících, tůních, kalužích i jinde v stojatých vodách pořídku. — ☿ čn-srp — V rybníce Diveckém! u Smiřic (P.).
641. **Nuphar luteum** Smith. Stulík žlutý. V tůních a zátokách Orlických i Labských hojně rozšířený i jinde ve vodách, nikde však spolu s předešlým. — ☿ čn-srp. — Na př. v tůních kolem Hradce Kr. a j.!

51. Řád. **Papaveraceae** DC. Mákovitě.

642. **Papaver rhoeas** L. Pleskanec. Na polích, mezích, hrázích, u cest dosti obecný. — ☉ kv-zár. — Na př. na cestě ke Chlumu a j.!
643. ***Papaver dubium** L. Mák pochybný. Jako předešlý, ale řídkěji. — ☉ čn-zár. — Na polích kolem Hradce Kr.!
644. **Papaver argemone** L. M. rolní. Na polích mezi obilím, na hrázích podél dráhy a podobných místech, hojný. — ☉ kv-čnec. — Na př. na úhorech a polích u N. Hradce a j.!
645. †**Papaver somniferum** L. M. zahradní. Pěstuje se v zahradách, někdy i na polích, a sem tam též zdivočuje. — ☉ čn-srp.
646. **Chelidonium majus** L. Lašovičnick větš. Na rumištích, zdech, v houštinách lesních i jinde na pustých místech obecný. — ☿ kv-říj. — Na př. na hradbách Hradeckých a j.!

52. Řád. **Fumariaceae** DC. Dymnivkovitě.

647. ***Corydalis cava** Schw. et Kör. Dymnivka dutá. V světlých lesích a hájích, zřídka, místy ale hojná. — ☿ dub. — V divokém sadě u Správců u velikém množství!
648. **Corydalis digitata** Pers. D. prstnatá. Na podobných místech jako předešlá, i na lesních lukách hojněji rozšířená. — ☿ dub. — Na př. v lesíku pod Zámečkem, v dubině u Březhradu a j.!
649. **Fumaria officinalis** L. Zemědým lékařský. Na polích, úhorech, mezích, též u příkopu, na rumištích a v zahradách dosti obecný. — ☉ kv-říj. — Na př. na rumištích kolem Hradce Kr. a j.!

53. Řád. **Cruciferae** Juss. Křížatě.

650. ***Teesdalia nudicaulis** R. Br. Nahál písečný. Na písčitých polích, mezích, úhorech, suchých kopcích spíše rozšířen. — ☉ db-zár. — Na polích a mezích kolem Bělé hojný; u silnice v lese Hradeckém blíže dvou žrnůků r. 1880 u větším množství! u Brožan (O.), Bohdanče (Č.).
651. **Thlaspi arvense** L. Penízek rolní. Na polích, úhorech, mezích, u plotů i na rumištích obecný. — ☉ db-říj.

652. *Thlaspi perfoliatum* L. P. prorostlý. Na suchých, travnatých kopečích, mezích i na polích a u cest místy hojný. — ☉ db-kv. — Na př. na hradbách i jinde kolem Hradce Kr.!
653. * *Coronopus Ruellii* All. Vraní nožka obecná. Na pastvinách, mezích, v příkopech, u cest porůznu. — ☉ čn-srp. — U býv. rybníku Veliká Čeperka (Č.).
654. *Lepidium campestre* R. Br. Vesnovka ladní. Na polích, mezích, u cest i na rumištích, místy obecný. — ☉ čn-zář. — Na př. velmi hojný u cest před Pražskou branou i jinde kolem Hradce Kr., Smiřic atd.!
655. *Lepidium ruderales* L. V. rumní. Podél cest, silnic, na mezích, rumištích, u zdi zhusta. — ☉ čn-zář. — Na př. u cest kolem Hradce Kr., Trotiny a jinde obecný.!
656. *Cardaria draba* Desv. V. objímavá. Na podobných místech jako předešlá, i na polích, místy velmi hojná. — 4 kv-čn. — Na př. velmi hojná u samého Hradce Kr. na mezích před Pražskou branou a j.!
657. *Capsella bursa pastoris* Mönch. Kokoška, pastuší tobolek. Jako předešlá všude obecná. — 4 ún-listp.
658. *Stenophragma thalianum* Čelak. Chudobinka obecná. Na polích, zvláště na písčitých úhorech, mezích, porůznu obecná. — ☉ db-říj.
659. *Draba verna* L. Chudina, nouze. Na polích, suchých trávnících, mezích i u cest, místy velmi hojná. — 4 bř-kv. — Na př. na polích kolem Malšovic, Střebše, Roudničky a j.!
660. *Alyssum calycinum* L. Tařice bledá. Na podobných místech co předešlá i na zdech, dosti hojně rozšířená. — ☉ db-zář. — Na př. hojněji na hradbách Hradeckých, na mezích podél dráhy sev.-západní, u Roudničky, na Kunětické Hoře a j.!
661. *Alyssum incanum* L. T. šedivá. U cest, na mezích, písčitých kopečích, rumištích obecný. — ☉ čn-říj. — Na př. hojná u silnic kolem Hradce Kr. a j.!
662. * *Cardamine bulbifera* R. Br. Kyčelnice cibulkonosná. Ve vlhkých lesích v kypré půdě humosní spore. — 4 dub-kv. — V lesích Hradeckých zvláště v Sytovce a na Černé stráni.!
663. * *Cardamine enneaphylla* R. Br. K. devítilistá. Na podobných místech s předešlou pospolu. — 4 dub-kv. — Na Černé stráni.!
664. *Cardamine amara* L. Řeřicha hořká. Ve vlhkých lesích u potoků i na bažinných lukách v příkopech vodních, ne příliš hojná. — 4 kv-čn. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých a j.!
665. *Cardamine pratensis* L. Ř. luční. Na vlhkých lukách, v příkopech vlhkých i u močálů velmi hojně rozšířená; β) grandiflora, velkokvětá. porůznu, na př. u močálu blize Fa-

- rářství; b) *dentata, zubatá, sporá. U Hradce Kr. (R.). — \mathfrak{A} db-čn.
666. **Cardamine hirsuta* L. R. srstnatá. b) *silvatica*, lesní. V lesích vlhkých i na lesnatých stránkách nehojná. — \odot i $\odot\odot$ db-kv. — U Chvojna (O.).
667. **Cardamine impatiens* L. Ř. nedůtklivá. V stinných lesích a hájích i u potoků v kypré půdě roztroušená. — \odot i $\odot\odot$ kv-čn. — V lese Novohradeckém a j.!
668. **Turritis glabra* L. Strmobyíl lysý. Na pokraji lesů v křoví, nejvíce na písčinách, porůznu. — $\odot\odot$ čn-čnec. — V lese Hradeckém u náhonu, blíže Bělče, u Vysoké.!
669. **Arabis contracta* Spen. Písečník stažený. Na kamenných kopcích, mezích, v lesních mýtinách pořádku roztroušen. — \mathfrak{A} i $\odot\odot$ kv-čnec. b) *angustata*, štřelovitý; v lesích Novohradeckých spoře. c) *Gerardi*, *Gerardův*; na Hoře Kunětické.!
670. *Barbarea vulgaris* R. Br. Barborka obecná. a) *pachycarpa*, tlustoplodá. Na lukách, vlhkých mezích, úhorech, u příkopů, na porůží hojná. — \odot i \mathfrak{A} kv-čnec. — Na př. na lukách a mezích kolem Střebše, Věkoše, Hradce Kr. a j.!
671. **Barbarea stricta* Andr. B. tuhá. Na podobných místech co předešlá, leč mnohem spořeji. — $\odot\odot$ kv-čn. — Na porůží Orlice u Slezského předměstí i za Malšovicemi, na luční mezi u Střebše (spoře) a j.!
672. *Roripa palustris* Bess. Rukev bahenní. Ve vlhkých příkopech, na mokřích mezích, porůžích, u močálů zhusta. — \odot i \mathfrak{A} čn-zár. — Na př. u Plácek, Střebše a j.!
673. *Roripa silvestris* Bess. R. lesní. Na podobných místech jako předešlá i na mokřích lukách, hojnější než předešlá rozšířená. — \mathfrak{A} čn-srp. — Na př. na porůží Labe, u Střebše a j.!
674. *Roripa amphibia* Bess. R. obojživelná. Jako předešlá, též v močálech i na pokraji tůní, i v lesích porůznu. — \mathfrak{A} kv-čnec. — V močálech u Malšovic, Farářství, Roudničky, Správnice, Předměřic, Plotiště, Lochenic, Smiřic a j.!
675. **Roripa terrestris* Cel. R. zemní. a) *pinnatifolia*, peřenolistá. Na podobných místech jako předešlá, často s ní též pospolu, ale této méně hojná. — \mathfrak{A} kv-čnec. — U příkopů vodních na lukách kolem Malšovic, Farářství a j.!
676. **Roripa austriaca* Bess. R. rakouská. Jako předešlá, sporá. — \mathfrak{A} čn-čnec. — U rybníku Veliká Čeperka (O.).
677. †*Armoracia rusticana* Fl. Wett. Křen obecný. Sází se místy hojně na polích a často zdivočuje, tak zvláště u potoků, náhonů a močálů kolem Hradce Kr., dosti zhusta. — \mathfrak{A} kv-čnec. — Na př. ve Svobodných Dvorech a j.!
678. *Neslia paniculata* Desv. Řepinka latnatá. Na polích, úhorech, mezích, u cest, hojně rozšířená. — \odot kv-čnec. — Na př. hojně na polích u Střebše, N. Hradce, Stéžer a j.!

679. *Camelina microcarpa* Andr. Lnice maloplodá. Na podobných místech co předešlá a stejně hojná. — ☉ kv-čnec. — Obecná plevel na polích kolem Hradce Kr. a j.!
680. *Camelina foetida* Fries. L. smrdutá. β) *dentata*, zubatá. Na polích ve lnu, sem tam i na mezích, u cest, ne příliš zhusta. — ☉ čn-čneo. — Na př. na lněných polích za Náhonem u Stěžer a j. ! *α) *integerrima*, celokrajná. Jako předeházející, však jak se zdá méně hojná. Na př. na polích lněných u Malšové Lhoty. !
681. † *Hesperis matronalis* L. *ampl.* Materna změnná. Pěstuje se často v zahradách a zdivočuje též někdy. — ☉ i ☿ kv-čnec.
682. *Sisymbrium sophia* L. Hulevník mnohohlý. U cest, na mezích, rumišťech, na zdech i v plotech místy hojný. — ☉ kv-srp. — Na př. u cest kolem Hradce Kr., Smiřic a j. !
683. *Chamaepilium officinale* Wallr. H. lékařský. Jako předešlý, však hojněji nežli tento rozšířen. — ☉ kv-zář. — Na př. u cest v Pláckách a jinde kolem Hradce Kr., Smiřic atd. !
684. *Alliaria officinalis* Andr. Česnáček obecný. V hájích, stinných houštinách, u plotů a cest ve vesnicích, obecný. — ☉ kv-čn. — Na př. též na Kozince a j. dosti hojný. !
685. *Erysimum cheiranthoides* L. Trýzel malokvětý. Na polích, úhorech, mezích, u cest, na porůvích v křovištích, obecný. — ☉ čn-zář. — Na př. hojný na polích u Malšovic, Plácek, Střebše a j. !
686. * *Diplotaxis muralis* DC. Křez zední. Na polích, u cest porůdku; dosud jen na porůvích Labe u Hradce Králové ! snad jen splavená. — ☉ i ☉ čn-zář.
687. † *Brassica oleracea* L. Brukev obecná. Pěstuje se v četných odrůdách na polích i v zahradách zelných, zvláště α) *acephala*, jarmuz, kadeřávek; β) *sabauda*, kapusta; γ) *capitata*, zelí hlavaté; δ) *gongylodes*, brukev; ε) *botrytis*, karfiol. — ☉ čnec-zář., ☉ kv-čn.
688. † *Brassica napus* L. Řepka. Pěstuje se hojně na polích a často též zdivočuje, zvláště co α) *oleifera*, olejka a β) *napobrassica*, tuřín. — ☉ db-kv., ☉ čnec-srp.
689. † *Brassica campestris* L. *ampl.* Brukev polní. Sází se v zahradách i na polích, nejhojněji v odrůdě γ) *rapa*, řepa, vodnice. — ☉ db-kv., ☉ čnec-srp.
690. *Sinapis arvensis* L. Hořčice polní. Na polích, úhorech, mezích polních i na pustých místech dosti obecná. — ☉ čn-srp. — Na př. hojně na polích kolem Střebše, N. Hradce a j. !
691. *Raphanus raphanistrum* L. Ohnice rolní. Jako předešlá, obecně rozšířena. — ☉ čn-srp.
692. † *Raphanus sativus* L. Řetkev. Sází se hojně v zahradách, zvláště co β) *niger*, černá a γ) *radicula*, řetkvička. — ☉ i ☉ čn-srp.

54. Řád. **Resedaceae** DC. Resedovité.

693. **Reseda lutea** L. Reseda žlutá. Na suchých travnatých stráních, u cest, na mezích, rumišťích dosti hojně rozšířená. — ☉ i 4. čn-zář. — Na př. na hradbách Hradeckých a j. !
 † **Reseda odorata** L. R. vonná. Známa rostlina zahradní, jež někdy též u plotů zahradních zdivotile roste.

55. Řád. **Droseraceae** DC. Rosnatkovité.

694. * **Drosera rotundifolia** L. Rosnatka okrouhlolistá. V lesích na rašelinistích a bařinách porostlých rašelinníkem porůdku. — 4. čn-srp. — Na rašeliniskách v bařinné olšině za N. Hradcem (spoře), hojněji na rašeliniskách na bařinné louce mezi N. Hradcem a Klukem, též na rašeliniskách u Borohrádku. !

56. Řád. **Parnassieae** E. Meyer. Tolijovité.

695. **Parnassia palustris** L. Tolije bahní. Na bažinných lukách, dosti hojně rozšířená. — 4. srp-zář. — Na př. na lukách za N. Hradcem, u Roudničky, Dívce, Březhradu a j. !

57. Řád. **Violaceae** DC. Violkovité.

696. * **Viola palustris** L. Violka bařinná. Na rašelinných a bařinných lukách v lesích i na pokraji rybníků roztroušená. — 4. kv-čn. — V lese u Borohrádku, u rybníka Žďárského blíže Týniště. !
 697. **Viola odorata** L. V. vonná. Na mezích, na pokraji potůčků, lesu, na trávnících u plotů a zdí, místy obecná. — 4. bí-dub. — Na př. velmi hojná pod hradbami Hradeckými, v travnatém houští podél Labe u Správců a j. !
 698. **Viola hirta** L. V. srstnatá. V suchších lesích a hájích, v křovinách, na lukách i v plotech, hojně rozšířená. — 4. db-kv. — Na př. v lesích Hradeckých, u Slatiny a j. !
 699. **Viola silvestris** Kit. V. lesní. Na podobných místech jako předešlá a stejně hojná. — 4. db-kv. — Na př. v lesích Hradeckých, u Slatiny, na lukách před Střebřem a j. !
 700. **Viola Riviniana** Rehb. V. Rivinova. Jako předešlá, však méně hojná. — 4. db-kv. — Na př. v lesích Hradeckých a Novohradeckých. !
 701. **Viola canina** L. V. psí. Na suchých lukách, lesních parcích, travnatých mezích, hojně rozšířená. — 4. kv-čn. — Na př. na lukách kolem Hradce Kr., v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j. !
 702. * **Viola stagnina** Kit. V. slatinná. Na slatinných a bařinných lukách, na pokraji rybníků a lesů vlhkých, velmi porůznu. — 4. kv-čn. — Na lukách mezi Týništěm a Borohrádkem, u Semtinského rybníka u Bohdanče (Č.).

703. *Viola tricolor* L. Maceška. a) montana, chlumní. Na travnatých návrších i na lesnatých stráních roztroušená; b) arvensis, rolní. Na polích, úhorech, u cest, na rumištích obecná. — ☉ až 4. db-zář.

58. Řád. *Cistineae* DC. Cistovitě.

704. **Helianthemum chamaecistus* Mill. Devaterník obecný. Na suchých travnatých stráních, mezích, na pokrajích lesů ne příliš hojně rozšířen. — 8 kv-zář. — Dosud jen u Račic, nad Nepasicemi a Blešnem.!

59. Řád. *Alsineae* DC. Ptačincovitě.

705. *Herniaria glabra* L. Průtržník lysý. Na polích, písčitých pastvinách, mezích, na poliích i jinde na pustých místech, obecný. — 4. čn-tříj. — Na př. na polích u Malšovic a j.!
706. *Spergularia rubra* Presl. Kuřinka červená. U cest, příkopů, na poliích, vlhkých písčinách roztroušená. — ☉ až 4. čn-zář. — U Hradce Kr.!
707. *Sperguia pentandra* L. Kolenec pětimužný. Na mezích, u cest, v mýtinách nejvíce v borových lesích, zde onde rozšířená. — ☉ db-kv.
708. *Sperguia arvensis* L. K. rolní. Na polích, úhorech, polních mezích, u cest obecný. — ☉ čn-zář.
709. **Sagina nodosa* Meyer. Úrazník uzlitý. Na pokrajích rybníků, příkopů i na lukách spoře. — 4. čnec-srp. — U Bohdanče (Č.).
710. *Sagina procumbens* L. Č. položený. Na vlhkých rolich, úhorech, poliích i příkopech dosti hojně rozšířený. — 4. kv-zář. — Na př. na poliích Labe u Hradce Kr., ve vlhkých lučních příkopech u Správnice a j.!
711. *Holosteum umbellatum* L. Plevel okoličnatý. Na suchých trávnících, mezích, polích obecný. — ☉ bí-kv. — Na př. na hradbách Hradeckých a j.!
712. *Moehringia trinervia* Clairv. Mateřka trojžebrá. V stinných lesích a hájích, zvláště na pasekách místy hojněji. — ☉ kv-čnec. — Na př. v lesích Hradeckých a j.!
713. *Arenaria serpyllifolia* L. Písečnice douškolistá. Na polích, úhorech, mezích, u cest i na pustých místech obecná. — ☉ kv-srp. — Na př. na polích u Malšovic a j.!
714. **Cerastium glomeratum* Thuill. Rožec klubkatý. V stinných lesích, na pasekách, u cest a příkopů lučních, velmi roztroušený. — ☉ kv-zář. — Na mezi dráhy severozápadní u Týniště.!
715. *Cerastium semidecandrum* L. R. pětimužný. Na suchých kopech, mezích, písčitých pastvinách, místy hojný. — ☉ db-kv. — Na př. na sv. Jánském kopci a j.!

716. *Cerastium triviale* Link. R. trsnatý. Na lukách, pastvinách, mezích, u cest obecně rozšířený. — 4 kv-zář. — Na př. na polích u Střebše a j. !
717. *Cerastium arvense* L. R. polní. Na podobných místech, co předešlý, rovněž obecný. — 4 kv-zář.
718. *Malachium aquaticum* Fries. Křehkýš vodní. Na vlhkých březích rek, potoků, mokřadů, i v mokřých příkopech dosti obecný. — 4 čn-zář. — Na př. na potočce Labe u Plácek a j. !
719. **Stellaria nemorum* L. Ptačinec hajní. Ve vlhkých lesích a hájích, zvláště u potůčků, pořádku. — 4 kv-čn. — V lesích Hradeckých, Borohrádeckých a j. !
720. *Stellaria media* Vill. P. obecný. Na polích, u cest, na pustých místech, v lesích i zabradách všude obecný. — ☉ i ☾ ún-pros.
721. *Stellaria holostea* L. P. velekvěť. V lesích a hájích, zvláště v křovinách, dosti zhusta. — 4 kv. — Na př. v lesích Hradeckých, u Slatiny, Bukoviny, Račic a j. !
722. *Stellaria uliginosa* Murr. P. bažinný. U potoků, močálů, na lukách i v lesích hojně rozšířen. — 4 kv-čnec. — Na př. v lesích Hradeckých a j. !
723. **Stellaria palustris* Ehr. P. sivý. Podél příkopů vodních na lukách, u rybníků, bařin roztroušený. — 4 čn-srp. — U tůní a příkopů vodních kolem Střebše, Roudničky, Plotiště a j., u příkopů nádražních blíže Slezského předměstí, Lochevic, na rašelinných lukách u Libisán ! u rybníka Rozkoše (O.).
724. *Stellaria graminea* L. P. trávolistý. Na travnatých mezích, vlhkých lukách, v houštinách lesních obecný. — 4 kv-srp. — Na př. na lukách kolem Střebše a j. !

60. Řád. *Sileneae* DC. Silénkovité.

725. *Gypsophila muralis* L. Šater polní. Na vlhkých polích, pastvinách, na pokraji rybníků dosti hojně rozšířený. — ☉ čnec-říj. — Na př. na polích u Farářství, Malšovic, Piletic, na březích Labe a j. !
726. *Saponaria officinalis* L. Mydlice lékařská. Na porůžkách, ve vlhkém křoví, na lukách i u potoků dosti rozšířený, ač zřídka v hojnosti. — 4 čnec-zář. — Na př. na lukách ku Střebši a j. !
727. **Kohlruschia prolifera* Kunth. Hvozdk prorostlý. Na suchých kopech, na hrázích, porůžkách i u cest porůznu. — ☉ čn-srp. — Na Kunětické Hoře. !
728. **Dianthus armeria* L. H. svazčitý. V lesích a hájích, na pasekách i na keřnatých stránkách dosti pořádku rozšířen. — ☾ čn-srp. — V lese nad Pileticemi, v lesích pod Kunětickou Horou. !
729. *Dianthus Carthusianorum* L. Kartouzek. Na travnatých mezích, suchých kopech dosti hojně rozšířený. — 4 čn-srp. — Na mezích u Malšové Lhoty, Rybářství, v lese za Roudničkou,

nad Blešnem, pod Kunětickou Horou i na ní samé, kolem Sendražic, Račic a j. !

730. *Dianthus deltoides* L. Hvozdík kropenatý. Na vlhkých lukách, mezích, na pokraji lesů i v lesním houští místy velmi hojný. — 4. čn-zář. — Na př. na vlhkých lukách kolem Malšovic, pod Klukem a j., v lese na sv. Jánském kopci, za Malšovickými, nad Libčany a j. !
731. **Dianthus superbus* L. H. pyšný. V světlých lesích a hájích, nejvíce na suchých lukách lesních roztroušený. — 4. čnec-zář. — U Hradce Kr. (Čen.).
732. **Cucubalus baccifer* L. Nadmutička obecná. Na porůvce ve vlhkém křoví, dosti pořádku. — 4. čnec-srp. — V hájích a v houštinách podél Labe, na př. v divokém houští před Střebšínem i jinde. !
733. *Viscaria vulgaris* Röhl. Smolníčka obecná. V suchých lesích, na výslunných lesních stráních i na lukách, místy hojná. — 4. kv-zář. — Na př. na sušších lukách Polabských, zvláště kolem Správcovic, na louce u Svinárek a j.; v lese u N. Hradce, za Slatinou, u Vysoké, Račic a j. !
734. **Silene gallica* L. *ampl.* Silenka francouzská. Na písčitých polích a pustých místech zřídka. — ☉ čnec-zář. — U Nové Vsi blízce Týniště (Č.).
735. *Silene nutans* L. S. níce. V suchých lesích a hájích, na písčitých kopcích hojně rozšířená. — 4. čn-čnec. — Na př. v lese na sv. Jánském kopci, v Boru, v lesích u N. Hradce, před Bělčím, u Vysoké, Račic a j. !
736. *Silene inflata* Smith. S. nadmutá. Na lukách, travnatých návrších, mezích, v lesích i na polích, obecná. — 4. čn-srp. — Na př. na lukách kolem Střebšína, na písčitých polích kolem Hradce Kr., Týniště a j. !
737. **Melandryum noctiflorum* Fries. Knotovka noční. Na polích, zvláště na písčitých půdách, porůznu. — ☉ čnec-zář. — U Holic (Č.).
738. **Melandryum silvestre* Röhl. K. lesní. Na vlhkých luzích i v lesích nepříliš hojná. — 4. kv-čnec. — Na lukách Polabských u Správcovic, na louce u Svinárek a jinde v nevelkém množství. !
739. *Melandryum pratense* Röhl. K. luční. Na lukách, mezích, polích, porůvce, zvláště v houštinách hojná a obecně rozšířená. — ☉ i 4. kv-zář. — Na př. na polích u Slezského předměstí a j. !
740. *Lychnis flos cuculi* L. Koboutek luční. Na lukách, ve vlhkém křoví, podél potoků, místy velmi hojný. — 4. kv-zář. — Na př. v hojnosti na lukách kolem Hradce Kr. a j. !
741. *Agrostemma githago* L. Koukol polní. Na polích, mezích i u cest obecný. — ☉ čn-čnec.

61. Řád. **Malvaceae** Juss. Slézovitě.

742. ***Malva pusilla** Smith. Sléz nizounký. Na mezích, u cest, zdí i ve vesnicích pořádku. — ☹ i ♀ čn-zář. — U bývalého rybníku Opatila (Č.).
743. **Malva rotundifolia** Huds. S. okrouhlolistý. Na podobných místech jako předešlý, obecně rozšířený. — ☹ i ♀ kv-zář.
744. **Malva silvestris** L. S. lesní. Na návších, u cest, plotů, zdí i jinde na pustých místech, dosti obecný. — ☹ i ♀ čnec-zář. — Na př. na mezích travnatých podél hradeb v parku Hradeckém a j.!
745. ***Malva alcea** L. S. velkokvětý. V světlých lesích, na suchých kopečích, mezích, u cest roztroušen. — ♀ čnec-zář. — Na sv. Jánském kopci, za Zámečkem, jednotlivě též na mezích u Správců a j.!

62. Řád. **Tiliaceae** Juss. Lípovitě.

746. **Tilia platyphylla** Scop. Lípa šírolistá. Ve světlých lesích porůznu rozšířená, v sadech a stromořadích zhusta sázená. — ♀ čn-čnec. — Na př. v lese Novohradeckém a j.!
747. **Tilia ulmifolia** Scop. L. jilmolistá. Jako předešlá, hojněji rozšířená. — ♀ čnec. — Na př. v lesích Hradeckých, na sv. Jánském kopci a j.!

63. Řád. **Hypericineae** DC. Třezalkovitě.

748. ***Hypericum humifusum** L. Třezalka rozprostřená. Na polích, úbořech a polních mezích porůznu, místy však hojná. — ☹ i ☹ čnec-srp. — Na polích mezi Slezským předměstím a Pileticemi, i nad Slatinou.!
749. **Hypericum perforatum** L. T. tečkovaná. Na sušších lukách lesních, na mezích, v pasekách, na kamenitých kopečích obecná. — ♀ čnec-zář. — Na př. na sv. Jánském kopci a j.!
750. **Hypericum tetrapterum** Fries. T. čtyřkřídla. Na mokřích lukách, podél potoků, příkopů vodních, náhonů i v lesích dosti hojně rozšířená. — ♀ čnec-srp. — Na lukách u Střebče a Roudničky, Slezského předměstí, u náhonu v Pláckách, u Březhradu, Libišan, v lesích Hradeckých Novohradeckých a j.!
751. ***Hypericum quadrangulum** L. T. čtyřhranná. V lesích, na vlhkých lukách lesních, pořádku. — ♀ čnec-srp. — V lesích Královéhradeckých (Č.).
752. ***Hypericum montanum** L. T. horní. V světlých lesích a hájích, na lesnatých stráních, nepřilíš hojná. — ♀ čn-srp. — V lesíku na sv. Jánském kopci, u Slatiny, pod „Černou strání“, nad Habřinou, u Dobřenic! u Borohrádku (Č.).
753. ***Hypericum hirsutum** L. T. srstnatá. Na podobných místech co předešlá, ale řídkěji. — ♀ čnec-srp. — V lesích Hradeckých, u Slatiny, v bažantnici u Dolního Přimu, v lesích u Račic a j.!

64. Řád. **Oxalideae** DC. Šfavelovitě.

754. **Oxalis acetosella** L. Šfavel kyselý. V stinných a vlhkých lesích a hájích v kypré půdě, zvláště u potoků, místy velmi hojný. — 4. db-kv. — Na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j.!

65. Řád. **Balsamineae** Rich. Balsaminovitě.

755. **Impatiens noli tangere** L. Netýkavka obecná. V stinném houští lesním, nejvíce u potoků i na porůžku, porůžnu. — 4. čn-srp. — Na př. v lesích Hradeckých, zvláště u Náhonu blíž Bělé u velikém množství.!

66. Řád. **Geraniaceae** DC. Kakostovitě.

756. **Erodium cicutarium** L'Hérit. Pumpava obecná. Na travnatých mezích, návrších, u cest, na rumišťích obecná. — ☉ i ☉ br-říj. — Na př. u Malšovic a j.!
757. **Geranium Robertianum** L. Kakost smrdutý. V stinných lesích a hájích ve vlhkém křoví, u zdí, plotů i jinde na pustých místech, dosti obecný. — ☉ i ☉ kv-říj. — Na př. na hradbách, v lesích Hradeckých a j.!
758. ***Geranium columbinum** L. K. holubičí. Na suchých keřnatých stráních, výslunných kopcích porůžku. — ☉ čnc-říj. — Dosud jen na Kunětické Hoře.!
759. **Geranium pusillum** L. K. nízký. Na úhorech, mezích, v plotech, u cest i na pustých místech obecný. — ☉ kv-zář.
760. ***Geranium sanguineum** L. K. krvavý. Na výslunných keřnatých stráních, světlých suchých lesích porůžnu. — 4. kv-srp. — Dosud jen v lesích u Sendražic a Račic.!
761. **Geranium pratense** L. K. luční. Na lukách, všude hojně rozšířený. — 4. čn-srp. — Na př. na lukách u Střebě a j.!
762. **Geranium palustre** L. K. bahenní. Na vlhkých lukách, v lesích nejvíce u potoků, vodních příkopů, v houštinách roztroušený. — 4. čn-srp. — Na př. u vodní strouhy na lukách za N. Hradcem, u bývalé bažantnice Hradecké, blíž Nepasic, Habřiny a j.!

67. Řád. **Lineae** DC. Lnovitě.

763. ***Radiola linoides** Gmel. Stozrník obecný. Na pokračí rybníků, u cest, na vlhkých písčinách, velmi sporný. — ☉ čnc-zář. — Na půdě bývalého rybníka Veliká Čeperka u Stéblové (blíže stanice železničné).!
764. **Linum catharticum** L. Len luční. Na vlhkých lukách, pastvinách, mezích i v lesích, velmi hojně rozšířený. — ☉ čn-srp. — Na př. na lukách u Střebě a j.!

765. † *Linum usitatissimum* L. L. polní. Pěstuje se místy na polích a častěji též zdivočuje; na př. hojněji jednou na mezích nad Libčany a j. — ☉ čn-srp.

68. Řád. **Polygaleae** Juss. Vítodovité.

766. *Polygala vulgaris* L. Vítod obecný. Na lukách, travnatých kopcích, mezech, i v lesích zhusta i dosti obecně rozšířený. — ♀ kv-zář. — Na př. na lukách kolem Hradce Kr. a j.!

69. Řád. **Terebinthaceae** DC. Škumpovité.

767. † *Rhus typhina* L. Škumpa ocetná. Sází se sem tam v parcích a zahradách. — ♀ čn-čnec.

Z řádu žlutodřevovitých (*Xanthoxyleae*) sázejí se někdy v parcích křídlatec trojlistý (*Ptelea trifoliata*) a pajasan žláznatý (*Ailanthus glandulosa*).

70. Řád. **Rutaceae** Juss. Routovité.

- † *Ruta graveolens* L. Rouda obecná. Pěstuje se tu a tam v zahradách. — ♀ čn-srp.

71. Řád. **Acerineae** DC. Javorovité.

768. *Acer campestre* L. Javor polní. Ve světlých lesích a hájích i jinde v houštinách hojně rozšířený, sází se též v plotech zhusta. — ♀ kv. — Na př. v lese na sv. Jánském kopci, u Slatiny, Březhradu, za N. Hradcem a j.!

769. *Acer platanoides* L. J. mléčný. Sází se častěji v sadech i v stromoradích. — ♀ db-kv. — U Hradce Kr.!

770. *Acer pseudoplatanus* L. Klen. Ve světlých lesích s jinými lupenatými stromy porůznu, hojněji v líbosadech sázený. — ♀ kv-čn. — Na př. v lesíku na sv. Jánském kopci, u Račic a j.!

† *Negundo fraxinifolium* Nutt. (*Acer negundo*), pájavec jasanolistý sází se sem tam v sadech a zahradách. — ♀ db.

72. Řád. **Hippocastaneae** DC. Jirovcovité.

771. *Aesculus hippocastanum* L. Kaštan koňský. Sází se hojně v stromoradích, zahradách a sadech. — ♀ kv-čn.

V sadech a zahradách chová se sem tam též pavie červená (*Pavia rubra*) a žlutavá (*P. flava*).

73. Řád. **Celastrineae** R. Br. Brslenovité.

772. *Evonymus vulgaris* Scop. Brslen obecný. V lesích a hájích, v houštinách podél potoků, řek hojně rozšířený. — ♀ kv-čn. — V houštích podél Labe, Orlice, v lesích Novohradeckých a j.!

74. Řád. **Ampelideae** Kunth. Révovité.

773. † *Vitis vinifera* L. Réva vinná. Chová se dosti hojně v zahradách i u domů. — ♀ čn.
 774. † *Ampelopsis hederacea* Mich. Loubinec břečťanový. Pokrývá zdi a loubí v zahradách i u domů. — ♀ čnec.

75. Řád. **Rhamneae** R. Br. Řešetlákovitě.

775. *Frangula alnus* Mill. Krušina olšovitá. Ve světlých lesích a hájích, v křoviskách u potoků, na porůčích zhusta. — ♀ kv-čn. — Na př. na lukách před Střebší, v lesích Hradeckých a j.!

76. Řád. **Lythraeae** Juss. Kyprejovité.

776. * *Peplis portula* L. Kuřinec kalužní. Na vlhkých březích rybníků, příkopů, u řek, kaluží, hojněji rozšířený. — ☉ čn-zář. — Na př. u příkopů vodních podél dráhy, u tůní Orlických a j.!
 777. * *Lythrum hyssopifolia* L. Kyprej isopolistý. Na vlhkých rolích, lukách, u příkopů, na pokraji rybníků porůznu. — ☉ čnec-zář. — U Slezského předměstí, Brna, Oujezda, Březhradu, Stěblové, Brozan, Němčic, Sendražic! u rybníka Rozkoše (Č.).
 778. *Lythrum salicaria* L. Vrbice. Na pokraji rybníků, řek, podél potoků a příkopů vodních i v lesích obecný. — ♀ čn-zář. — Na př. na lukách u Roudničky, v lesích Novohradeckých a j.!

77. Řád. **Oenotheraeae** Endl. Pupalkovitě.

779. * *Oenothera biennis* L. Pupalka obecná. Na porůčích, zvláště v řídkém vrbovém porůznu. U větším množství na porůčí Labe blíže Střebše! Několik exemplarů bylo nalezeno dle udání, mně sděleného, též u nádraží Královéhradeckého. — ☉ čn-zář.
 780. *Epilobium angustifolium* Jacq. Vrbka úzkolistá. V lesních pasekách na suchých vřesovištích, obecně rozšířená. — ♀ čnec-zář. — Na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j.!
 781. *Epilobium hirsutum* Jacq. V. chlupatá. Na pokraji potoků, rybníků, u příkopů vodních, nezřídka. — ♀ čn-zář. — V Bohdaneckých dvorech, u příkopů podél dráhy v Lochenicích, v lese Novohradeckém a j.!
 782. *Epilobium parviflorum* Schreb. V. malokvětá. Jako předešlá, však hojnější. — ♀ čn-zář. — V Pláckách, Svobodných dvorech, Plotištích, Předměstích, u Libčan, v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j.!

783. *Epilobium montanum* L. V. chlumní. a) genuinum, pravá. V sušších lesích a hájích na keřnatých kamenitých stráních, dosti hojná. — 4. čn-zár. — Na př. ve skulinách zedních hradeb Hradeckých, v dubinách Polabských, v lesích Hradeckých, Novohradeckých, u Dobřenic, Týniště a j. ! c) collinum, kopečnatá, řidčeji. Na př. na Kunětické Hoře. !
784. *Epilobium roseum* Schreb. V. růžová. U potoků, vodních příkopů, na porůčích, ve vlhkých lesích, dosti obecná. — 4. čnec-srp. — Na př. ve Svobodných Dvorech, v Pláckách, za N. Hradcem a j. !
785. **Epilobium tetragonum* L. V. čtyřhranná. Na mokřích lukách, u příkopů vodních, u rybníků spoře. — 4. čnec-srp. — Pod hradbami Hradeckými. !
786. **Epilobium virgatum* Fries. V. tmavozelená. U potoků, bažinných příkopů, i v lesích porůznu. — 4. čnec-srp. — U Malšovic, v lesích Hradeckých. !
787. *Epilobium palustre* L. V. bahenní. Na bažinných a rašelinných lukách, u příkopů vodních, hojněji rozšířen. — 4. čnec-srp. — Na lukách za N. Hradcem, Březhradem, podél příkopů nádražních u Týniště a j. !
788. **Epilobium Knafii* Čelak. (*E. parviflorum* × *roseum*). V. Knafova. Spolu s rodiči u Svobodných Dvorů v několika exemplarech. ! — 4. čnec-zár.
789. **Circaea lutetiana* L. Čarovník obecný. V stinných lesích a hájích, nejvíce v křoví vlhkém, porůdku. — 4. čn-srp. — V bývalé bažantnici Hradecké ! v lese Novohradeckém (Čen.).

78. Řád. **Halorrhagideae** R. Br. p. Zrnulovité.

790. **Myriophyllum spicatum* L. Stolístek klasnatý. V stojatých i tekoucích vodách, dosti hojně rozšířený. — 4. čn-srp. — V tůních Orlických i v Orlici samé ! u rybníka Rozkoše (Č.).
791. *Myriophyllum verticillatum* L. S. přeslenatý. Ve vodních příkopech, i jinde v stojatých nebo mírně tekoucích vodách, nepříliš rozšířený, místy však hojný. — 4. čnec-srp. — V strouhách vodních u Březhradu. !
792. **Hippuris vulgaris* L. Prustka obecná. V tůních, příkopech vodních i v potocích, zvolna tekoucích, porůdku rozšířená. — 4. čnec-srp. — U Holohlav blíže Smřic (Weitenweber), u Bohdanče (O.).

79. Řád. **Umbelliferae** Juss. Okoličnaté.

793. **Hydrocotyle vulgaris* L. Pupečník obecný. V stinných lesích, na bažinných lukách i na pokraji rybníků, místy velmi hojný. — 4. čnec-srp. — V lesích Hradeckých i Novohradeckých na několika místech velmi hojný (na př. hned za Malšovicemi, za Svinarv a j.) ! okolo Bohdanče (Č.), u rybníka Novoveského blíže Týniště. !

- Eryngium campestre** L. Máčka polní. Jediný exemplar, mně přinesený, byl prý nalezen na mezích u Malšovic, kdež jsem však tuto rostlinu sám dosud nalézt nemohl. — 4. čnec-srp.
794. ***Sanicula europaea** L. Žindava evropská. V stinných lesích a hájích, místy u větším množství rozšířená. — 4. kv-čn. — V dubině u Březhradu, v lesích Hradeckých, Novohradeckých, v bažantnici u Dolního Přímu, Sendražic! u rybníku Oplatila (Č.).
795. ***Astrantia major** L. Jarmanka větší. Ve vlhkých lesích, nejvíce mezi křovím, i na lesních lukách roztroušená. — 4. čnec-zář. — V lesích Hradeckých pod Černou stráň, v lesích Novohradeckých, u Račic a j.!
796. ***Cicuta virosa** L. Rozpuk jizlivý. V mokřích lesích, u příkopů vodních, na bařinách, u rybníků porůznu. — 4. čnec-srp. — V lesích Hradeckých na Škvárovce, v bařinách za rybníkem u mlýna nad Bělčem ležícího (hojný)! u Bohdanče (Č.).
797. ***Sium latifolium** L. Sevlák široolistý. V tůních, vodních příkopech, u rybníků, močálů hojně rozšířen. — 4. čnec-srp. — V tůních Orlických kolem Hradce Kr. i u Týniště.!
798. ***Berula angustifolia** Koch. Berla úzkolistá. V potocích, vodních příkopech místy hojná. — 4. čnec-srp. — U Hradce Kr.!
799. ***Falcaria Rivini** Host. Srpek polní. Na polích, mezích, u cest, roztroušená a jak se zdá jen podél Labe rozšířená. — ☹ i 4. čnec-srp. — Na př. na polích u Pláce, Svobodných Dvorů, kolem Chlumu, Sendražic, Smiřic a j.!
800. **Aegopodium podagraria** L. Kozí noha obecná. V světlých hájích ve vlhkém křoví, na lukách, u potoků, řek dosti obecný. — 4. kv-srp. — Na př. v lesíku na sv. Jánském kopci, v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j.!
801. **Carum carvi** L. Kmín luční. Na lukách, travnatých mezích obecný. — ☹ kv-čn. — Na př. na lukách kolem Hradce Kr. a j.!
802. **Pimpinella saxifraga** L. Bedrník obecný. Na suchých pastvinách, mezích, na pokraji lesů obecný. — 4. čnec-říj.
803. ***Pimpinella magna** L. B. veliký. Ve světlých hájích a lesích i na lukách hojně rozšířen. — 4. čn-zář. — V lesíku na sv. Jánském kopci, v lesích Hradeckých a j.!
804. †**Pimpinella anisum** L. Anýz. Seje se v zahradách kuchyňských. — ☹ čnec-srp.
805. †**Apium graveolens** L. Celer. Pěstuje se hojně v zahradách zelenářských. — ☹ čnec-srp.
806. †**Petroselinum sativum** Hoffm. Petržel kuchyňská. Jako předešlá. — ☹ čnec.
807. ***Bupleurum falcatum** L. Prorostlík srpovitý. Ve světlých hájích, na keřnatých kopech pořídka. — 4. čnec-zář. — V lupe-natém lese nad Pileticemi a u Račic, též na Podhůře (nad Svinárky).!

808. *Oenanthe phellandrium* Lamk. Kmín vodní. V tůních, rybnících, kalužích, vodních příkopech i v lesích hojně rozšířená. — ☿ čnec-srp. — Na př. v tůních Orlických, v lesích Hradeckých a j.!
809. **Seseli coloratum* Ehr. Sesel zbarvený. Na suchých kopech, travnatých návrších, v suchých lesích porůznu. V beru u Březhradu, na travnatém kopci nad Blešnem (dosti spíše), v háji nad Račicemi, u Stěblové! na Hoře Kunětické a u Bohdanče (Č.). — ☿ čnec-zář.
810. **Seseli libanotis* Koch. S. širokolistý. Na jílovitých lukách a pastvinách i na výelunných kopech, porůznu, místy však velmi hojný. — ☿ čnec-srp. — Na lukách před Střebší u Slezského předměstí, na Hoře Kunětické.!
811. *Aethusa cynapium* L. Kozí pysk. U cest, na úhorech, mezích, rumířkách i v zahradách dosti rozšířen. — ☉ čn-zář. — Na př. u silnice v Slezském předměstí, u N. Hradce a j.!
812. †*Foeniculum capillaceum* Gilib. Fenykl obecný. Pěstuje se v zahradách kuchyňských. — ☿ čnec-srp.
813. †*Anethum graveolens* L. Kopr zahradnický. Jako předešlý. — ☉ čnec-srp.
814. *Pastinaca sativa* L. Pastinák obecný. Na lukách, mezích, u cest obecný. — ☿ čnec-zář. — Na př. na lukách kolem Hradce Kr., Týniště a j.!
815. *Heracleum sphondylium* L. Bolševník obecný. Na lukách i v lesním houští obecný. — ☿ čn-zář. — Na př. na lukách kolem Hradce Kr.!
816. **Peucedanum cervaria* Cus. Smldník jelení. V suchých lesích a hájích, na keřnatých stráních lesních dosti pořádku. — ☿ čnec-srp. — Na kopci sv. Janském (nehojně), v lese nad Pileticemi a nad Slatinou, v hájích nad Račicemi a j.!
817. **Peucedanum oreoselinum* Mönch. S. olešníkovitý. Na podobných místech jako předešlý, též na lesních lukách a mezích. — ☿ čnec-srp. — V lesích Hradeckých a Novohradeckých, na Kunětické Hoře! okolo Bohdanče (Č.).
818. **Peucedanum palustre* Mönch. S. bahenní. V bažinných lesích, na bahnitých lukách, u rybníků a potoků, zhusta. — ☿ čnec-srp. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých, u Slatiny, Borohrádku! u Bohdanče (Č.).
- Tordylium maximum* L. Zápalíčka veliká. Dle staršího, jak se zdá mylného udání kdesi u Hradce Králové nalezena (R.).
819. *Selinum carvifolia* L. Olešník kmínolistý. V loukách a hájích, na lesních lukách, u potoků a příkopů nezdědká. — ☿ čnec-srp. — Na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých, u Borku, Dobřenic a j.!
820. *Angelica silvestris* L. Anjelika menší. Na vlhkých lukách, lesních paloučích dosti hojně rozšířená. — ☿ čnec-

- zář. — Na lukách u Roudničky, Slatiny, Týniště, u dvorů Bohdaneckých, v lesích Hradeckých, Novohradeckých, u Račic a j.!
821. † *Levisticum officinale* L. Libeček lékařský. Sází se sem tam v selských zahradách a zdívouje též snad někdy. — 4. čnc-srp. — Na př. jsem ho viděl v selské zahradce ve Lhotě Mašové.!
822. * *Laserpitium prutenicum* L. Hladýš pruský. V suších lesích a hájích i na lesních lukách nehojný. — 4. čnc-srp. — V lese u Slatiny, Dobřenic.!
823. *Daucus carota* L. Mrkev obecná. Na lukách, mezích obecná, i na polích sem tam pěstovaná. — ☉ i ☉ čn-zář.
824. *Torilis anthriscus* Gmel. Tořice třebulovitá. Na pokrajích lesů, v lesním houští i na návších, dosti obecná. — ☉ čn-srp. — Na př. na mezích v Plotištích, Předměřicích a j.; v lese u Slatiny, Březhradu a j.!
825. * *Scandix pecten Veneris* L. Venusin hřebec. Na polích mezi obilím velmi pořádku. — ☉ čn-zář. — U Opatovic.!
826. *Cerfolium silvestre* Bes. Kerblík lesní. Na lukách, v lesích i v plotech, na vlhkých místech obecný. — 4. kv-čn. — Na př. na lukách kolem Hradce Kr. a j.!
827. * *Cerfolium nitidum* Čelak. K. lesklý. Ve vlhkých a stinných lesích, zvláště u potůčků pořádku rozšířený, místy však hojný. — 4. čn. — V lesích Hradeckých od Mašovic až ku Bělci hojný.!
828. * *Chaerophyllum bulbosum* L. Krabilice hlíznatá. Na porůčí ve vlhkém křoví i v lesích roztroušená. — ☉ čn-srp. — Na porůčí Labe u Hradce Kr. jednotlivě.!
829. *Chaerophyllum temulum* L. K. mámivá. V lesních houštinách, v plotech, u zdí i na místech pustých, dosti obecná. — ☉ i ☉ kv-čnc. — Na př. na Kozince ve křovinách, na porůčí Labe a j.!
830. * *Chaerophyllum aromaticum* L. K. zapáchavá. U potoků, ve vlhkém křoví v lesích i na lukách velmi porůznu. — 4. čn-srp. — U Račic! u Hradce Kr. (R.).
831. * *Conium maculatum* L. Bolehlav blamatý. Ve vlhkém křoví, u plotů, na návších, rumišťích dosti rozšířený, ač ne hojně. — ☉ čn-srp. — V parku Hradeckém u Orlice, v příkopech pod hradbami Hradeckými dosti hojně, též v houštinách na porůčí Labe sem tam! v Račicích u Smřic (Halla), v Albrechticích u Týniště.!

80. Řád. *Araliaceae* Juss. Aralkovitě.

832. * *Hedera helix* L. Břečťan obecný. V lesích stinných i světlých spíše a z pravidla nekvětoucí. — 8. zář. — V lesích Hradeckých pod Černou stráň a na Sýtovce (hojný), v lese u N. Hradce (blíž myslivny), v lesích u Račic a Habřiny.!

81. Řád. **Corneae** DC. Dřínovité.

833. †*Cornus mas* L. Dřín. Sázi se porůznu v sadech a plotech. — p. bí-dub.
834. *Cornus sanguinea* L. Svída obecná. V lesích a hájích, v houštinách na porůčích, hojně rozšířená. — p. kv-čn. — Na př. v lesích Hradeckých a Novohradeckých a j.!

82. Řád. **Philadelphae** Don. Pustorylovité.

835. †*Philadelphus coronarius* L. Pustoryl. jasmín český. Sázi se hojně v zahradách a sadech. — p. kv-čn.

83. Řád. **Grossularieae** DC. Meruzalkovité.

836. *Ribes grossularia* L. em. Srstka. V lupenatých hájích porůdku, na př. v dubině u Březhradu, v háji Sendražickém a j. ! v plotech a zahradách hojně sázený a místy též zdivočelý. — p. db-kv.
837. †*Ribes rubrum* L. Meruzalka červená. Sázi se hojně v zahradách. *Ribes aureum*, M. zlatá opět zhusta v plotech a libosadech. — p. kv-čn.

84. Řád. **Saxifrageae** Vent. Lomikámenovité.

838. *Saxifraga granulata* L. Lomikámen zrnatý. Na sušších lukách, mezích, travnatých návrších, hojně rozšířená. — ž. kv-čn. — Na lukách kolem Hradce Kr. a j.!
839. **Saxifraga tridactylites* L. L. trojlaločný. Na výslunných kopcích porůdku. — ž. db-kv. — Na Hoře Kunětické (Ó.) kdež však, jak se zdá, již snad vymizel.
840. *Chrysosplenium alternifolium* L. Slezinník. Ve vlhkých, stinných lesích, nejvíce u potoků a vodních příkopů, hojný. — ž. bí-kv. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých, na Zámečku a j.!

85. Řád. **Crassulaceae** DC. Tučnicovité.

841. *Sedum telephium* L. Rozehodník veliký. V sušších lesích a hájích, na keřnatých stránkách, zdech, kopcích, sem tam i na polních mezích dosti rozšířený. — ž. srp-zář. — Na př. v sušších lesích kolem Hradce Kr., Smířic, Stěblové a j.!
842. *Sedum acre* L. em. R. ostrý. Na lukách, travnatých mezích a kopcích, u cest obecný. — ž. čn-čnec.
843. *Sedum boloniense* Lois. R. úzkolistý. Na př. na lukách u Plácek, na Kunětické Hoře a j.!

86. Řád. *Pomariae* Lind. Jabloňovité.

844. † *Mespilus germanica* L. Mišpule. Sází se sem tam v zahradách. — † kv.
845. *Mespilus oxyacantha* Crantz em. Hloh obecný. a) genuina, pravý. Ve světlých lesích, hájích, v houštinách dosti obecný, i v plotech hojně sázený. — † kv-čn. — Na př. v lese na sv. Jánském kopci, za N. Hradcem, v křovinách podél Orlice, u Březhradu a j.!
846. *Pirus communis* L. Hruška obecná. V lupenatých lesích pořádku divoce rostoucí, hojněji však sázená na mezích, u silnic a v zahradách. — † db-kv.
847. † *Pirus malus* L. Jabloň. Jako předešlá. — † kv. — Divoce na př. v Novohradeckém lese (Čen.).
848. *Pirus aucuparia* Gürtn. Jeřáb obecný. V lesích a hájích, na lesnatých stráních hojně rozšířený, i v stromoradiích a libosadech sázený. — † kv-čn. — Na př. v lesích Hradeckých a j.!

87. Řád. *Rosaceae* Juss. Růžovité.

849. * *Rosa gallica* L. Růže francouzská. V světlých lesích a hájích, na keřnatých stráních lesních místy dosti hojná. — † čn. — V lese u Svinar, Slatiny, Blešna, v lesích a na mezích u Sendražic, Račic a j.!
850. * *Rosa trachyphylla* Rau. R. dranolistá. Na keřnatých stráních, výslunných hájích pořádku. — † čnec. — Dosud jen v háji nad Račicemi.!
851. * *Rosa alpina* L. R. horní. V světlých lesích a hájích i na keřnatých stráních spíše rozšířená. — † čn-čnec. — Dosud jen v lese mezi Račicemi a Habřinou.!
852. *Rosa canina* L. Šípek. a) glabrescens, lysý. V suchších lesích, hájích, houštinách, na mezích, u cest a v plotech obecný. — † čn. — b) mollis, pýřitý méně hojný. Na př. na sv. Jánském kopci spolu s a), v křoví podél Orlice, u Slezského předměstí, u Bělče a j.!
853. * *Rosa rubiginosa* L. Růže vinná. Na suchých kopcích, na pokrajích lesů pořádku. — † čn. — V lesích u Sendražic a Račic, velmi hojná na Hoře Kunětické.!
854. *Rosa tomentosa* Smith. R. plisnatá. a) mollissima, měkká. V světlých lesích a hájích, hojněji než předešlá rozšířená. — † čn. — Na louce u Roudničky, v lesích Hradeckých u náhonu, v lesích Novohradeckých, u Malšové Lhoty, Bělče, Březhradu, Račic, Stěhlavé, Borohrádku a j.!
855. † *Rosa centifolia* L. R. stolistá. Sází se hojně v zahradách a zřídka kdy též zdivočuje. — † čn.
856. *Agrimonia eupatoria* L. Kopík lékařský. Na suchých lukách, travnatých mezích a návrších roztroušen. — † čn-zář. — Na př. na sv. Jánském kopci, u Střebše, Opatovic a j.!

857. *Poterium sanguisorba* L. Krvavec obecný. Na podobných místech co předešlý, dosti obecný. — 4. kv-zář. — Na př. na lukách kolem Hradce Kr. a j.!
858. *Sanguisorba officinalis* L. Toten lékařský. Na vlhkých lukách i v lesích zhusta. — 4. čn-zář. — Na př. na lukách kolem Hradce Kr. a j.!
859. *Alchemilla vulgaris* L. Kontryhel obecný. Na lukách, lesních mezích, i na návších u příkopů vlhkých, dosti obecný. — 4. kv-srp. — Na př. na lukách u Hradce Kr. a j.!
860. **Alchemilla arvensis* Scop. K. polní. Na písčitých polích a úbořech, pořídku. — (5) kv-srp. — Na písčitém úhoru mezi N. Hradcem a Zámečkem hojně, u Srchu blíže Stéblové, i na Podhůře u Hradce Kr. (Čen.).
861. *Geum urbanum* L. Kuklík obecný. Na mezích, u cest, příkopů, ve vlhkém houští v lesích a hájích obecný. — 4. čn-srp. — Na př. na Kozince v Hradci Kr. a j.!
862. **Geum rivale* L. K. potoční. Ve vlhkých lesích, nejvíce u potoků a příkopů vodních porůznu. — 4. kv-čnec. Ve vlhké olšině v lese za Novým Hradcem hojný.!
863. *Potentilla anserina* L. Mochna husí. Na mezích, u cest, příkopů, na návších, všude obecná. — 4. kv-čnec. — Na př. u Malšovic, Kuklen a j.!
864. *Potentilla reptans* L. M. plazivá. Na podobných místech jako předešlá, i na lukách a v lesích obecně rozšířená. Na př. u Malšovic, Střebže a j. — 4. čn-zůř.
865. **Potentilla procumbens* Sibth. M. rozprostřená. V stinných lesích, v pasekách, ve vřesovinné a rašelinné půdě pořídku. — 4. čn-srp. — V lese u N. Hradce! v lese Přikryl u Hradce Kr. (R.).
866. *Potentilla tormentilla* Schrank. Nátržník. Na lukách, mýtinách i jinde v suchých i vlhkých lesích obecně rozšířený. — 4. čn-zář. — Na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých (s předešlou pospolu), i j.!
867. *Potentilla opaca* L. Mochna tmavá. Ve světlých lesích a hájích, na travnatých, lesních mezích a kopečích porůznu. — 4. kv-čn. — Na př. na sv. Jánském kopci i pod ním, v lesích u Slatiny, Račic a j.!
868. *Potentilla verna* L. M. jarní. Na písčitých kopečích, mezích, u cest i v lesích, místy obecná. — 4. db-kv. — Na př. u N. Hradce, za Zámečkem, u Věkoše, Brezhradu, na Kunětické Hoře a j.!
869. **Potentilla alba* L. M. bílá. Na výslunných lesních stráních a lukách v suchých lupenatých hájích roztroušená. — 4. kv-čn. — Na pokraji lesa za Pileticemi, v háji nad Blešnem, v bažantnici u Dolního Přímu!
870. *Potentilla argentea* L. M. stříbrná. Na sušších lukách, mezích, travnatých návrších, u cest obecná. — 4. čn-zář. — Na př. na hradbách Hradeckých a j.!

- **Potentilla canescens* Ber. M. šedivá. Na suchých stráních, keřnatých úklonech pořádku. — 4. čn-čnec. — Na hradbách Josefova (K.) a nejspíš i jinde; (na hradbách Hradeckých jsem jí však dosud nespatriil).
871. **Potentilla norvegica* L. M. norvěžská. Na březích rybníků dosti zřídka. — ☉ i ☉ čn-srp. — Na pudě býv. rybníků kolem Stěblové, u rybníka Novoveského blíže Týniště! u Semtinského rybníka u Bohdanče (Č.).
872. **Potentilla supina* L. M. položená. Na březích rybníků, řek, u příkopů, mezí, na návších dosti rozšířená. — ☉ i ☉ čn-zář. — Pod hradbami Hradeckými, v Pláckách, Plotištích, Pohřebačce, Obédovicích, v Holohlavech u Smřic! u Bohdanče (Č.).
873. *Fragaria vesca* L. Jahodník obecný. V lesích a hájích, na keřnatých kopech, travnatých mezích obecný. — 4. kv-srp.
874. **Fragaria collina* Ehrh. Trávnice. Na suchých kopech, travnatých stráních méně hojná předešlá. — 4. kv-čn. — Na př. na sv. Jánském kopci a j.!
875. *Fragaria elatior* Ehrh. Truskavec. Nejčastěji s jahodníkem obecným pospolu, ale řídkěji než tento. — 4. kv-čn. — Na př. hojně v lesích Hradeckých, Novohradeckých a j.!
876. **Rubus saxatilis* L. Ostružinník skalní. V stinných lesích, nejvíce ve vlhkém houští sem tam roztroušen. — 4. kv-čn. — V lesích Hradeckých „u Jezírka na Sýtove“, v lesích za N. Hradcem podél vodní strouhy za olšinou, v lese nad Pileticemi hojný!
877. *Rubus idaeus* L. Malinník. V lesích a hájích, nejvíce v mytínách i na lesnatých stráních, dosti hojně rozšířený. — 4. kv-čnec. — Na př. v dubině u Březhradu a j.!
878. **Rubus suberectus* Ander. Ostružinník vzpřímený. V stinných lesích v křoví lesním zhusta. — 4. kv-čnec. — V lesích Hradeckých na př. pod „Černou strání“, v lesích Novohradeckých, u Slatiny, na Spáleném kopci a j.!
879. *Rubus plicatus* Weihe em. O. řasný. V lesích, zvláště v křovíštích na pokraji lesů, na polních mezích, sem tam i v plotech hojný. — 4. čn-čnec. — Na př. v lesích u N. Hradce a j.!
880. **Rubus thyrsoides* Wim. O. kytkovitý. Na výslunných lesních stráních, v pasekách dosti rozšířený. — 4. čn-čnec. — V lese Novohradeckém (Č.) a nejspíš i j.
881. **Rubus radula* Sendt. O. struhák. b) *viridis*, zelený. V lesích, v světlých pasekách, pořádku. — 4. čn-čnec. — V lese Novohradeckém (Č.).
882. *Rubus glandulosus* Bell. O. žláznatý. b) *Schleicheri*, Schleicherův. Na podobných místech jako předešlý, dosti hojný. — 4. čnec-srp. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých, u Boro-
hrádku.!
883. *Rubus caesius* L. O. polní. — V křovíštích, světlých lesích

a hájích, na mezích polních dosti obecný. — 2. čn-zář. — Na př. v lesích Hradeckých, na sv. Jánském kopci a j.!

884. *Rubus corylifolius* Smith. O. hajní. b) *dumetorum*, křovištní. Na pokraji lesů, v křovištích hojně rozšířený. — 2. čn-čnec. — Na př. v lesích Hradeckých, u Slatiny a j.!

885. *Spiraea ulmaria* L. Tavelník jilmový. Na vlhkých lukách, podél řek, potoků a příkopů vodních, zvláště v křovištích dosti obecný. Na př. v lesích Novohradeckých, na lukách u Roudničky a j. — 2. čn-čnec.

886. *Spiraea filipendula* L. Tužebník. Na suchých lukách, travnatých kopcích místy hojně. — 2. čn-čnec. — Na př. na lukách kolem Střebče, Malšovic, Slatiny, Smiřic a j.!

Spiraea salicifolia L. T. vrboolistý a *S. opulifolia* L. T. kalinolistý. sázejí se častěji spolu s některými jinými druhy v plotech a zahradách, podél tratí železničních a j.!

88. Řád. *Amygdaleae* Juss. Mandloňovité.

887. † *Prunus persica* Celak. Broskev. Sází se tu a tam v zahradách. — p db.

888. † *Prunus armeniaca* L. Meruňka. Jako předešlá. — p bř-db.

889. *Prunus spinosa* L. Trnka. V křovinách na lukách, na pokraji lesů hojně rozšířená, i v plotech sázená. — p db-kv. — Na př. na lukách před Hradcem Kr. a j.!

890. † *Prunus insititia* L. Trnoslívka. Sází se v různých odrůdách v zahradách i v ovocných stromořadích. — p db-kv.

891. † *Prunus domestica* L. Švestka. Jako předešlá. — p db-kv.

892. † *Prunus avium* L. Třešeň. Sází se dosti hojně v ovocných zahradách a stromořadích, místy též zdivoňuje. — p db-kv.

893. *Prunus cerasus* L. Višeň. a) † *genuina*, pravá. Jako předešlá. — p db-kv. — b) * *chamaecerasus*, nízká. Na výslunných kopcích, v světlých lesích a hájích porůznu. Dosud jen v lese mezi Račicemi a Habřinou! — p db-kv.

894. *Prunus padus* L. Střemcha. Ve vlhkých lesích, hájích, v houštinách na lukách i podél řek a potoků velmi rozšířená. — p kv. — Na př. podél Labe a Orlice a j.!

89. Řád. *Papilionaceae* L. Motýlokvěté.

895. *Sarothamnus vulgaris* Wim. Janovec obecný. V sušších lesích, zvláště na písčité a vřesovinné půdě, i na mezích a u cest lesních, místy hojný. — p kv-čn. — V lesích Přímských, u Chlumu, Libčan, za Svinary, u Srehu, nad Stéblovou a j. u Borohrádku, Bohdanče (Č.).

896. * *Cytisus capitatus* Jacq. Čilimník hlavatý. Ve světlých lesích lupenatých i jehličnatých, v písčité i vřesovinné půdě, dosti zhusta. — p čn-čnec. — V lesích Hradeckých, Novohra-

- deckých, v lesích za Roudničkou, u Slatiny, Přímu, Libčan, na Chlumu, kolem Račic a j.!
897. * *Cytisus biflorus* PHÉrit. Č. dvoukvěťý. Na podobných místech jako předešlý a s ním stejně hojný. — ♣ db-kv. — V lesích Hradeckých za Svinary, v lesích Novohradeckých, na Chlumu a j. ! u Bohdaneč (O.).
898. * *Cytisus nigricans* L. Č. černavý. Na podobných místech, jako oba předešlé a dosti hojně rozšířený. — ♣ čn-srp. — V lesích Hradeckých, Novohradeckých, nad Pileticemi, na Chlumu, u Libčan, Račic a j.!
899. † *Cytisus laburnum* L. Č. odvislý. Sází se sem tam v libosadech a zahradách. — ♣ kv-čn.
900. *Genista tinctoria* L. Kručinka barvířská. V lesích a hájích, na keřnatých stráních, v houští lesním dosti obecná. — ♣ kv-srp. — Na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých, u Slatiny, Libčan, Račic, Sendražic a j.!
901. *Genista germanica* L. K. německá. Jako předešlá a stejně rozšířená. — ♣ kv-srp. — Na př. v lesích Novohradeckých, u Boru, Přímu a j.!
902. *Ononis spinosa* L. em. Babí hněv. Na mezích, pastvinách, na pokrajích lesů, u cest i na porůcích obecná. — ♣ čn-zář. — Na mezích a lukách kolem Hradce Kr., v lesích u Přímu a j.!
903. *Medicago lupulina* L. Tolice dětelová. Na lukách, pastvinách, trávnicích, mezích, i u cest obecná. — ☉ kv-zář.
904. *Medicago falcata* L. T. srpovitá. Na podobných místech jako předešlá, však méně hojná. — ♣ čn-zář. — Na př. na hradbách Hradeckých, na sv. Janském kopci, na suchých lukách a mezích před Pražským předměstím a j.!
905. † *Medicago sativa* L. Vojtěška. Seje se na polích a zdivočuje též někdy na mezích a lukách. — ♣ čn-zář.
906. † *Medicago media* Pers. (M. sativa-falcata.) V. zvrhlá. Spolu s předešlou, však řidčeji. — ♣ čn-zář. — Velmi hojná na severních hradbách Hradeckých ve všech možných odrůdách i co α) versicolor, různobarvá i co β) ochroleuca, bledozlutá; na polích vojtěškových vyskytuje se obvykle jen α), na př. blízko Správněc, Smířic a j.!
907. *Melilotus officinalis* Desrous. Komonice lékařská. Na lukách, mezích, polích, na rumištích i u příkopů dosti hojně roztroušena. — ☉ čn-zář. — Na př. u hradeb Hradeckých, v Pláckách, u Správněc a j.!
908. *Melilotus albus* Desr. K. bílá. Jako předešlá i na porůcích místy hojná. — ☉ čn-zář. — Na př. na porůčí Orlice, Labe i Bystřice, u kanálu Opatovického, u Správněc a j.!
909. *Trifolium procumbens* L. Jetel položený. Na lukách, travnatých mezích, pastvinách i na polích obecný. — ☉ čn-zář.
910. *Trifolium agrarium* Poll. J. polní. a) campestre, polní. Na polích, úhorech, mezích obecný. b) minus, menší hojněji na

- lukách, travnatých mezích a trávnících, též obecně rozšířený, na př. na lukách kolem Hradce Kr. a j. — ☉ i ☾ ěn-zář.
911. *Trifolium aureum* Poll. J. zlatý. V světlých lesích a hájích, na lesních lukách dosti hojně rozšířený. — ☉ i ☿ ěn-srp. — Na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých, u Soudražic, Račic, na Kunětické Hoře, u Týniště a j.!
912. *Trifolium hybridum* L. J. zvrhlý. Na vlhčích lukách, pastvinách, mezích dosti obecný, místy též na polích pěstovaný. — ☿ kv-zář. — Na př. na lukách a mezích kolem Střebš, Malšovic, Slezského předměstí a j.!
913. *Trifolium repens* L. J. plazivý. Jako předešlý rozšířen a místy též na polích pěstován. — ☿ kv-zář. — Kolem Hradce Kr. a j. obecný.!
914. *Trifolium montanum* L. J. chlumní. Na lukách, keřnatých stráních i v lesích hojný. — ☿ kv-ěmec. — Na př. hojně rozšířen na lukách kolem Hradce Kr., Smiřic a j.!
915. * *Trifolium fragiferum* L. J. jahodnatý. Na mokřích lukách, pastvinách, mezích, u příkopů porůznu. — ☿ ěn-zář. — Na louce při Orlici za Moravskou branou, na vlhkých mezích u Brna a j. ! u Bohdanče (Č.).
916. *Trifolium arvense* L. J. rolní. Na písčitých polích, úhorech, i na mezích, kopech, lukách obecný. — ☉ ěmec-zář. — Na př. na sv. Jánském kopci, na lukách před Plácky a j.!
917. † *Trifolium incarnatum* L. J. nachový. Pěstuje se místy zvláště na písčitých polích hojněji a zdívčuje též často. — ☉ ěn-ěmec. — Na př. u Malšovic, za Střebší, u N. Hradce, Bělče, Slatiny a j.!
918. * *Trifolium alpestre* L. J. podhorní. Ve světlých lesích a hájích, i na keřnatých stráních porůznu. — ☿ ěn-ěmec. — V lesíku na sv. Jánském kopci, v háji nad Blešnem, v lesích u Vysoké, na suchých mezích u Malšové Lhoty, v lesích u Račic a Soudražic, na Kunětické Hoře a j.!
919. *Trifolium medium* L. J. prostřední. Jako předešlý, ale hojněji rozšířen. — ☿ ěn-srp. — Na př. v lesích a na mezích za N. Hradcem, u Vysoké, Račic a Soudražic, též na pobřeží Labe za plovárnou na louce keři porostlé a j.!
920. * *Trifolium ochroleucum* Huds. J. bledozlutý. Ve světlých lesích a hájích, i na lesních lukách sporný. — ☿ ěn-ěmec. — V lesích za N. Hradcem na několika místech.!
921. *Trifolium pratense* L. J. luční. Na lukách, travnatých návrších i v lesích obecný. — ☿ ěn-srp.
922. * *Anthyllis vulneraria* L. Ůročník lékařský. Na suchých vápnitých stráních, mezích i v lesích porůznu, místy však hojný. Tak u Račic. ! Místy se též pěstuje, tak na př. na písčitých polích kolem Bělče, kde též již na mezích a u cest zdivočile roste. ! — ☿ kv-ěmec.
923. *Lotus corniculatus* L. Štírovník obecný. Na lukách,

trávnících, mezích i u cest dosti obecný. — ž. kv.-zár. — Na př. na mezích a suchých lukách kolem Hradee Kr., na sv. Jánském kopci, v lesích Hradeckých, za N. Hradcem, pod Chludem a j.!

924. * *Lotus uliginosus* Schk. Š. bažinný. Na bažinných lukách, u mokřých příkopů, potoku i na pokrajích rašelinišek, ve výchozí části našeho okresu zvláště hojně rozšířený. — ž. kv.-zár. — Na lukách u Roudničky, Divce, v lese Novohradeckém, u Borohrádku! u rybníka Rozkoše u Bohdanče (Č.) a j.

925. † *Colutea arborescens* L. Žanovec obecný. Sází se nezřídka v libosadech a v plotech. — ž. kv.-čn.

926. † *Robinia pseudacacia* L. Trnovník, akát. Sází se hojně v plotech, sadech, na keřnatých stráních, i v stromořadích. — ž. kv.-čn. — Na př. na sv. Jánském kopci a j.!

† *Caragana arborescens* L. Čimíšník obecný, *Amorpha fruticosa* L. Netvařec křovitý i *Gleditschia triacanthos* L. Dřezovec trnitý sázejí se častěji v sadech a v zahradách.

Astragalus cicer L. Kozinec cizrnovitý. Na keřnatých kopečích, lukách, mezích, dle udání nezaručeného na kopci sv. Jánském. — ž. čn.-čnec.

927. *Astragalus glycyphyllos* L. K. sladkolistý. Ve světlých lesích a hájích, na keřnatých návrších, nejvíce v houštinách, dosti hojný. — ž. čn.-čnec. — Na př. sem tam mezi hradbami Hradeckými, na kopci sv. Jánském, na Spáleném kopci, v háji nad Blešnem, v lesích Novohradeckých, u Boru, Přímu, nad Liběany, u Sendražic, Račic, na Kunětické Hoře a j.!

928. *Coronilla varia* L. Čičorka pestrá. Na suchých lukách, travnatých návrších, mezích i na pokrajích lesů dosti obecná. — ž. čn.-srp. — Na př. na hradbách Hradeckých a j.!

929. * *Onobrychis viciaefolia* Scop. Vičenec obecný. Pěstuje se v půdách vápnitých a nalézá se sem tam zdívočilá dosti hojně na vápnitých kopečích, mezích a hrázích i na polích. — ž. kv.-čnec. — U velikém množství roste na jižním svahu sv. Jánského kopce, pod Zámečkem, činně dojem rostliny samoroští.!

930. † *Phaseolus vulgaris* L. *ampl.* Fazol obecný, i *Ph. multiflorus* Willd., f. mnohokvětý, pěstují se zhusta v zahradách. — ☉ druhý i ž. čn.-zár.

931. * *Vicia lathyroides* L. Vikev hrachovitá. Na suchých travnatých návrších, mezích i u cest, porůznu. — ☉ db.-čn. — U Hradee Kr.!

932. *Vicia sativa* L. V. setá. Sejo se na polích a roste též divoce zhusta, na př. u Střebše, Malšovic a j. — ☉ kv.-čnec.

933. † *Vicia faba* L. Bob svinský. Pěstuje se zhusta na polích a zdívočuje též nezřídka, na př. r. 1879 hojněji u Střebše! — ☉ čn.-čnec.

934. *Vicia sepium* L. Vikev plotní. Na lukách, travnatých

- návrších, světlých hájích, plotech, obecně rozšířená. — 4. kv-srp. — Na př. na lukách kolem Hradce Kr.!
935. * *Vicia dumetorum* L. V. houštní. Ve světlých lesích a hájích, keřnatých návrších, v křovištích, porůznu. — 4. čn-srp. — U Doubravie blíže Skalice (Čen.).
936. * *Vicia silvatica* L. V. lesní. Na podobných místech jako předešlá, více ale v chladnějších polohách, nezářka. — 4. čn-srp. — V lesích Hradeckých „na Černé stráni“, u Račie (v hojnosti)! u Doubravie, Holie (Čen.).
937. * *Vicia cassubica* L. V. kašubská. V suchých lesích a hájích i na keřnatých stráních lesních nehojná. — 4. čn-čnec. — V lese Novohradeckém! v doubravě u Semtinského rybníka (Č.).
938. * *Vicia tenuifolia* Roth. V. tenkolistá. Na sušších lukách, travnatých mezích a stráních i v lupenatých lesích a hájích pořádku. — 4. kv-čn. — Na lukách Polabských, na př. před Správcíci, v Sendražickém háji a j.!
939. *Vicia cracca* L. V. plotní. Na lukách, mezích, v křovištích, u cest i na polích hojně rozšířená. — 4. čn-srp. — Na př. u Střebše a jinde kolem Hradce Kr.!
940. * *Vicia villosa* Roth. V. huňatá. Na polích, úhorech, mezích, místy u velikém množství, na př. na polích kolem Střebše, Březhradu a j. — ☉ i ☉ čn-zář.
941. *Vicia hirsuta* Koch. V. srstnatá. Jako předešlá, též v lesním houští, dosti hojně rozšířená. — ☉ čn-srp. — Na př. na polích pod Zámečkem a j.!
942. † *Lens esculenta* Mönch. Čočka obecná. Seje se často na polích a zdívocuje též místy. — ☉ čn-čnec.
943. † *Pisum sativum* Poir. Hrách setý. Jako předešlá. a) hortense, domácí, obecně pěstovaný, b) arvensc, polní; méně hojný, někdy spolu s a). — ☉ kv-čnec. — a) Zdivočilý jednou hojněji u Střebše, b) na polích u Bělče.!
944. * *Lathyrus silvestris* L. Hrachor lesní. V lesích i na keřnatých stráních lesních roztroušený. — 4. čnec-srp. — V lese za N. Hradcem a nad Hoděšovicemi, u Chvojna (O.).
945. *Lathyrus tuberosus* L. H. hlíznatý. Na polích a úhorech nehojný. — 4. čn-srp. — U Hradce Kr.!
946. *Lathyrus pratensis* L. H. luční. Na lukách, trávnicích, ve vlhkém křoví v lesních pasekách obecný. — 4. čn-srp. — Na př. na hradbách Hradeckých a j.!
947. *Lathyrus vernus* Bernh. H. jarní. V stinných lesích a hájích hojně rozšířený. — 4. db-kv. — Na př. v lesích Hradeckých, Novohradeckých, u Slatiny, Dolního Přímú, Březhradu, Račie, Sendražic a j.!
948. * *Lathyrus niger* Bern. H. černý. Na podobných místech jako předešlý, však méně rozšířený. — 4. čn-srp. — V lese na sv. Jánském kopci, v lesích Hradeckých, Novohradeckých, u Slatiny, v bažantnici u Dolního Přímú, v lesích u Sendražic, Račie a j.!

Seznam

latinských jmen rodových.

	Str.		Str.		Str.
Abies	31	Antirrhinum	70	Bupleurum	93
Acer	90	Apium	93	Butomus	45
Achillea	59	Aquilegia	79	Buxus	48
Aconitum	79	Arabis	82	Calamagrostis	34
Acorus	33	Arenaria	85	Calamintha	73
Adonis	78	Armeria	76	Calendula	61
Adoxa	65	Armoracia	82	Calla	33
Aegopodium	93	Arnica	60	Callitriche	47
Aesculus	90	Arnoseris	55	Calluna	77
Aethusa	94	Arrhenatherum	35	Caltha	79
Agrimonia	97	Artemisia	59	Camelina	83
Agrostemma	87	Asarum	54	Campanula	54
Agrostis	34	Asparagus	45	Cannabis	53
Ailanthus	90	Asperugo	66	Capsella	81
Aira	35	Asperula	64	Caragana	103
Ajuga	75	Aspidium	30	Cardamine	81
Albersia	52	Asplenium	30	Cardaria	81
Alectorolophus	71	Aster	58	Carduus	62
Alchemilla	98	Asterocephalus	63	Carex 39 a	112
Alisma	45	Astragalus	103	Carlina	63
Alliaria	83	Astrantia	93	Carpinus	48
Allium	44	Athyrium	30	Carum	93
Alnus	48	Atropa	69	Centaurea	62
Alopecurus	34	Avena	35	Centunculus	76
Alyssum	81	Ballota	74	Cephalanthera	46
Amaranthus	52	Barbarea	82	Cerastium	85
Amorpha	103	Bellis	58	Ceratophyllum	52
Ampelopsis	91	Berberis	79	Cerefolium	95
Anagallis	76	Bernula	93	Cerinth	67
Anchusa	68	Beta	52	Chaerophyllum	95
Anemone	78	Betonica	74	Chaeturus	75
Anethum	94	Betula	48	Chamaeplium	83
Angelica	94	Bidens	58	Chelidonium	80
Anthemis	59	Brassica	83	Chenopodium	52
Anthericum	45	Briza	37	Chimophila	77
Anthoxanthum	35	Bromus	37	Chondrilla	57
Anthyllis	102	Bryonia	54	Chrysanthemum	59

	Str.		Str.		Str.
Chrysosplenium	96	Erigeron	58	Holosteum	85
Cichorium	55	Eriophorum	42	Hordeum	38
Cicuta	93	Erodium	89	Hottonia	76
Circaea	92	Eryngium	93	Humulus	53
Cirsium	62	Erysimum	83	Hydrocharis	46
Colchicum	45	Erythraea	66	Hydrocotyle	92
Colutea	103	Evonymus	90	Hyoscyamus	112
Conium	95	Eupatorium	61	Hypericum	88
Convallaria	45	Euphorbia	47	Hypochaeris	57
Convolvulus	68	Euphrasia	72	Jasione	54
Cornus	96	Fagus	48	Impatiens	89
Coronilla	103	Falcaria	93	Inula	58
Coronopus	81	Festuca	37	Iris	46
Corydalis	80	Filago	60	Juglans	50
Corylus	48	Foeniculum	94	Juncus	43
Corynephorus	36	Fragaria	99	Juniperus	31
Crepis	55	Frangula	91	Kochia	52
Cucubalus	87	Fraxinus	66	Koeleria	36
Cucumis	54	Fumaria	80	Kohlruschia	86
Cucurbita	54	Gagea	14	Lactuca	57
Cuscuta	68	Galanthus	47	Lamium	74
Cyclamen	76	Galeopsis	74	Lappa	61
Cynoglossum	67	Galium	64	Lapsana	55
Cynosurus	36	Genista	101	Laserpitium	95
Cyperus	43	Gentiana	66	Lathraea	72
Cystopteris	30	Geranium	89	Lathyrus	104
Cytisus	100	Geum	98	Leersia	34
Dacrylis	36	Gladiolus	47	Lemna	31
Danthonia	36	Gleditschia	103	Lens	104
Daphne	53	Glechoma	73	Leontodon	57
Datura	69	Glyceria	37	Leonurus	75
Daucus	95	Gnaphalium	60	Lepidium	81
Delphinium	79	Gratiola	69	Leucorum	47
Deschampsia	35	Gypsophilla	86	Levisticum	95
Dianthus	86	Hedera	95	Ligustrum	65
Digitalis	70	Helianthemum	85	Lilium	44
Diplostaxis	83	Helianthus	58	Limnœlla	69
Dipsacus	63	Helleborus	79	Linaria	70
Draba	81	Hepatica	78	Lindernia	69
Drosera	84	Heracleum	94	Linum	89
Echinopspermum	67	Herniaria	85	Listera	46
Echium	67	Hesperis	83	Lithospermum	67
Elaeagnus	53	Hieracium	56	Lolium	38
Epilobium	91	Hierochloë	35	Lonicera	65
Epipactis	46	Hippuris	92	Loranthus	54
Equisetum	29	Holcus	35	Lotus	102

	Str.		Str.		Str.
Luzula	43	Onopordon	62	Pulicaria	58
Lychnis	87	Ophioglossum	30	Pulmonaria	67
Lycium	69	Orchis	46	Quercus	48
Lycopodium	31	Origanum	73	Radiola	89
Lycopsis	68	Ornithogallum	44	Ranischia	77
Lycopus	73	Orobanché	72	Ranunculus	78
Lysimachia	76	Oxalis	89	Raphanus	83
Lythrum	91	Panicum	33	Reseda	84
Malachium	86	Papaver	80	Rhus	90
Malva	88	Paris	45	Ribes	96
Marrubium	75	Parnassia	84	Robinia	103
Matricaria	59	Pastinaca	94	Roripa	82
Medicago	101	Pavia	90	Rosa	97
Melampyrum	72	Pedicularis	71	Rubus	99
Melandryum	87	Peplis	91	Rumex	50
Melica	36	Petroselinum	93	Ruta	90
Melilotus	101	Peucedanum	94	Sagina	85
Melittis	74	Phalaris	35	Sagittaria	46
Mentha	72	Phaseolus	103	Salix	48
Menyanthes	66	Philadelphus	96	Salvia	73
Mercurialis	48	Phleum	35	Sambucus	65
Mespilus	97	Phragmites	36	Sanguisorba	98
Milium	34	Phyteuma	54	Sanicula	93
Moechrungia	85	Picris	57	Saponaria	86
Molinia	37	Pimpinella	93	Sarothamnus	100
Monesis	77	Pinus	31	Saxifraga	96
Monotropa	77	Pirola	77	Scabiosa	63
Morus	53	Pirus	97	Scandix	94
Myosotis	67	Pisum	104	Schizotheca	51
Myosurus	78	Plantago	75	Scirpus	42
Myriophyllum	92	Platanthera	46	Scleranthus	51
Narcissus	47	Poa	36	Scorzonera	58
Nardus	39	Polygala	90	Scrophularia	69
Negundo	90	Polygonatum	45	Scutellaria	75
Neottia	46	Polygonum	50	Secale	38
Nepeta	73	Polypodium	29	Sedum	96
Neslia	82	Populus	49	Selinum	94
Nigella	79	Potamogeton	32	Senecio	61
Nonnea	68	Potentilla	98	Serratula	61
Nuphar	80	Poterium	98	Seseli	94
Nymphaea	80	Prenanthes	57	Setaria	34
Oenanthe	94	Primula	76	Sherardia	64
Oenothera	91	Prunella	75	Silene	87
Omphalodes	67	Prunus	100	Sinapis	83
Onobrychis	108	Ptelea	90	Sisymbrium	83
Ononis	101	Pteris	30	Sium	93

	Str.		Str.		Str.
Smilacina	45	Teucrium	75	Ulmus	53
Solanum	68	Thalictrum	77	Urtica	53
Solidago	58	Thesium	54	Utricularia	76
Sonchus	56	Thlaspi	80	Vaccinium	77
Sparganium	33	Thuja	31	Valeriana	63
Spergula	85	Thymus	73	Valerianella	64
Spergularia	85	Tilia	88	Verbascum	69
Spinacia	52	Tordylium	94	Verbena	72
Spiraea	100	Torilis	95	Veronica	71
Stachys	74	Tragopogon	57	Viburnum	65
Stellaria	86	Trientalis	76	Vicia	103
Stenophragma . . .	81	Trifolium	101	Vinca	66
Succisa	63	Triglochin	45	Vincetoxicum	66
Symphorycarpus . .	65	Trisetum	36	Viola 84 a	112
Symphytum	68	Triticum	39	Viscaria	87
Syringa	65	Trollius	79	Viscum	54
Taraxacum	57	Turritis	82	Vitis	91
Taxus	31	Tussilago	61	Xanthium	55
Telmatophace . . .	32	Typha	38	Zea	33
Teesdalia	80				

Seznam jmen českých.

	Str.		Str.		Str.
Akát	103	Blatouch	79	Bříza	48
Ambrožka	72	Bledule	47	Brokev	100
Andělíka	94	Blesník	51	Brotán	60
Angeřt	96	Blešník	58	Brslén	90
Anýz	94	Blín	112	Brukev	83
Babí hučev	101	Boč	103	Brusnice	77
Barborka	82	Bodlák	62	Bublinatka	76
Barňeka	45	Bojínek	35	Buk	48
Bažanka	48	Bolehlav	95	Bukvice	74
Bedrník	93	Bolševník	94	Bytel	52
Bélolist	60	Borovice	31	Celer	93
Béložárka	45	Borůvka	77	Cibule	44
Bér	34	Boží dřevec	60	Cvikla	52
Berla	93	Bračka	64	Čarovník	92
Bertrám	59	Bradáček	46	Čekánek	62
Bez	65	Brambor	68	Čekanka	55
Bezkolenec	37	Brambořík	76	Čemeřice	79
Bika	43	Brčál	66	Černobýl	60
Blatěnka	69	Břečtan	95		

	Str.		Str.		Str.
Černohlávek . . .	75	Hořčík	57	Kapustka	55
Černucha	79	Hořčice	83	Karbinec	73
Černýš	72	Hořec	66	Karfiol	83
Čertkus	62	Hořepník	66	Kartouzek	86
Červivec	51	Hrách	104	Kaštan koňský .	90
Česká oliva . . .	53	Hrachor	104	Kerblík	95
Česnádek	83	Hrubozel	52	Klen	90
Česnek	44	Hruška	97	Klínopád	73
Čičorka	103	Hruštička	77	Kmín	93
Čilimník	100	Hulevník	83	Knotovka	87
Čimíšník	103	Hvězdník	58	Kočíčí chvost . .	75
Čistec	74	Hvozdič	86	Kohoutek	87
Čočka	104	Chmel	53	Kokořík	45
Đáblík	33	Chmerek	51	Kokoška	81
Devaterník . . .	85	Chrastavec . . .	63	Kokotice	68
Devětsil	61	Chřest	45	Kokrhel	71
Divizna	69	Chřpa	62	Kolenec	85
Dobromysl	73	Chudina	81	Komonice	101
Drelnička	76	Chudobinka . . .	81	Konitruč	69
Dřín	96	Chvojka	31	Konopáč	61
Dřístál	79	Jablečník	75	Konopě	53
Dřezovec	103	Jabloň	97	Konopice	74
Drobyšek	76	Jahodník	99	Kontryhel	98
Dub	48	Jalovec	31	Konvalinka	45
Durman	69	Janovec	100	Kopr	94
Dvořzubec	58	Jarmanka	93	Kopretina	59
Dymnivka	80	Jasan	66	Kopriva	53
Fazol	103	Jasmín český . .	96	Kopytník	54
Fenykl	94	Jaterník	78	Kosatce	46
Habr	48	Javor	90	Kostival	68
Hadinec	67	Ječmen	38	Kostřava	37
Hadí jazyk	30	Jedle	31	Koukol	87
Hadí kořen	50	Jednokvítetek . .	77	Kozalec	60
Hadí mord	58	Jeřáb	97	Koží brada	57
Hasivka	30	Jestrábník	56	Koží list	65
Heřmáněk	59	Jetel	101	Kozinec	103
Hladýš	95	Jílek	38	Koží noha	93
Hlaváč	63	Jilm	53	Koží pysk	94
Hlaváček	78	Jitrocel	75	Kozlíček	64
Hledík	70	Jíva	49	Kozlík	63
Hloh	97	Jméli	54	Krabalice	95
Hluchavka	74	Kakost	89	Křehkýš	87
Hnilák	77	Kalina	65	Křen	82
Hnízdák	46	Kamejka	67	Křez	83
		Kaprad	30	Křídlatec	90
		Kapusta	83	Křivatec	44

	Str.		Str.		Str.
Krtičník	69	Merlík	52	Ožanka	75
Kručinka	101	Meruňka	100	Pajasán	90
Krušina	91	Meruzalka	96	Pamelník	65
Krušík	46	Měsíček	61	Pamětník	73
Krvavec	98	Metlice	35	Pampeliška	57
Kuklík	98	Měspule	97	Papratka	30
Kukuřice	33	Mléč	56	Pastinák	94
Kuřinec	91	Modřín	31	Pastuší toboleka	81
Kuřinka	85	Mochna	98	Pavie	90
Kustovnice	69	Moruše	53	Pavínek	54
Květel	70	Mrkev	95	Pazítka	44
Kýčelnice	81	Mydlice	86	Pelyněk	59
Kyprej	91	Myší ocásek	78	Penízek	80
Laskavec	52	Myší ouško	56	Peprník	51
Lašovičnick	80	Nadmutička	87	Petržel	93
Lebeda	51	Nahál	80	Pcháč	62
Leknin	80	Náprstník	70	Pilát	68
Len	89	Narcis	47	Pipla	68
Lesknice	35	Nátržník	98	Písečnatka	55
Libeček	95	Netvařec	103	Písečnice	85
Lilek	68	Netykavka	89	Písečník	82
Lilie	44	Nouze	81	Pitulník	74
Lipa	88	Ocún	45	Pížmovka	65
Lipnice	36	Ohnice	83	Plamínek	78
Liska	48	Okřehek	31	Plavaň	31
Lněnka	54	Okrotice	46	Pleskanec	80
Lnice	70 a 83	Okurka	54	Plevel	85
Lorika	57	Olešník	94	Plicník	67
Lomikámen	96	Olše	48	Podběl	61
Lopuch	61	Oman	58	Podbílek	72
Loubinec	91	Oměj	79	Podsněžník	47
Lýkovec	53	Opletka	51	Pohanka	51
Maceška	85	Ořesák	50	Pohánka	36
Máčka	93	Ořehek	44	Pomněnka	67
Mák	80	Orlíček	79	Papenec	73
Malinník	99	Orobinec	33	Por	45
Marjánka	73	Orsej	78	Posed	54
Mařinka	64	Oset	62	Potměchuf	68
Máta	72	Osladič	29	Pováзка	64
Materí douška	73	Ostřice	39 a 112	Prasetník	57
Mateřka	85	Ostrolist	66	Prěslička	29
Materna	83	Ostružinník	99	Prha	60
Mečík	47	Oryka	49	Prímětník	61
Medovník	74	Ořejech	44	Prlina	68
Medynek	35	Oves	35	Prorostlík	93
Meloun	54	Ovšček	35	Proso	33

	Str.		Str.		Str.
Protěž	60	Routička zední . . .	30	Suchopýr	42
Průstka	92	Rozekvítek	70	Svořep	37
Průtržník	85	Rozehodník	96	Svída	96
Prvorenka	76	Rozpuk	93	Svízel	64
Přaskyřík	78	Rozrazil	70	Svlačec	68
Přásec	47	Rožec	85	Šachor	43
Paárka	34	Rukov	82	Šalvěj	73
Páineček	34	Rulík	69	Šanta	73
Patroček	45	Růže	97	Sater	86
Pšenice	38	Růže z Jericha . . .	65	Šedivka	74
Pšeničko	34	Růžkater	52	Šerík	65
Ptačinec	86	Rybíz	96	Šípek	97
Ptačí zob	65	Sasanka	78	Šisák	75
Puchýrník	30	Saturej	73	Škarda	55
Pumpava	89	Sedmikrása	58	Škumpa	90
Pupalka	91	Sedmikvítek	76	Šmel	45
Pupava	63	Sesel	94	Špinát	52
Pupečník	92	Sevlák	93	Štavel	89
Pupkovec	67	Silenka	87	Štětka	63
Pustoryl	96	Sitina	43	Štírovník	102
Puškvorec	33	Skřipina	42	Šťovík	50
Puštíčka	69	Sléz	88	Švestka	100
Pýr	38	Slezinník	30	Tajnička	34
Radyk	57	Slezinník	96	Tařice	81
Rajské jablko	68	Slunečnice	58	Tavolník	100
Rakos	36	Smělek	36	Tis	31
Ralesno	50	Smilka	39	Tolice	101
Rdest	31	Smlník	94	Tolije	84
Rebratka	76	Smolníčka	87	Tolita	66
Řebříček	59	Smrk	31	Tomka	35
Řepa	83	Snědek	44	Topinambur	58
Řepení	55	Sporýš	72	Topol	49
Řepinka	82	Srdečník	75	Tořice	95
Řepík	97	Srha	36	Toten	98
Řepka	54	Srpek	61	Trávnice	99
Řepka	83	Srpek	93	Trávníčka	76
Řeřicha	81	Sratka	96	Třeslice	37
Reseda	84	Starček	61	Třešen	100
Řetkev	83	Stolistek	92	Třezalka	88
Réva	91	Stozrník	89	Trnka	100
Řimbaba	59	Strážka	79	Trnoslívka	100
Rmen	59	Stvrdivka	36	Trnovník	103
Rosička	33	Střemcha	100	Trojstět	36
Routa	90	Strnobl	82	Trojzubec	36
		Strošek	67		
		Stulík	80		

	Str.		Str.		Str.
Třtina	34	Vikev	103	Záraza	72
Trubil	62	Violka	84 a 112	Zběhovce	75
Truskavec	99	Višeň	100	Zblochan	37
Trýzel	83	Vítod	90	Zdravínek	72
Turán	58	Vodanka	46	Zemědým	80
Tuřín	83	Vodnice	83	Zemězluč	66
Tužebník	100	Vojtěška	101	Zerav	31
Tykev	54	Voskovka	67	Zevar	33
Tymián	73	Vraní nožka	81	Zimoléz	65
Upolín	79	Vraní oko	45	Zimostráz	48
Urazník	85	Vrátič	59	Zimozelen	77
Úročník	102	Vrba	48	Zlatobýl	58
Užanka	67	Vrbina	77	Zvěšinec	70
Vachta	66	Vrbice	91	Zvonek	54
Vaz	53	Vrba	91	Žabí vlas	47
Vemenník	46	Vřes	77	Žabník	45
Venušin hřeben	95	Vstavač	46	Žanovec	103
Vesnovka	81	Všedobr	52	Žindava	93
Věsenka	57	Všivec	70	Žito	38
Vičenec	103	Zapalička	94	Zlufucha	77

Dodavek.

Na str. 41. polož za *Carex ericetorum* Pollich:

949. **Carex Buxbaumii* Wahlenb. Ostřice Buxbaumova. Na bařinných lukách pořídku rozšířená, místy však hojná. — 4. db-kv. — Na bařinných lukách u Roudničky a blíže Hoděšovic v hojnosti.!

Na str. 84. polož za *Viola hirta* L.:


950. **Viola mirabilis* L. Viola divotvárná. Ve světlých lupenatých lesích, výslunných hájích, zvláště na vápnité půdě porůznu rozšířená. — 4. db-kv. — Dosud jen v háji u Račic, ! ač nejspíš i jinde ještě nalezena bude.

Na str. 69. polož pod *Datura stramonium*:

951. *Hyoscyamus niger* L. Blín černý. U cest a silnic, na rumišťích a pustých místech ve vesnicích dosti obecně rozšířený, ač zřídka hojný. — ☉ i ☾ čn-zář. — Na př. u silnic kolem Hradce Kr., u cest v Pláckách, Plotišťích a j.!

OBSAH.

I. Všeobecné vylíčení květeny	5
Úvod	5
1. Hranice, velikost okresu a bohatost květeny	6
2. Poloha Hradce Králové a všeobecný popis poměrů zeměpisných a útvarů rostlinných	7
3. Zeměznalecké a geologické poměry okolí	12
4. Klimatické poměry okolí vzhledem ku květeně	14
5. Různé útvary rostlin. v okolí zastoupené	17
A. Útvar rostlin všudybytných	18
a) Rostliny luční a pastvinné	18
b) Rostliny lesní a chlumní	19
c) Rostliny bahenní, vodní a přívodní	21
d) Rostliny polní a zahradní	22
e) Rostliny rumné	24
B. Útvar rostlin poloh nejteplejších	25
C. Útvar rostlin poloh chladnějších	27
Dodatek a vysvětlení znamení a skrácenin	28
II. Seznam všech v okolí dosud pozorovaných a obecně pěstovaných rostlin cévnatých a stanovisek jejich	29
I. Třída. Cévnaté tajnosrubné rostliny	29
II. Třída. Nahosemenné rostliny	31
III. Třída. Jednoděložné rostliny	31
IV. Třída. Dvouděložné rostliny	47
A. Bezkorunné	47
B. Srostloplátečné	54
C. Prostoplátečné	77
Seznam latinských jmen rodových	105
Seznam českých jmen	108
Dodatek	112



MAPKA

okolit

HRADCE KRÁLOVÉ

